

- C.吸烟
D.饮食与营养
- 6.关于家庭氧疗的描述,错误的是()
A.缓解期氧分压在 7.33kPa(55mmHg)以下者应采用
B.采用鼻导管或鼻塞吸入
C.氧流量 1~2L / min, 浓度为 24~30%
D.昼夜持续吸氧时间在 15 小时以下
- 7.肝性脑病患者表现为轻度性格改变和行为异常,提示该患者处于()
A.前驱期
B.昏迷前期
C.昏睡期
D.昏迷期
- 8.诊断为甲状腺功能亢进症患者经口服丙硫氧嘧啶治疗二周后,心慌、怕热、手抖等症状有所减轻,但突然出现咽痛、发热,应警惕()
A.药物剂量不足
B.药物过量
C.粒细胞缺乏症
D.甲状腺危象
- 9.能反映近 2~3 个月内血糖控制总体水平的检查是()
A.口服葡萄糖耐量试验
B.C-肽
C.果糖胺
D.糖化血红蛋白
- 10.我国肝硬化最常见的病因是()
A.乙型病毒性肝炎
B.酒精中毒
C.胆汁淤积
D.循环障碍
- 11.一位十二指肠溃疡患者,近日排黑粪 1 次,但无呕血及头昏、心悸。估计该患者的出血量约为()
A.5~10ml
B.50~100ml
C.250~300ml
D.400~500ml
- 12.缺铁性贫血最常见的病因是()
A.需铁量增加和供铁不足
B.铁吸收不良
C.食物结构不合理
D.慢性失血
- 13.下列不符合肾病综合征的临床表现是()
A.大量蛋白尿(3.5g/d 以上)
B.高脂血症
C.低蛋白血症(血清白蛋白低于 30g / L)
D.肉眼血尿
- 14.一慢粒白血病患者出现不明原因发热、贫血,脾脏进行性肿大,提示该患者处于()
A.慢性期
B.急变期
C.加速期
D.缓解期
- 15.心绞痛与急性心肌梗死疼痛表现的不同点是()
A.部位
B.性质
C.放射部位
D.持续时间

二、多项选择题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

- 16.急性重型肝炎除起病形式和一般黄疸型肝炎相似外,临床表现尚有()
A.黄疸进行性加深
B.肝脏迅速缩小
C.乏力及消化道症状显著
D.有明显的出血倾向及腹水
E.发病 10 天内发生明显的肝性脑病表现
- 17.甲状腺功能亢进症患者最常见的心律失常为()

- A. 窦性心动过速
B. 房性期前收缩
C. 室性期前收缩
D. 室性心动过速
E. 室上性心动过速
18. 关于慢性呼吸衰竭时的氧疗, 正确的是()
A. 一般采用低浓度持续给氧
B. 供氧时应给予湿化
C. 可通过多种途径给氧
D. 氧疗的目的是使病人的 PaO₂ 维持在正常范围
E. 每 24 小时更换导管
19. 左心衰竭的主要症状是()
A. 双下肢水肿
B. 呼吸困难
C. 咳嗽、咳痰、咯血
D. 食欲不振、恶心、呕吐
E. 腹胀、尿少和夜尿
20. 慢性肾功能衰竭病人的饮食原则是()
A. 高热量
B. 低蛋白质
C. 高钙
D. 低磷
E. 高必需氨基酸
21. 洋地黄中毒常见的毒性反应包括()
A. 食欲不振、恶心、呕吐
B. 头痛、黄绿视
C. 多种类型的心律失常
D. 头痛、面红、头部跳动感
E. 肝肾功能受损
22. 关于尿菌定量培养正确的是()
A. 应用抗菌药之前留取尿标本
B. 停用抗菌药 2 天后留取尿标本
C. 宜取清晨第一次尿作标本
D. 充分清洁外阴、消毒尿道口, 再留中断尿
E. 应在留尿后 2 小时内做细菌培养
23. 属于糖尿病微血管病变的是()
A. 冠心病
B. 糖尿病肾病
C. 糖尿病性视网膜病变
D. 白内障
E. 屈光改变
24. 类风湿性关节炎病人的关节症状表现为()
A. 晨僵
B. 疼痛
C. 肿胀
D. 畸形
E. 功能障碍
25. 对消化性溃疡有确诊价值的辅助检查是()
A. 胃镜检查
B. X 线钡餐检查
C. 幽门螺杆菌检测
D. 胃酸测定
E. 粪便隐血试验

三、填空题(本大题共 13 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26. 消化性溃疡具有慢性过程、_____和_____三大临床特点。
27. 类风湿性关节炎是一种以慢性、对称性、_____为特征的全身性自身免疫病。

- 28.在乙型病毒性肝炎抗原抗体检查中,表明 HBV 活动性复制和有传染性的重要标志是_____。
- 29.保护乙型病毒性肝炎易感人群的措施是注射_____和_____。
- 30.在静息呼吸空气时,肺泡通气量约需_____L/min 才能维持正常肺泡氧分压和二氧化碳分压。
- 31.呼吸衰竭的临床症状除原发病表现外,主要是_____和_____所引起的多脏器功能紊乱的临床综合征。
- 32.慢性支气管炎发生、发展的重要因素是_____。
- 33.对急性白血病患者为预防尿酸性肾病,在整个化疗期间要观察病人的尿量,鼓励多饮水,使每日尿量达_____ml 以上,并遵医嘱口服碳酸氢钠或口服_____。
- 34.使用血管扩张剂治疗心力衰竭的目的是通过扩张血管而减轻心脏的_____,减轻淤血症状。该类药最主要的不良反应是_____,故应严密监测。
- 35.心绞痛初发型、恶化型、变异型等均可称为_____型心绞痛,因其进一步发展有可能发生_____。
- 36.急性心肌梗死患者最多见的心律失常为_____。
- 37.最常见的糖尿病神经病变为_____。
- 38.肝硬化病人腹水形成最基本的因素是_____和_____。

四、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

39. 造血干细胞移植
40. 癫痫
41. 酮体
42. 脾功能亢进
43. 体位引流

五、简答题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

44. 简述对肾盂肾炎患者的健康教育内容。
45. 说明缺铁性贫血患者口服铁剂时的注意事项。
46. 简述传染病的基本特征。
47. 简述预防溃疡病复发的措施要点。

六、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

48.女性,20岁,因反复发作呼吸困难6年、持续严重喘息2天而收入院治疗。

身体评估:BP:100/70mmHg,R:26次/min,P:130次/min,端坐呼吸,口唇紫绀,大汗淋漓,肺部听诊两肺呼吸音减弱,呼气相延长,满布哮鸣音。心率130次/min,余(-),腹(-)。

实验室检查:白细胞分类嗜酸性粒细胞增加,血清IgE明显增高。

问题:

- (1)此病人的医疗诊断是什么?
- (2)写出一个最主要的护理诊断。
- (3)写出此病人主要的护理措施。

49.男,50岁,某公司副董事长。高血压病史10年,肥胖,长期吸烟。平日血压多在150~160/90~100mmHg,一直坚持服降压药。近一个月来经常工作至深夜,自感头痛、头晕,2小时来自述剧烈头痛,测BP210/120mmHg,继之呕吐,神志逐渐模糊,同事紧急送往急诊室。

查体:BP:220/120mmHg,R:18次/min,意识不清,角膜反射存在,心脏向左扩大,心率90次/min,律整,肺、腹(-)。

心电图检查示左室肥厚,头颅CT检查未见异常。

问题:

- (1)该病人存在哪种高血压病并发症?
- (2)目前该病人发生了哪种高血压急症?
- (3)病人清醒后,血压恢复正常,护士应对病人进行哪些健康教育?