

## 中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

**英语/高等数学预备课：**英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

**基础学习班：**依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

**冲刺串讲班：**结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

**习题班：**自考 365 网校与北大燕园合作推出，共计 390 门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

**论文答辩与毕业申请指导班：**来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

**自考实验班：**针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

## 全国 2007 年 10 月高等教育自学考试

## 儿科护理学（二）试题

课程代码：03011

**一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分）**

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 广谱驱虫药阿苯达唑(肠虫清)禁用的年龄是（ ）  
A. 1 岁以下  
B. 2 岁以下  
C. 3 岁以下  
D. 4 岁以下
2. 小儿各系统器官发育不平衡，发育最晚的系统是（ ）  
A. 神经系统  
B. 肌肉组织  
C. 淋巴系统  
D. 生殖系统
3. 一个小儿能爬台阶、有目的地扔皮球、能认识和指出身体各部分、会表示大小便，其最可能的年龄是（ ）  
A. 12 个月  
B. 15 个月  
C. 18 个月  
D. 24 个月
4. 维生素 A 缺乏病最早出现的眼部表现为（ ）  
A. 角膜干燥  
B. 暗适应能力减低  
C. 畏光  
D. 毕脱斑出现
5. 下列主动免疫制剂中属于活菌苗的是（ ）

- A.预防麻疹的制剂  
C.预防破伤风的制剂
- 6.血友病 A 和 B 的遗传特征是 ( )  
A.常染色体显性遗传  
C.X 连锁显性遗传
- 7.引起婴幼儿腹泻最常见的肠道内感染的病原是 ( )  
A.病毒  
C.支原体
- 8.2 岁以上小儿不同年龄血压正常平均值的推算公式是 ( )  
A.收缩压(mmHg)=60+(年龄×2)  
C.收缩压(mmHg)=80+(年龄×2)
- 9.幼儿住院时主要压力来源是 ( )  
A.与父母分离  
C.躯体形象改变
- 10.富含锌的食物是 ( )  
A.大米  
C.牛奶
- 11.新生儿败血症产后感染的主要途径是 ( )  
A.皮肤  
C.脐部
- 12.参与人体的羟化和还原过程,能防治坏血病的维生素是 ( )  
A.维生素 A  
C.维生素 C
- 13.胎儿缺氧早期的表现是 ( )  
A.胎动增加,胎心加快>160 次/分  
C.胎动减少,胎心变慢<100 次/分
- 14.白血病患儿童鞘内注射后为减少不良反应,需平卧的时间是 ( )  
A.4~6h  
C.12~16h
- 15.营养性缺铁性贫血是 ( )  
A.小细胞正色素贫血  
C.小细胞低色素贫血
- 16.小儿呼吸道合胞病毒肺炎最突出的临床表现为 ( )  
A.刺激性干咳  
C.稽留高热
- 17.接种脊髓灰质炎疫苗正确的描述是 ( )  
A.3 个月第一次接种  
C.服后 1 小时内禁饮热开水
- 18.符合小儿解剖特点的描述是 ( )  
A.新生儿颈部肌肉发育良好  
C.小儿臼窝较深
- 19.苯丙酮尿症患儿最突出的特点是 ( )  
A.粘液性水肿
- B.预防结核病的制剂  
D.预防乙型脑炎的制剂
- B.常染色体隐性遗传  
D.X 连锁隐性遗传
- B.细菌  
D.真菌
- B.舒张压(mmHg)=60+(年龄×2)  
D.舒张压(mmHg)=80+(年龄×2)
- B.环境陌生  
D.丧失独立能力
- B.鱼  
D.母乳
- B.粘膜  
D.呼吸道
- B.维生素 B  
D.维生素 D
- B.胎动增加,胎心>140 次/分  
D.胎动减少,胎心变慢<80 次/分
- B.8~10h  
D.24h
- B.大细胞正色素贫血  
D.大细胞低色素贫血
- B.喘憋  
D.皮肤可见猩红热样皮疹
- B.6 岁时加强接种一次  
D.初种次数为 4 次
- B.小儿骨骼较易折断  
D.小儿较易脱臼
- B.尿有烂苹果味

- C.张口伸舌  
D.智力低下
- 20.关于水痘的叙述不正确的是 ( )  
A.皮疹呈向心性分布  
B.仅由呼吸道传播  
C.病人为主要传染源  
D.水痘为自限性疾病,病程 10 天左右
- 21.一个误服药物的小儿表现为口干、皮肤潮红、粘膜干燥、烦躁、瞳孔散大、心动过速、体温升高。最可能中毒的药物是 ( )  
A.苯妥英钠  
B.氨茶碱  
C.阿托品  
D.氯丙嗪
- 22.在婴儿饮食中开始添加果汁、菜汤及鱼肝油滴剂的适宜时间是 ( )  
A.生后 1~3 个月  
B.生后 3~5 个月  
C.生后 6~8 个月  
D.生后 8~12 个月
- 23.原发性肾病综合征患儿发生血栓时,最易发生的血管是 ( )  
A.肾静脉  
B.大隐静脉  
C.小隐静脉  
D.腘静脉
- 24.具有促进生长发育,并是形成视紫质所必需的维生素是 ( )  
A.维生素 A  
B.维生素 B  
C.维生素 C  
D.维生素 D
- 25.患儿,男,18 个月,因咳嗽 5 天,伴发热 3 天以支气管炎收住入院,不应采取的措施是 ( )  
A.经常变换体位  
B.室内湿度 60%  
C.给予雾化吸收  
D.给予镇咳药
- 26.引起心肌炎的最常见的病毒是 ( )  
A.埃可病毒  
B.腺病毒  
C.流感和副流感病毒  
D.柯萨奇病毒乙组
- 27.3 岁小儿因脑炎昏迷 2 天,今起呼吸节律不整,口周发绀,此患儿最可能为 ( )  
A.周围性呼吸衰竭  
B.中枢性呼吸衰竭  
C.合并肺炎  
D.合并支气管炎
- 28.患儿 6 个月,腹泻 2 天,稀便日 10 次左右,精神尚好,皮肤弹性稍差,轻度眼窝下陷,尿稍少,四肢不凉。其脱水程度是 ( )  
A.轻度脱水  
B.中度脱水  
C.重度脱水  
D.未脱水
- 29.对流行性腮腺炎患儿的护理,不合适的是 ( )  
A.肿胀处可冷敷  
B.肿胀处可用醋调青黛散外敷  
C.宜进食易消化和清淡的软食  
D.可食水果、果汁和补充维生素 C 等
- 30.川崎病最主要的死亡原因是 ( )  
A.感染  
B.肾功能衰竭  
C.心肌梗死  
D.颅内出血

## 二、填空题(本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 31.水痘是由\_\_\_\_\_病毒引起的,它经\_\_\_\_\_侵入人体。
- 32.麻疹患者在潜伏期末至出疹后\_\_\_\_\_天均有传染性,如有并发症传染性延长至出疹后\_\_\_\_\_天。
- 33.破伤风患儿应置于\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的环境中。
- 34.急性肾小球肾炎典型表现包括水肿、\_\_\_\_\_、血尿及\_\_\_\_\_。
- 35.缺铁性贫血发病率最高的年龄段是\_\_\_\_\_。由于骨髓外造血反应,可出现轻度\_\_\_\_\_肿大。

**三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）**

- 36. 青春期
- 37. 被动免疫
- 38. 高危儿
- 39. 退化现象
- 40. 肾病综合征

**四、简答题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）**

- 41. 简述小儿生长发育的规律。
- 42. 简述母乳的优点。
- 43. 简述新生儿室的环境要求。
- 44. 护理充血性心力衰竭的患儿时如何观察洋地黄毒性反应？
- 45. 简述减轻泌尿系感染引起的排尿异常的主要护理措施。
- 46. 简述光照疗法患儿的准备。

**五、论述题（本大题共 1 小题，共 15 分）**

47. 患儿，女，1 岁，生后人工喂养，以牛奶为主，7~8 个月开始加粥、米粉，偶尔吃鸡蛋，但从未加过肉沫、肝泥、蔬菜等。目前体重 8.5kg，能站，不会走。近 1 个月来食欲差，不活泼，面色苍白。查血常规：Hb75g/L，RBC $2.9 \times 10^{12}/L$ ，红细胞大小不等，以小细胞为主，诊断为营养性缺铁性贫血。

- (1) 分析该患儿发病原因；
- (2) 请给家长做患儿的喂养指导；
- (3) 该患儿在铁剂治疗时的注意事项。