

- A. 基础代谢所需
C. 活动所需
5. 小儿股静脉穿刺的部位是位于腹股沟()
A. 中 1/3 与内 1/3 交界处
C. 中 1/3 与外 1/3 交界处
6. 正常新生儿的呼吸频率是()
A. 20~30 次 / 分
C. 40~50 次 / 分
7. 营养不良患儿全身各部位皮下脂肪消减, 首先发生在()
A. 四肢
C. 腹部
8. 肥胖儿童的体重至少超过同性别、同身高小儿参考平均值的比例是()
A. 30%
C. 20%
9. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症发生惊厥、喉痉挛多见于()
A. 婴儿
C. 学龄前儿童
10. 为患儿供氧的浓度需根据个体需要进行调节, 一般给氧浓度为()
A. 20%~30%
C. 40%~50%
11. 小儿急性上呼吸道感染的常见病原是()
A. 病毒
C. 细菌
12. 重症肺炎患儿常出现严重腹胀加重呼吸困难的原因是()
A. 低血钾
C. 中毒性肠麻痹
13. 小儿液体疗法中补充累积损失量时, 低渗性脱水应补充的溶液是()
A. 1/3 张含钠液
C. 2/3 张含钠液
14. 引起小儿轻型腹泻的常见原因是()
A. 饮食不当或肠道外感染
C. 肠道内感染
15. 法洛三联症发生昏厥的主要原因是()
A. 右心室肥厚
C. 室间隔缺损
16. 婴儿“生理性贫血”一般出现的时间是()
A. 1 个月左右
C. 3 个月左右
17. 急性肾小球肾炎患儿急性期一般卧床休息的时间是()
A. 2 周
C. 2 个月
18. 出生 6 个月以后婴儿住院时主要的心理反应是()
A. 恐惧
- B. 生长发育所需
D. 食物的特殊动力作用
- B. 中点
D. 任意一点
- B. 30~40 次 / 分
D. 50~60 次 / 分
- B. 躯干
D. 面部
- B. 25%
D. 15%
- B. 幼儿
D. 学龄儿童
- B. 30%~40%
D. 50%~60%
- B. 真菌
D. 支原体
- B. 肠梗阻
D. 产气性大肠埃希菌作用
- B. 1/2 张含钠液
D. 等张含钠液
- B. 精神因素
D. 体质因素
- B. 主动脉骑跨
D. 肺动脉狭窄致漏斗部痉挛
- B. 2 个月左右
D. 4 个月左右
- B. 4 周
D. 3 个月
- B. 否认拒绝

- C. 悲哀
D. 分离性焦虑
19. 小儿泌尿系感染最常见的致病菌为()
A. 大肠杆菌
B. 表皮葡萄球菌
C. 白色葡萄球菌
D. 金黄色葡萄球菌
20. 川崎病是()
A. 内分泌系统疾病
B. 神经系统疾病
C. 结缔组织疾病
D. 血液系统疾病
21. 发生糖尿病高渗性昏迷时, 患儿血糖一般高于()
A. 200mg/dl
B. 300mg/dl
C. 400mg/dl
D. 500mg/dl
22. 下列免疫球蛋白中, 可以通过胎盘的是()
A. IgA
B. IgG
C. IgM
D. IgE
23. 属于水溶性维生素的是()
A. 维生素 A
B. 维生素 C
C. 维生素 D
D. 维生素 E
24. 水痘患儿的隔离期应到()
A. 出疹后 3 天
B. 出疹后 5 天
C. 疱疹全部结痂
D. 痂皮全部脱落
25. 21-三体综合征属于()
A. 内分泌疾病
B. 免疫缺陷病
C. 神经系统疾病
D. 染色体疾病
26. 流行性腮腺炎的传播途径是()
A. 消化道传播
B. 虫媒传播
C. 血液传播
D. 呼吸道传播
27. 结核性脑膜炎患儿做腰椎穿刺后应去枕平卧的时间是()
A. 2~4 小时
B. 4~6 小时
C. 6~8 小时
D. 8~10 小时
28. 小儿中心静脉压的正常值是()
A. 4~5cmH₂O
B. 6~12cmH₂O
C. 10~15cmH₂O
D. 12~18cmH₂O
29. 小儿误服强酸中毒后, 可选用的中和剂是()
A. 清水
B. 碳酸氢钠
C. 氢氧化铝凝胶
D. 生理盐水
30. 心跳呼吸停止导致脑细胞死亡的时间是()
A. 4~6 分钟
B. 7~8 分钟
C. 9~10 分钟
D. 12 分钟

二、填空题(本大题共 10 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31. 测量小儿头围时, 将软尺 0 点固定于一侧眉弓上缘, 紧贴头皮绕_____及另一侧眉弓上缘回至 0 点, 记录读数至_____cm。
32. 小儿乳牙共_____个, _____岁出齐。
33. 肾病综合征患儿有高血压和水肿时给予_____饮食, 蛋白质摄入控制在每日_____左右为宜。

34. 新生儿硬肿症是由多种因素引起的皮肤和皮下脂肪_____与_____的一种疾病。
35. 低渗性脱水是指_____, 血清钠浓度_____mmol / L。
36. 小儿先天性心脏病可分为三类, 左向右分流型(潜伏青紫型), _____和_____。
37. 常见的属于右向左分流型先天性心脏病有_____和_____。
38. 胚胎和胎儿早期的造血器官为_____、_____。
39. 尿崩症主要的临床表现为_____、_____和排出低比重尿。
40. 脑的耗氧量占全身耗氧量的_____, 严重缺氧时, _____组织首先受损害。

三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

41. 新生儿败血症
42. 大于胎龄儿
43. 急性肾功能衰竭
44. 感染性休克
45. 甲状腺功能减低症

四、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

46. 简述化脓性脑膜炎神经系统临床表现。
47. 简述尿崩症患者采用鞣酸垂体加压素治疗时给药方式及护理要点。
48. 简述泌尿系统疾病患儿的护理原则。
49. 列出应用液体疗法补液时的注意事项。

五、论述题(本大题共 15 分)

50. 7 个月婴儿, 发热、咳嗽 3 天, 伴气促有痰不易咳出。

查体: 体温 38.9℃, 脉搏 160 次 / 分, 呼吸 50 次 / 分, 双肺呼吸音低, 可闻及散在细湿啰音, 肝肋下 2cm, 外周血白细胞 $13 \times 10^9 / L$ 。根据以上资料:

- (1) 写出可能的医疗诊断; (3 分)
- (2) 写出 3 个主要的护理诊断; (6 分)
- (3) 写出主要的护理措施。(6 分)