

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

**英语/高等数学预备班：**英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

**基础学习班：**依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

**冲刺串讲班：**结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

**习题班：**自考 365 网校与北大燕园合作推出，共计 390 门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

**论文答辩与毕业申请指导班：**来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

**自考实验班：**针对高难科目开设，签协议，不及格退还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

全国 2008 年 4 月高等教育自学考试

急救护理学试题

课程代码：03007

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

在每小题列出的五个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 1.对于肾上腺素药物下列说法不正确的是（ ）  
A.  $\alpha$  受体兴奋作用可使外周血管收缩      B.  $\beta_1$  受体兴奋作用增强心肌收缩力  
C.使心室粗颤波变为细颤波                      D.是心肺复苏的一线药物  
E.可经气管插管给药
- 2.下列不属于肺源性呼吸困难的原因是（ ）  
A.一氧化碳中毒                                      B.胸廓畸形  
C.肺炎    D.开放性气胸  
E.气管异物
- 3.院前急救时根据出血性质采用不同的止血措施，下列说法不正确的是（ ）  
A.加压包扎止血法一般用于弥漫创口的出血

- B.指压止血法是主要用于动脉出血的一种临时止血方法  
C.抬高肢体止血法是减缓血液流速的临床应急止血措施  
D.屈肢加垫止血法是主要用于无骨折和关节损伤的四肢出血的止血方法  
E.填塞止血法主要用于开放性气胸、腋窝、颈部等大或深的伤口
- 4.对于因多发伤死亡的病人来说,下列说法正确的是( )  
A.30%死于创伤现场  
B.30%死于创伤早期  
C.15%死于创伤后期  
D.15%死于并发症  
E.10%死于原发病
- 5.我国对灾难的分级是以人口直接死亡数及经济损失为依据的,下列符合小灾的是( )  
A.死亡十万人以上或损失十亿元人民币以上的  
B.死亡百人至千人或损失百万元至千万元人民币的  
C.死亡千人至万人或损失千万元至亿元人民币的  
D.死亡十人至百人或损失十万元至百万元人民币的  
E.死亡万人至十万人或损失亿元至十亿元人民币的
- 6.氰化物中毒时,下列氧疗措施中正确的是( )  
A.高流量系统  
B.高压氧治疗  
C.无重复呼吸面罩  
D.围帐式氧疗系统  
E.部分重复呼吸面罩
- 7.呼吸道异物的现场急救时可采用喉异物紧抱急救法,对于喉异物紧抱急救法下列说法不正确的是( )  
A.病人可站立进行  
B.病人可坐位进行  
C.病人可仰卧位进行  
D.快速挤压两侧胸部  
E.必要时可反复数次
- 8.大型综合医院急诊科护理人员编制标准规定,主管护师、护师人员占护理人员比例为( )  
A.10%以下  
B.10%-20%  
C.20%-30%  
D.30%-40%  
E.40%以上
- 9.控制指令通气用于( )  
A.严重呼吸抑制者  
B.呼吸衰竭病人  
C.呼吸机撤离时  
D.ARDS  
E.调节压力支持水平锻炼呼吸肌
- 10.可引起血压升高的毒物是( )  
A.砷类  
B.氰化物  
C.强酸  
D.樟脑  
E.亚硝酸盐
- 11.急性亚硝酸盐中毒出现最早、最有特征的症状为( )  
A.恶心  
B.头痛  
C.口唇青紫  
D.晕厥  
E.呼吸困难
- 12.电流强度是决定电击严重程度的一个方面,当电流达到一定程度时可使手的屈肌发生收缩而致手握住电源,不能摆脱电源。可引起此种情况的电流强度是( )  
A.1-2mA  
B.15-20mA  
C.20-25mA  
D.50mA 以上  
E.100mA 以上

13.不属于分布性休克的是 ( )

- A.脓毒性休克
- B.低血容量休克
- C.神经源性休克
- D.过敏性休克
- E.内分泌性休克

14.呼吸系统监护不包括 ( )

- A.呼吸动力学监护
- B.动脉血气分析
- C.肺功能监护
- D.临床观察
- E.肺毛细血管楔压监测

15.多发伤的腹部损伤率较高,有关数据统计显示,其发生率可达到 ( )

- A.10%-20%
- B.20%-45%
- C.30%-50%
- D.30%-60%
- E.40%-50%

## 二、多项选择题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16.休克早期,休克代偿反应主要有 ( )

- A.小动脉持续收缩
- B.血管通透性增加
- C.减少皮肤、骨骼肌和内脏血流
- D.提高心率和增强心肌收缩力
- E.通过静脉血管收缩和毛细血管回吸收来恢复有效血容量

17.气管内插管的注意事项正确的有 ( )

- A.选用刺激性小、大小合适的导管
- B.气管导管及吸痰用具应保证清洁无菌
- C.普通气管导管一般保留不超过 48 小时
- D.经鼻插管可保留 1 周以上
- E.定期吸痰,每次吸痰前及吸痰间歇适当做过度通气

18.属于低流量供氧系统装置的有 ( )

- A.T 型管
- B.空气稀释喷雾面罩
- C.气管造口罩
- D.简单面罩
- E.鼻导管

19.急诊科主要工作制度包括 ( )

- A.预检分诊制度
- B.首诊负责制度
- C.急诊留观制度
- D.出诊救护制度
- E.消毒隔离制度

20.针对美国急诊医学,说法正确的有 ( )

- A.美国是急诊医学发展最快的国家之一
- B.美国 1968 年成立了急诊医师协会
- C.美国 1970 年医学院校把急诊医学定为必修课程
- D.美国 1979 年成立了急诊护士协会
- E.美国 1958 年正式成立综合重症监护治疗病房

21.脑复苏的措施主要包括 ( )

- A.减轻脑水肿
- B.给予钙通道阻断药
- C.维持脑灌注
- D.高压氧治疗
- E.给予碳酸氢钠

- 22.多器官功能障碍综合征的预后与器官功能障碍的数目及其持续的时间密切相关,下列说法正确的是( )
- A.一个器官系统衰竭持续一天以上,病死率 40%  
B.二个器官系统衰竭超过一天,病死率 60%  
C.二个器官系统衰竭超过二天,病死率 80%  
D.三个器官系统衰竭持续 72 小时以上,病死率 100%  
E.三个以上器官系统衰竭持续 72 小时以上,死亡率 100%
- 23.对于骨折、关节严重损伤、大面积软组织损伤的伤病员采取临时固定的方法的目的是( )
- A.止血  
B.减轻痛苦  
C.减少并发症  
D.方便转运  
E.维持生命
- 24.呕血与咯血鉴别时,下列符合咯血的有( )
- A.患者上腹部不适  
B.前驱症状有喉痒、胸闷  
C.血液性状为鲜红,泡沫状  
D.血液酸碱度为酸性  
E.出现柏油便
- 25.在监测中心静脉压时正确的是( )
- A.预防感染  
B.防止空气栓塞  
C.呕吐后及时测量  
D.疑有管腔堵塞时应用无菌生理盐水快速冲注  
E.病人体位以平卧为宜
- 26.灾难发生后,可以对伤员进行转运的情况是( )
- A.转运途中不会有生命危险者  
B.骨折已固定者  
C.可能出现脑疝者  
D.伤情基本稳定者  
E.颈部损伤呼吸障碍者
- 27.低血钾症及高血钾症均需要监测的内容有( )
- A.神经-肌肉状态  
B.尿量  
C.血清钾  
D.动脉血气  
E.心电监测
- 28.电击伤病人在条件允许的情况下,应尽快将病人转运到医院救治。在转运途中应注意的事项有( )
- A.不间断心肺复苏抢救  
B.继续给氧、补液  
C.严密观察生命体征  
D.保持呼吸道通畅  
E.做好病人的交接
- 29.多发伤创伤后机体营养代谢分为两个时相,低落相的表现有( )
- A.机体代谢率低  
B.耗氧量增加  
C.发生在受伤 36 小时后  
D.体温下降  
E.体量减少
- 30.进入体内的毒物大部分在肝脏内进行转化,然后再排出毒物,重要的毒物排出途径有( )
- A.肾脏  
B.肠道  
C.皮肤  
D.呼吸道  
E.唾液

### 三、填空题(本大题共 8 小题,每空 1 分,共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 31.代谢性酸中毒是各种原因引起的体内酸性物质产生过多或\_\_\_\_\_或碱性物质丢失过多而造成的一种临床

表现。

- 32.引起胸肺顺应性降低的常见原因有\_\_\_\_\_减退、\_\_\_\_\_减少、胸廓和膈肌运动受限。
- 33.颈椎骨折的病人取仰卧位，\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_固定，以利安全转运。
- 34.胸外心脏按压的并发症主要有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。为避免或减少并发症的发生，必须掌握正确的心肺复苏操作技术。
- 35.自体血回输的禁忌证有创伤积血部位有恶性病变者、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、伤前有明显的肝、肾功能异常者。
- 36.营养不良可加重各种疾病，影响预后。病人表现为伤口愈合延迟，术中或术后易发生出血、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，机械通气病人撤机困难等。
- 37.气管插管拔管后应立即给氧，吸入氧浓度为\_\_\_\_\_，最好\_\_\_\_\_。
- 38.氧疗时应根据病情选择给氧装置和氧疗方法，对于中、重度低氧血症的危重病人，应用\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_，开始的吸入氧浓度大于或等于 60%。以后根据生理学参数调整吸入氧浓度，维持  $\text{PaO}_2$  大于 60mmHg 或  $\text{SaO}_2$  大于 90%。

#### 四、名词解释(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

- 39.急性肝衰竭  
40.高热  
41.昏迷  
42.心脏电复律  
43.瘫痪

#### 五、简答题(本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分)

- 44.如何对休克病人进行心理护理?  
45.简述湿性淹溺的发病机制。  
46.简述高压氧治疗的适应证。

#### 六、论述题(本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分)

- 47.病例：男性患者，建筑工人，28 岁，因在施工中被烧伤而来诊，来院时查体：左上肢、颈部、胸腹部、双足和小腿均有水泡，剧痛；右手掌焦局部肿胀；面部红斑。请（1）诊断患者的烧伤面积及深度。（2）并试论述烧伤患者现场急救顺序。
- 48.病例：患者，男性，30 岁，被人发现倒在路旁，昏迷，口吐白沫，全身大汗，旁边有一个 500ml 敌敌畏瓶，瓶中还有 10ml 左右药液。约 40min 后送至本院。深昏迷，瞳孔针尖大小，血压 80/50mmHg，呼吸微弱，心率 40 次/min。查血胆碱酯酶（CHE）144u/L（正常值 4650~12200u/L）。当时大小便失禁， $T < 35^\circ\text{C}$ ，呼吸微弱；血气分析： $\text{pH} 7.22$ ， $\text{PaO}_2 58\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 48\text{mmHg}$ ， $\text{HCO}_3^- 15.1\text{mmol/L}$ ， $\text{BE} -11.6\text{mmol/L}$ ，神经系统检查：双侧瞳孔 0.5mm，对光反应微弱。全身肌张力高，巴彬斯基征阳性，Glasgow 昏迷评分 5 分。请写出诊断和进一步的治疗措施。