

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看，不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

真题申讲班：教育部考试中心已经启动了自考的国家题库建设，熟练掌握自考历年真题成为顺利通过考试的保障之一。自考 365 网校与权威自考辅导专家合作，推出真题申讲班网上辅导课程。通过对课程的整体情况分析 & 近 3 次考试的真题讲解，全面梳理考试中经常出现的知识点，并对重点难点问题配合典型例题扩展讲解。申讲班课程在考前一个月左右开通。[立即报名！](#)

习题班：自考 365 网校与北大燕园合作推出，每门课程均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

全国 2009 年 1 月高等教育自学考试

儿科护理学（二）试题

课程代码：03011

一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 新生儿可从母体获得的免疫球蛋白是（ ）

A. IgA	B. IgE
C. IgG	D. IgM
2. 新生儿呼吸窘迫综合征主要是由于（ ）

A. 病毒感染	B. 缺乏肺表面活性物质
C. 胎粪排出延迟	D. 羊水吸入
3. 急性腹泻是指病程在（ ）

A. 3 天以内	B. 7 天以内
C. 2 周以内	D. 3 周以内
4. 小儿重度脱水，丢失水分约为体重的（ ）

A. 5%~7%	B. 8%~10%
----------	-----------

- C. 10%~12% D. 12%~15%
5. 营养不良最早出现的症状是 ()
- A. 体重下降 B. 皮下脂肪逐渐减少
- C. 体重不增 D. 身材矮小
6. 脚气病是由于缺乏 ()
- A. 维生素 A B. 维生素 B₁
- C. 维生素 C D. 维生素 E
7. 小儿特有的能量需要是 ()
- A. 基础代谢所需 B. 生长发育所需
- C. 食物特殊动力作用 D. 活动所需
8. 婴儿期每日每公斤体重所需能量为 ()
- A. 140kcal B. 130kcal
- C. 120kcal D. 110kcal
9. 可用于治疗注意力缺陷障碍伴多动症的药物是 ()
- A. 抗抑郁药 B. 中枢神经系统镇静剂
- C. 中枢神经系统兴奋剂 D. 催眠药
10. 麻疹的隔离期是 ()
- A. 隔离到起病后 1 周
- B. 隔离到出疹后 1 周
- C. 隔离到出疹后 5 天, 有并发症者隔离到出疹后 10 天
- D. 隔离到疹退后 5 天
11. 5 岁患儿急性菌痢 1 天, 高烧不退、嗜睡、呕吐, T39°C, 血压 106 / 64mmHg, 1 小时前突然抽搐 1 次表现为四肢抽动, 约持续 10 分钟, 抽搐后不醒。最可能为 ()
- A. 高热惊厥 B. 中毒性脑病
- C. 水、电解质紊乱 D. 低钙抽搐
12. 新生儿生后 2~3 天出现的黄疸, 最可能为 ()
- A. 母婴 ABO 血型不合 B. 新生儿肝炎
- C. 新生儿胆道闭锁 D. 新生儿生理性黄疸
13. 婴儿期出现心力衰竭的患儿最可能是患有 ()
- A. 房间隔缺损 B. 室间隔缺损
- C. 法洛三联症 D. 风湿性心脏病
14. 预防小儿结核病的方法是 ()
- A. 及时发现患者 B. 普种卡介苗
- C. 隔离治疗患者及普种卡介苗 D. 对小儿进行预防性化疗
15. 符合特发性生长激素缺乏症患儿的临床表现是 ()
- A. 出生时身高、体重偏低 B. 骨成熟提前, 身高矮小
- C. 青春发育期提前 D. 智力正常
16. 百日咳痉咳期主要临床特点是 ()
- A. 阵发性痉挛性咳嗽 B. 高热
- C. 咳嗽日重夜轻 D. 白细胞数增高, 以中性粒细胞为主
17. 小儿生长发育最快的时期是 ()
- A. 婴儿期 B. 幼儿期
- C. 学龄前期 D. 学龄期

18. 接种活疫苗、菌苗时，消毒皮肤应采用（ ）
A. 2%碘酊 B. 75%乙醇
C. 1%新洁尔灭 D. 95%乙醇
19. 法洛氏四联症常见合并症为（ ）
A. 心力衰竭 B. 肺炎
C. 肺水肿 D. 脑血栓
20. 治疗肺炎支原体肺炎应选择（ ）
A. 青霉素 B. 先锋 V
C. 庆大霉素 D. 红霉素
21. 急性肾小球肾炎前驱感染最常见的病原体是（ ）
A. A 组 β -溶血性链球菌 B. 金黄色葡萄球菌
C. 肺炎链球菌 D. 大肠杆菌
22. 属于散居儿童保健工作内容的是（ ）
A. 新生儿访视 B. 入园前体检
C. 每日晨检 D. 设立隔离室
23. 蛔虫病的主要感染途径是（ ）
A. 血液 B. 呼吸道
C. 中间宿主 D. 虫卵经口吞入
24. 3 岁患儿家住农村，自己在家玩耍，家长回家后发现患儿呼吸急促，无力，神志不清，躺卧地上，流涎、出汗，肌肉纤维颤动。就诊后怀疑中毒，最可能的是（ ）
A. 毒蕈中毒 B. 阿托品中毒
C. 有机磷中毒 D. 一氧化碳中毒
25. 一个出生体重为 2.8kg 的 6 个月婴儿，使用激素治疗， $2\text{mg}/\text{kg}/\text{日}$ ，其全日剂量约为（ ）
A. 10mg B. 12mg
C. 14mg D. 16mg
26. 6 个月婴儿，人工喂养，未添加辅食，1 个月来，皮肤粘膜苍白，肝脏肋下 2cm，脾肋下 1cm，查血 Hb75g/L，涂片红细胞大小不一，以小细胞为主，中心淡染区扩大，该患儿是（ ）
A. 营养性缺铁性贫血 B. 溶血性贫血
C. 再生障碍性贫血 D. 营养性巨幼红细胞贫血
27. 小儿“生理性贫血”多见于（ ）
A. 出生后 2~3 个月 B. 出生后 4~5 个月
C. 出生后 6~10 个月 D. 出生后 10~12 个月
28. 患儿 6 个月，发热咳嗽 2 天，体温 39.2°C ，心率 148 次/分，呼吸 32 次/分，该患儿首要的护理诊断是（ ）
A. 营养失调 B. 液体不足
C. 体温过高 D. 气体交换受损
29. 在护理腹泻补液的患儿时，如输液后患儿出现乏力、腹胀、肠鸣音减弱、腱反射消失、心音低钝，应考虑（ ）
A. 低钾血症 B. 低氯血症
C. 低钙血症 D. 低镁血症
30. 一个婴儿，能翻身，能独坐，能发“爸爸”、“妈妈”等复音但无意识，能握饼干吃，能听懂自己的名字，其最可能的年龄是（ ）
A. 7 个月 B. 8 个月
C. 10 个月 D. 12 个月

二、填空题（本大题共 6 小题，每空 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31. 新生儿期内应进行的预防接种是_____和_____。
32. 支气管肺炎多见于_____岁以下婴儿幼儿，葡萄球菌肺炎多见于_____及婴幼儿。
33. 产后最初_____天内的乳汁为初乳，富含免疫球蛋白_____，能有效抵抗病原微生物的侵袭，最适合新生儿需要。
34. 新生儿生后 Apgar 评分 4~7 分可判断为_____。
35. 结核性脑膜炎常在结核原发感染后_____发生，多见于_____小儿。
36. 苯丙酮尿症患者饮食控制至少持续至_____以后。

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

37. 原发型肺结核
38. 正常出生体重儿
39. 慢性腹泻
40. 高热惊厥
41. 哮喘持续状态

四、简答题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

42. 简述水痘患儿皮肤的护理措施。
43. 简述急性颅内压增高的临床表现。
44. 简述洋地黄治疗心力衰竭有疗效的指标。
45. 简述新生儿体温调节特点。
46. 简述急性肾小球肾炎患儿休息与运动的指导内容。
47. 简述计划免疫所用制剂的类型，每种类型请举例说明。

五、论述题（本大题共 1 小题，15 分）

48. 患儿，男，10 个月，新生儿期即发现紫绀，逐渐加重，2 天前入院检查发现：生长发育稍落后，能站立，扶着能走，但不喜活动，皮肤粘膜均紫绀，有杵状（鼓槌状）指（趾）Hb200g/L，诊为先天性心脏病法洛四联症。

- (1) 解释法洛四联症包括哪些畸形，其中哪个对病理生理和临床表现有最重要的影响？（5 分）
- (2) 列出本病例的主要护理诊断。（6 分）
- (3) 患儿出现阵发性呼吸困难（缺氧发作）时护士应给予何种处理？（3 分）
- (4) 护理时要特别注意保证患儿液体摄入量，是为了预防何种并发症？（1 分）