

- C.极性增高 D.脂 / 水分布系数增大
- 5.决定药物每天用药次数的主要因素是 ()
A.作用强弱 B.吸收快慢
C.体内分布速度 D.体内消除速度
- 6.先天性遗传异常对药物动力学影响主要表现在 ()
A.口服吸收速度不同 B.药物体内生物转化异常
C.药物体内分布差异 D.肾排泄速度
- 7.合成多巴胺和去甲肾上腺素的始初原料是 ()
A.谷氨酸 B.酪氨酸
C.蛋氨酸 D.赖氨酸
- 8.乙酰胆碱作用的主要消除方式是 ()
A.被单胺氧化酶所破坏 B.被磷酸二酯酶破坏
C.被胆碱酯酶破坏 D.被氧位甲基转移酶破坏
- 9.有机磷酸酯类中毒者反复大剂量注射阿托品后,原中毒症状缓解或消失,但又出现兴奋、心悸、瞳孔扩大、视近物模糊、排尿困难等症状,此时应采用 ()
A.山莨菪碱对抗新出现的症状 B.毛果芸香碱对抗新出现的症状
C.东莨菪碱以缓解新出现的症状 D.继续应用阿托品可缓解新出现症状
- 10.伴有冠心病的哮喘发作病人,宜选用 ()
A.异丙肾上腺素 B.沙丁胺醇
C.麻黄碱 D.氨茶碱
- 11.具有舒张肾血管的拟肾上腺素药是 ()
A.间羟胺 B.多巴胺
C.去甲肾上腺素 D.肾上腺素
- 12.治疗鼻炎、鼻窦炎出现的鼻粘膜充血,选用的滴鼻药是 ()
A.去甲肾上腺素 B.肾上腺素
C.异丙肾上腺素 D.麻黄碱
- 13.治疗外周血管痉挛性疾病的药物是 ()
A.拉贝洛尔 B.酚苄明
C.普萘洛尔 D.美托洛尔
- 14.下述关于局麻药对神经纤维阻断现象,有一项是错的 ()
A.注射到感染的组织作用会减弱
B.纤维直径越细作用发生越快
C.对感觉神经纤维作用比运动神经纤维强
D.纤维直径越细作用恢复也越快
- 15.应用巴比妥类所出现的下列现象中有一项是错的 ()
A.长期应用会产生身体依赖性
B.酸化尿液会加速苯巴比妥的排泄
C.长期应用苯巴比妥可加速自身代谢
D.大剂量的巴比妥类对中枢抑制程度远比苯二氮类要深
- 16.下述药物中哪种治疗肌痉挛最有效? ()
A.丙戊酸钠 B.苯巴比妥
C.苯妥英钠 D.乙琥胺

- 30.主要毒性为视神经炎的抗结核药物是 ()
A.利福平 B.链霉素
C.异烟肼 D.乙胺丁醇
- 31.关于利多卡因, 下述哪一项是错误的? ()
A.促进复极相 K^+ 外流, APD 缩短
B.抑制 4 相 Na^+ 内流, 降低自律性
C.加快缺血心肌的传导速度
D.主要作用于心室肌和浦氏纤维
- 32.主要使窦房结、房室结的自律性降低, 传导速度减慢, ERP 延长的药物是 ()
A.利多卡因 B.美西律
C.苯妥英钠 D.维拉帕米
- 33.关于洛伐他丁的叙述, 哪一项是错误的? ()
A.是原发性高胆固醇血症, II 型高脂蛋白血症的首选药
B.糖尿病性、肾性高脂血症的首选药
C.杂合子家族性高胆固醇血症的首选药
D.可降低纯合子家族性高胆固醇血症者的 LDL-C
- 34.下列关于碳酸氢钠不正确的应用是 ()
A.促进阿司匹林在胃中的吸收 B.较少用于中和胃酸
C.促进苯巴比妥从尿中排泄 D.增强庆大霉素的抗菌作用
- 35.广谱抗真菌药是 ()
A.制霉菌素 B.灰黄霉素
C.二性霉素 B D.氟康唑
- 36.糖皮质激素所引起的不良反应的不正确项是 ()
A.高血压 B.高血糖
C.高血钾 D.低血钙
- 37.甲亢术前准备正确给药应是 ()
A.先给碘化物, 术前两周再给硫脲类 B.只给硫脲类
C.先给硫脲类, 术前两周再给碘化物 D.只给碘化物
- 38.易造成乳酸血症的降血糖药是 ()
A.格列吡嗪 B.二甲双胍
C.格列本脲 D.甲苯磺丁脲
- 39.临床治疗钩端螺旋体病首选 ()
A.红霉素 B.氯霉素
C.四环素 D.大剂量青霉素 G
- 40.鼠疫首选药物是 ()
A.庆大霉素 B.林可霉素
C.红霉素 D.链霉素
- 41.红霉素的主要不良反应除胃肠道反应外还有 ()
A.肝、肾损害 B.肝损害、刺激性强
C.肾损害、刺激性强 D.骨髓抑制、肝损害
- 42.磺胺类药对下列不敏感的细菌是 ()
A.砂眼衣原体 B.溶血性链霉素
C.梅毒螺旋体 D.脑膜炎双球菌

