

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看，不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

真题串讲班：以考试大纲为主导，对各章节知识点进行全面梳理讲解，突出考试重点、难点与考点，教授答题思路与方法，通过对课程的整体情况分析近 2 次考试的真题讲解，帮助考生更准确地把握考试方向，做好考前最后冲刺，为考生顺利通过考试铺平道路。串讲班课程在考前一个月左右开通。[立即报名！](#)

习题班：自考 365 网校与北大燕园合作推出，每门课程均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格退还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

自考精品班：全力打造专属于学员个人的辅导计划，学员自入学当天便开始享受专属于自己的个性化辅导课程，专职教学辅导老师及班主任全程跟踪学员的学习情况，随时调整辅导方案，以保证学习计划的有效进行。帮助学员克服可能出现的学习上的怠倦、不良情绪的影响等情况。坚定考试必胜信念，并以最适合自己的方式，在短时间内掌握考试内容，全面提升学员的考试通过率。我们承诺，当期考试不通过，下期学费减半！[立即报名！](#)

全国 2010 年 1 月高等教育自学考试 外科护理学（一）试题 课程代码：03001

一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 手术切开皮肤时刀刀的方向应与皮肤（ ）
A. 垂直
B. 呈 30°角
C. 呈 45°角
D. 呈 60°角
2. 某建筑工人在工地因意外导致开放性气胸，手术后应选取的引流物是（ ）
A. 橡皮片引流条
B. 纱条引流
C. 烟卷引流
D. 橡胶管引流
3. 一全麻病人术后返回病室时神志清楚，半小时后出现频繁呕吐，可能的原因是：（ ）
A. 麻醉药物副作用
B. 急性胃扩张

- C.水、电解质紊乱
D.胃肠功能受抑制
- 4.含量对细胞外液量的增减起主导作用的离子是（ ）
A.钠离子
B.钾离子
C.氯离子
D.碳酸氢根离子
- 5.抗休克治疗最根本的措施是（ ）
A.补充血容量
B.治疗原发疾病
C.纠正酸碱平衡失调
D.应用血管活性药物
- 6.甲亢病人术前准备，尚未达到手术指征的是（ ）
A.情绪稳定
B.体重增加
C.脉率每分钟 90 次以下
D.基础代谢率+20%~+30%之间
- 7.女性，41 岁，诊断为乳腺癌。其癌肿直径为 4cm，同侧腋窝有肿大淋巴结，尚能推动，无远处转移。根据 TNM 分期法，该病人的临床分期为（ ）
A.I 期
B.II 期
C.III 期
D.IV 期
- 8.男性，4 小时前负重物时，右侧腹股沟斜疝嵌顿，表明疝内容物已发生缺血坏死的临床表现是（ ）
A.局部疼痛加重
B.疝块压痛、变硬
C.呕吐频繁
D.全腹有压痛，腹肌紧张
- 9.急性腹膜炎最主要的症状是（ ）
A.发热
B.腹痛
C.恶心呕吐
D.黄疸
- 10.溃疡病幽门梗阻病人最突出的症状是（ ）
A.上腹饱胀
B.呕吐宿食
C.营养不良
D.胃痛
- 11.高位小肠梗阻易引起的病理生理改变是（ ）
A.水电解质紊乱
B.感染中毒
C.肠腔膨胀
D.休克
- 12.早期阑尾炎最重要的诊断依据是（ ）
A.腹痛
B.右下腹固定点压痛
C.白细胞升高
D.腹膜刺激征阳性
- 13.女性，50 岁，腹胀、腹痛，大便不成形，每日排便 3~4 次，有脓血便。查体：左中腹可扪及包块，边界不清，为明确诊断应做（ ）
A.乙状结肠镜检查
B.B 超检查
C.CT 检查
D.大便常规检查

- 14.一胆管结石病人，行胆总管切开取石术后第 5 日，护士突然发现其 T 管引流出的胆汁颜色浑浊，应高度怀疑病人出现（ ）
- A.肝功能受损
B.胆道感染
C.胆道有残留结石
D.胆汁引流不畅
- 15.脾切除术后不用维生素 K 的原因是（ ）
- A.此手术后没有出血的风险
B.术后血小板升高，有诱发血栓的风险
C.维生素 K 对此类病人的止血效果不好
D.可能诱发肝性脑病
- 16.夏柯三联症病人出现寒战高热，一般其发热的热型为（ ）
- A.稽留热
B.间歇热
C.回归热
D.弛张热
- 17.急性胰腺炎病人在止痛时禁用吗啡的原因是吗啡可引起（ ）
- A.呼吸抑制
B.尿潴留
C.Oddi 括约肌收缩
D.恶心呕吐
- 18.临床常用的判断深静脉是否通畅的检查是（ ）
- A.Perthes 试验
B.Trendelenburg 试验
C.踝 / 肱指数测定
D.下肢静脉压测定
- 19.肘关节的功能位应为（ ）
- A.外展 90 度
B.内旋 90 度
C.屈曲 90 度
D.外旋 90 度
- 20.骨折后，反复多次手法复位常见的严重并发症是（ ）
- A.骨折愈合延迟
B.骨折移位
C.皮肤坏死
D.脂肪栓塞
- 21.男性，12 岁，左大腿下段持续疼痛伴高热 10 天，寒战、头痛。查体：左大腿下段稍肿，局部皮温高。怀疑为急性骨髓炎，为确诊应选择的检查是（ ）
- A.X 线摄片
B.局部分层穿刺
C.血常规检查
D.膝关节穿刺
- 22.成骨肉瘤易转移到的器官是（ ）
- A.肾
B.脑
C.肺
D.肝
- 23.关于骨性关节炎的陈述正确的是（ ）
- A.原发病损是透明软骨退行性改变
B.关节疼痛活动后加剧，休息时减轻

- C.患病早期要绝对卧床休息
D.可使用抗生素对抗关节炎症反应
- 24.最易出现昏迷—清醒—再昏迷临床表现的是 ()
A.脑震荡
B.脑挫裂伤
C.硬膜外血肿
D.硬膜下血肿
- 25.在抢救张力性气胸病人时,可用一粗针头刺入胸膜腔排气。通常穿刺部位是 ()
A.受伤的部位
B.伤侧第 2 肋间锁骨中线处
C.伤侧叩诊鼓音明显处
D.伤侧腋中线和腋后线之间的第 6~8 肋间隙
- 26.诊断肺癌最常用的手段是 ()
A.痰细胞学检查
B.支气管镜检查
C.胸部 X 线检查
D.胸腔积液细胞学检查
- 27.男性,50 岁。食管部分切除、食管—胃吻合术后第 7 天,进食后出现寒战、高热、呼吸困难、胸痛,胸部 X 线检查发现手术侧胸腔积液,可能出现的并发症是 ()
A.肺炎、肺不张
B.乳糜胸
C.吻合口瘘
D.吻合口狭窄
- 28.后尿道损伤最常见的原因是 ()
A.枪弹、锐器伤
B.腰部撞击伤
C.骨盆骨折
D.盆腔手术
- 29.男性,68 岁,尿频、夜尿多、排尿不畅 4 年,因急性尿潴留急诊就诊,确诊为前列腺增生症。为进一步了解尿道梗阻的情况还应进行的检查是 ()
A.尿动力学检查
B.血常规
C.尿常规
D.膀胱造影
- 30.决定膀胱癌预后的主要因素是 ()
A.肿瘤浸润深度
B.肿瘤组织类型
C.肿瘤的数目
D.肿瘤的大小

二、填空题(本大题共 10 小题,每空 1 分,共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 31.良性骨肿瘤的 X 线表现为骨内呈_____生长、边界明显,骨皮质_____和无骨膜反应。
- 32.尿三杯试验,若第一杯尿液异常,提示病变在_____;若第三杯异常,提示病变在_____。
- 33.全肺切除病人最适宜的体位是_____;禁忌的体位是_____。
- 34.对于开放性气胸者应首先用_____封盖伤口,使之成为_____性气胸。

- 35.正常颅内压可随生命体征中血压和_____而有细微的变化，颅内压的生理调节主要通过_____来实现。
- 36.对急性胰腺炎有重要诊断价值的胰酶测定包括_____、尿淀粉酶和_____。
- 37.毕 I 式胃大部切除术是将残胃与_____吻合，毕 II 式胃大部切除术是将残胃与_____吻合。
- 38.腹膜炎发生后，其转归取决于_____、_____和治疗效果。
- 39.外科最常见的休克类型是_____和_____。
- 40.烧伤深度估计的方法临床常用_____，其中浅 II 度烧伤和深 II 度烧伤的共同特点是_____。

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 41.酒窝征
42. 肾绞痛
43. 肛裂三联症
44. 腹股沟斜疝
45. 中心静脉压

四、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

46. 简述颅内压增高病人咳嗽痰多时的呼吸道护理措施。
47. 简述 T 管留置期间的护理要点。
48. 简述避免肠内营养支持病人出现误吸的护理措施。

五、病例分析题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

49.女性 28 岁，外伤后腰痛向右下肢放射 1 周，二便正常。查体：身高 160cm，体重 70kg，腰椎左凸畸形，第 4、5 腰椎右侧压痛并放射至右小腿，右下肢直腿抬高试验（+）。

- 问：（1）该病人可能的医疗诊断和目前的治疗原则是什么？
- （2）治疗过程中如何防止废用综合症？
- （3）该病人健康教育要点是什么？

50.女性，38 岁，因颈部弥漫性肿大、多汗、食欲亢进 4 个月入院，诊断为原发性甲状腺功能亢进。经术前准备后行甲状腺大部切除术。术后第 1 天，病人体温高达 39.5℃，心率 135 次 / 分，呼吸 28 次 / 分，出现大汗，烦躁，呕吐，腹泻 3 次，为水样便。

- 问：（1）病人目前出现何种并发症？分析可能的原因是什么？
- （2）列出病人目前存在的两个主要的护理诊断 / 问题。
- （3）如何处理该并发症？