

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

**开设班次：**（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

**网校推荐课程：**

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

## 全国 2010 年 10 月高等教育自学考试 儿科护理学(二)试题 课程代码：03011

### 一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 按照艾瑞克森的心理社会发展理论，0~1 岁小儿的主要心理社会发展问题是( )  
A. 自主对羞怯  
B. 信任对不信任  
C. 主动对内疚  
D. 勤奋对自卑
- 一小儿身高 80cm，体重 11kg、头围 47cm、胸围 48cm，其年龄约是( )  
A. 1 岁  
B. 1.5 岁  
C. 2 岁  
D. 2.5 岁
- 3.5 岁小男孩的正常身高平均是( )  
A. 95cm  
B. 100cm  
C. 105cm  
D. 115cm
- 下列有关接种卡介苗的描述中不正确的是( )  
A. 接种卡介苗用于预防结核病  
B. 接种方法为皮下注射  
C. 接种部位是左上臂三角肌上端  
D. 初种次数为 1 次
- 百白破混合疫苗初次免疫时需注射的次数为( )  
A. 每周 1 次，注射 2 次  
B. 每周 1 次，注射 3 次

- C.每月 1 次，注射 2 次  
D.每月 1 次，注射 3 次
- 6.小儿禁用的镇静止惊药物是( )  
A.水合氯醛  
B.苯巴比妥  
C.吗啡  
D.地西洋
- 7.住院儿童开始出现分离性焦虑的年龄阶段是( )  
A.婴儿期  
B.幼儿期  
C.学龄前期  
D.学龄期
- 8.新生儿破伤风最具特征性的临床表现是( )  
A.意识改变  
B.肌张力变化  
C.呼吸困难  
D.苦笑面容
- 9.生后 4 天的 Rh 溶血症患儿，出现嗜睡、尖声哭叫、肌张力下降，胆红素上升至  $342\mu\text{mol/L}$ ，该患儿可能发生了( )  
A.新生儿颅内出血  
B.新生儿呼吸衰竭  
C.新生儿胆红素脑病  
D.新生儿化脓性脑膜炎
- 10.当新生儿出现严重低血钙时应尽量减少刺激，其目的是防止诱发( )  
A.惊厥  
B.喉痉挛  
C.呼吸加快  
D.心率减慢
- 11.下列维生素 D 中活性最强的是( )  
A.维生素 D<sub>2</sub>  
B.25—羟胆骨化醇  
C.维生素 D<sub>3</sub>  
D.1, 25—二羟胆骨化醇
- 12.秋季腹泻的病原体是( )  
A.大肠杆菌  
B.轮状病毒  
C.金黄色葡萄球菌  
D.耶尔森氏菌
- 13.正常新生儿胃容量为( )  
A.15~25ml  
B.30~60ml  
C.70~80ml  
D.80~100ml
- 14.引起小儿肺炎最常见的病毒是( )  
A.腺病毒  
B.柯萨奇病毒  
C.流感病毒  
D.呼吸道合胞病毒
- 15.小儿肺炎最常见的病理类型是( )  
A.大叶性肺炎  
B.支气管肺炎

- C.间质性肺炎  
D.毛细支气管炎
- 16.目前治疗支气管哮喘最有效的药物是( )  
A.茶碱类药物  
B.抗胆碱药物  
C.肾上腺皮质激素  
D.抗生素
- 17.病毒性心肌炎患儿在急性期应至少卧床休息至热退后( )  
A.1~2 周  
B.3~4 周  
C.5~6 周  
D.7~8 周
- 18.法洛四联症患儿出现缺氧发作时应该采取的体位是( )  
A.平卧位  
B.俯卧位  
C.侧卧位  
D.膝胸卧位
- 19.引起小儿急性肾小球肾炎最常见的病原体是( )  
A.肺炎球菌  
B.金黄色葡萄球菌  
C.流感病毒  
D.A 组  $\beta$  型溶血性链球菌
- 20.世界卫生组织制订的 6 个月~6 岁小儿 Hb 正常值的低限为( )  
A.90g / L  
B.100g / L  
C.110g / L  
D.120g / L
- 21.下列有关营养性缺铁性贫血的描述不正确的是( )  
A.是一种大细胞性贫血  
B.6 个月至 2 岁的小儿发病率最高  
C.铁摄入量不足是主要原因  
D.口服铁剂治疗最好安排在两餐之间服药
- 22.母乳喂养小儿比人工喂养小儿少患呼吸道及消化道感染，是因为母乳中含有大量的( )  
A.SIgA  
B.IgM  
C.IgG  
D.IgE
- 23.原发性免疫缺陷病的主要特征为( )  
A.发热  
B.经常反复感染  
C.免疫球蛋白降低  
D.周围淋巴细胞数量减少
- 24.风湿热患儿无心脏炎者，其卧床休息的时间为( )  
A.1 周  
B.2 周  
C.3 周  
D.4 周
- 25.为避免苯丙酮尿症患儿智力低下，开始给予低苯丙氨酸饮食的时间最好是在出生后( )

- A.3 个月内  
C.9 个月内
- B.6 个月内  
D.12 个月内
- 26.猩红热患儿口腔粘膜改变表现为( )  
A.粘膜白色斑点  
C.杨梅舌  
B.咽部红色小疹  
D.软腭红色小斑点
- 27.小儿结核性脑膜炎最常发生在结核原发感染后( )  
A.1 个月以内  
C.2 年以内  
B.1 年以内  
D.3 年以内
- 28.下列维生素 D 缺乏性手足搐搦症的临床表现中, 可以导致生命危险的是( )  
A.手足搐搦  
C.喉痉挛  
B.面神经征(+)  
D.惊厥
- 29.流行性腮腺炎的主要临床特征为( )  
A.痛性腮腺肿大  
C.咀嚼困难  
B.发热  
D.头痛
- 30.使用甘露醇治疗时, 以下护理措施不正确的是( )  
A.用前要先加温使结晶溶解  
B.每次剂量为 0.5~1g/kg  
C.缓慢静滴以免加重心脏负担  
D.静脉注射时要注意不溢出血管外, 以免组织坏死

## 二、填空题(本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 31.由头顶至\_\_\_\_\_的长度称坐高。\_\_\_\_\_岁以下儿童取仰卧位测量身高。
- 32.小儿脊柱发育过程中第 2 个弯曲是\_\_\_\_\_, 出现的时间是\_\_\_\_\_月后。
- 33.维生素 C 缺乏病又称坏血病, 主要临床表现为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 34.典型化脓性脑膜炎, 脑脊液检查时可见脑脊液压力增高, 外观\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_计数显著增多。
- 35.在小儿特异性免疫反应中, T 淋巴细胞主要担负\_\_\_\_\_功能, B 淋巴细胞主要担负\_\_\_\_\_功能。

## 三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

- 36.急性颅内压增高
- 37.混合喂养
- 38.生理性贫血
- 39.免疫缺陷病
- 40.急性呼吸衰竭

**四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)**

- 41.简述婴幼儿易患腹泻的因素。
- 42.简述左向右分流型先天性心脏病共同的临床症状。
- 43.简述原发性肾病综合征患儿的护理要点。
- 44.简述中毒型细菌性痢疾的护理措施。
- 45.列出心跳呼吸骤停的诊断依据。

**五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)**

46.12 个月婴儿, 体重低于正常均值 35%, 腹部皮褶厚度 0.3cm, 身高低于正常, 消瘦明显, 肌张力明显降低, 肌肉松弛。请根据以上资料:

- (1)写出该患儿最可能的医疗诊断。
- (2)写出主要护理措施。

47.患儿, 5 岁, 发热一周, 为不规则热, 疲乏无力, 食欲不振, 3 天来出现皮肤针尖大小的瘀斑, 曾鼻衄 2 次, 刷牙时有牙龈出血。查体: 精神萎靡, 面色苍白, 前胸及四肢有散在尖针大小瘀斑, 全身表浅淋巴结呈轻度肿大(黄豆大至蚕豆大), 肝肋下 3cm, 质软, 有压痛, 脾肋下 2cm, 质软。化验 血常规 Hb 65g/L, RBC $2.4 \times 10^{12} / L$ , WBC $15 \times 10^9 / L$ , 分类: 淋巴占 85%, 可见幼稚淋巴细胞。骨髓象: 原始淋巴细胞及早幼淋巴细胞极度增生, >30% 以上。

- (1)写出该患儿最可能的临床诊断。
- (2)列出 4 个主要护理问题。
- (3)列出主要护理措施。