



6.女性, 27 岁。产后 3 周, 右乳外上象限有一浅表脓肿形成, 做脓肿切开引流时, 应采取的切口是 ( )

- A. “十”字形切口  
B. “一”字形切口  
C.放射状切口  
D.弧形切口

7.绞窄性疝与嵌顿性疝的主要区别是 ( )

- A.疝内容物有无血运障碍  
B.疝块有无压痛  
C.是否出现肠梗阻  
D.疝内容物能否回纳

8.原发性腹膜炎和继发性腹膜炎的区别主要在于 ( )

- A.腹痛的性质  
B.腹腔内有无原发病灶  
C.致病菌的种类  
D.感染的严重程度

9.消化性溃疡的最重要的发病因素是 ( )

- A.胃酸分泌过多  
B.幽门螺杆菌感染  
C.粘膜防御机制破坏  
D.长期精神压力

10.因粘连带压迫造成的肠梗阻属于 ( )

- A.机械性肠梗阻  
B.动力性肠梗阻  
C.麻痹性肠梗阻  
D.压迫性肠梗阻

11.急性阑尾炎病人最常见的体征是 ( )

- A.右下腹压痛  
B.腹膜刺激征  
C.右下腹包块  
D.结肠充气试验阳性

12.男性, 24 岁, 出现肛门周围持续性跳痛, 皮肤硬结红肿 4 天, 并有局部压痛, 可能出现了 ( )

- A.肛裂  
B.外痔  
C.肛门周围脓肿  
D.低位肛瘘

13.对诊断原发性肝癌有较高特异性的检查是 ( )

- A.B 超  
B.选择性肝动脉造影  
C.甲胎蛋白测定  
D.CT

14.门静脉高压症最凶险的并发症是 ( )

- A.肝性脑病  
B.上消化道大出血  
C.低蛋白血症  
D.贫血

15.胆囊结石并发急性胆囊炎病人的腹痛常表现为 ( )

- A.右上腹部疼痛并向左肩部放射  
B.胸骨后疼痛并向左肩部放射  
C.右上腹部疼痛并向右肩部放射  
D.脐周疼痛

16.急性胰腺炎病人脐周出现大片青紫色瘀斑的原因是 ( )

- A.上消化道大出血  
B.胰液渗入到皮下溶解脂肪造成出血  
C.凝血功能障碍  
D.急性腹膜炎

17.属于IV期血栓闭塞性脉管炎表现的是 ( )

- A.患肢皮温低于 35℃  
B.趾端发黑、坏疽  
C.皮肤干燥、脱屑  
D.踝/肱指数<0.5
- 18.颅内压增高最常见的首发症状是 ( )  
A.头痛  
B.呕吐  
C.视神经乳头水肿  
D.意识障碍
- 19.某建筑工人从高墙摔下,枕部着地,当场昏迷,10 分钟后清醒,被他人送往医院,途中诉头痛,后头痛渐加重并伴呕吐,入院 1 小时后再次出现意识丧失。该病人可能的医疗诊断是 ( )  
A.急性硬脑膜外血肿  
B.急性硬脑膜下血肿  
C.脑震荡  
D.脑挫裂伤
- 20.食管癌多发生在食管的 ( )  
A.颈段  
B.上胸段  
C.中胸段  
D.下胸段
- 21.关于潮气量的描述正确的是 ( )  
A.成人潮气量约 12~17ml / kg  
B.潮气量上升常见于肺梗塞病人  
C.潮气量上升可见于酸中毒的病人  
D.潮气量是深呼吸状态下每呼或吸一次的气流量
- 22.尿三杯试验中,第 3 杯尿液异常,提示病变可能在 ( )  
A.前尿道  
B.后尿道  
C.输尿管  
D.肾
- 23.男性,38 岁。右腰部受到暴力撞击后,出现腰部胀痛,明显血尿,诊断为右肾轻度裂伤,采用非手术治疗。对该病人的护理不正确的是 ( )  
A.绝对卧床休息  
B.使用止血药  
C.使用抗生素  
D.血尿消失后即可下床活动
- 24.预防泌尿系结石形成和增大的最有效的方法是 ( )  
A.预防泌尿系感染  
B.解除尿路梗阻  
C.多活动  
D.大量饮水
- 25.用于常规查体以发现早期肾癌的简便方法是 ( )  
A.排泄性尿路造影  
B.逆行尿路造影  
C.B 超检查  
D.CT 检查
- 26.等长运动是指 ( )  
A.肌肉收缩时张力增加,但关节不发生明显的运动  
B.应用计算机程序控制的一种锻炼方式  
C.关节肌肉在一定速度下进行的运动

- D.一种对抗固定阻力的运动，肌肉长度改变，阻力不变
- 27.某病人做投掷动作时，造成肱骨内上髁骨折，其原因属于（ ）
- A.积累性骨折  
B.间接暴力  
C.直接暴力  
D.病理性骨折
- 28.男性，30岁，郊游时不慎摔伤颈部，伤情不详，正确的搬运方法是（ ）
- A.让病人坐在自行车后座  
B.背着病人  
C.扶着病人  
D.让病人平躺在门板上
- 29.恶性骨肿瘤最常见的并发症是（ ）
- A.关节僵硬  
B.病理性骨折  
C.浅静脉怒张  
D.贫血
- 30.骨性关节炎原发病损是（ ）
- A.先天性关节畸形  
B.关节面创伤  
C.透明软骨的退行性改变  
D.关节炎

## 二、填空题(本大题共 10 小题，每空 1 分，共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 31.热力灭菌法中，效果最可靠的方法是\_\_\_\_\_，能杀灭\_\_\_\_\_微生物。
- 32.可以被人体组织吸收的缝线有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 33.高钾血症最严重的后果是\_\_\_\_\_；临床上通常用\_\_\_\_\_离子对抗高钾血症的危害。
- 34.三头肌皮褶厚度是反映\_\_\_\_\_的营养指标，动态监测营养治疗效果的最好方法是\_\_\_\_\_。
- 35.乳腺癌常见的淋巴转移途径包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 36.胃溃疡的好发部位是\_\_\_\_\_，十二指肠溃疡的好发部位是\_\_\_\_\_。
- 37.阿米巴肝脓肿是\_\_\_\_\_最常见的并发症，以\_\_\_\_\_治疗为主。
- 38.膀胱刺激症包括尿频、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 39.对急性骨髓炎有早期重要诊断意义的检查是\_\_\_\_\_；对化脓性关节炎有早期诊断意义的检查是\_\_\_\_\_。
- 40.膝关节半月板损伤病人术后过早负重会加重关节内的\_\_\_\_\_反应，最好在\_\_\_\_\_个月后开始负重行走。

## 三、名词解释(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

- 41.吸入麻醉
- 42.腹外疝
- 43.间歇性跛行
- 44.闭合性气胸
- 45.解剖复位

**四、简答题(本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)**

- 46.简述手术后切口疼痛的主要处理措施。
- 47.简述乳腺癌改良根治术后患侧上肢功能锻炼的方法。
- 48.简述颅脑损伤病人术后常见的并发症。

**五、病例分析题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)**

49.男性, 31 岁。饱餐后突然出现上腹部剧烈疼痛, 迅速波及全腹, 伴冷汗, 恶心, 呕吐胃内容物。体检: T36.9℃, P110 次/分, R24 次/分, BP80 / 60mmHg, 急性面容, 面色苍白, 全腹肌紧张, 腹膜刺激征(+), 肝浊音界消失, 移动性浊音(+).

问: (1)目前最可能的医疗诊断是什么?(1 分)

(2)目前主要的护理诊断 / 问题有哪些?(2 分)

(3)目前主要的护理措施有哪些?(7 分)

50.女性, 18 岁。发热 2 周, 右膝疼痛, 不敢负重行走。查体: 右膝关节处皮肤红肿、皮温高。X 线检查关节间隙增宽。诊断为化脓性膝关节炎, 给予抗生素治疗, 切开排脓及关节内置管冲洗。

问: (1)列出该病人目前 2 个主要的护理诊断 / 问题。(2 分)

(2)目前的护理措施有哪些?(8 分)