



右冠状动脉内植入药物涂层支架 1 枚, 护士应指导该患者应用抵克力得或氯吡格雷抗血小板聚集药物不少于( )

- A. 1 个月  
B. 2 个月  
C. 3 个月  
D. 6 个月

6. 治疗急性病毒性心肌炎最重要的措施是( )

- A. 休息  
B. 抗病毒治疗  
C. 抗生素应用  
D. 激素应用

7. 肝硬化食道、胃底静脉曲张破裂出血患者, 放置三(四)腔管后放气的间隔时间为( )

- A. 6 小时  
B. 12 小时  
C. 24 小时  
D. 36 小时

8. 肝硬化患者出现肝掌、蜘蛛痣的原因是( )

- A. 脾功能亢进  
B. 肝脏合成凝血因子能力下降  
C. 肝脏灭活雌激素能力下降  
D. 体内醛固酮水平增加

9. 绝大多数 IgA 肾病患者均有的临床表现是( )

- A. 轻中度蛋白尿  
B. 血尿  
C. 轻中度高血压  
D. 水肿

10. 缺铁性贫血患者铁剂治疗至血红蛋白正常后, 患者仍需继续服用铁剂 3~6 个月, 目的是( )

- A. 巩固血红蛋白水平  
B. 维持血清铁的水平  
C. 补足体内贮存铁  
D. 满足肌红蛋白需要

11. 目前多数学者认为再障主要发病机制是( )

- A. 造血微环境受损  
B. 免疫异常  
C. 造血干细胞缺乏  
D. 造血干细胞缺陷

12. 患者, 男性, 70 岁, 患糖尿病 5 年, 间断口服降糖药。近 5 天发烧、咳嗽、咳少量黄痰, 未予治疗。近一天口渴、乏力、多尿、纳差、恶心, 呼吸加深加快有烂苹果味, 急诊入院。查体 T38℃, 神清, 心率 110 次/分, 律整, 两肺散在干湿啰音, 余(一)。患者病情变化可能性最大的是( )

- A. 急性支气管炎  
B. 上呼吸道感染  
C. 酮症酸中毒  
D. 低血糖反应

13. 干燥综合征特征性的皮疹为( )

- A. 紫癜样皮疹  
B. 荨麻疹样皮疹  
C. 结节性红斑  
D. 蝶形红斑

14. 临床上最常用的判断肝细胞损害的重要指标是( )

- A. 血清谷丙转氨酶 (ALT)  
B. 天门冬氨酸转氨酶 (AST)  
C. 乳酸脱氢酶 (LDH)  
D. 碱性磷酸酶 (ALP)

15. 狂犬病患者特有的临床表现是 ( )

- A. 恐光  
B. 怕声

C. 恐水 D. 怕风

## 二、多项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16. 对肺炎球菌肺炎病人的护理, 正确的是( )
- A. 卧床休息, 避免疲劳 B. 鼓励多饮水  
C. 胸痛病人应取患侧卧位 D. 发热的病人应早期给予药物降温  
E. 重症及老年患者应予氧疗
17. 与动脉粥样硬化形成关系最密切的血脂异常包括( )
- A. 高胆固醇 B. 高甘油三酯  
C. 高低密度脂蛋白 D. 高极低密度脂蛋白  
E. 高高密度脂蛋白
18. 护士关于硝酸甘油用药护理的指导正确的是( )
- A. 口服片剂不宜嚼碎后含服 B. 服药后 3~5 分钟仍不缓解, 可再服 1 次  
C. 静滴时患者不可擅自调节滴速 D. 第 1 次用药, 应避免站立体位  
E. 应避光保存, 最好 1 年更换 1 次
19. 高血压的非药物治疗包括( )
- A. 限制钠摄入 B. 减轻体重  
C. 适量运动 D. 保持心理平衡  
E. 戒烟
20. 下列关于消化性溃疡饮食护理要点正确的是( )
- A. 活动期应少食多餐 B. 多饮用牛奶, 因其含蛋白质可中和胃酸  
C. 适量摄取脂肪 D. 避免粗糙、过冷、过热的食物  
E. 浓茶、咖啡可少量饮用
21. 发生颅内出血, 患者常进入昏迷, 紧急处理包括( )
- A. 立即将患者头偏向一侧, 保持呼吸道通畅  
B. 开放静脉遵医嘱给药  
C. 病情观察记录意识状态, 生命体征  
D. 保持皮肤清洁定时擦澡  
E. 保证营养、保持大便通畅
22. 甲亢病人伴浸润性突眼者的护理措施包括( )
- A. 经常点眼药水 B. 外出时戴茶色眼镜避免强光、灰尘刺激  
C. 睡前涂眼药膏, 戴眼罩 D. 低盐饮食, 以减轻眼球后水肿  
E. 卧床休息应头低脚高位



**四、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)**

- 43. 支气管哮喘
- 44. 心律失常
- 45. 溃疡性结肠炎
- 46. 戒断综合征
- 47. 癫痫

**五、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)**

- 48. 简述肺炎病人痰标本留取的注意事项。
- 49. 简述结肠镜检查前的护理措施。
- 50. 简述非重型再障(即慢性再障)患者使用丙酸睾酮治疗的副作用及其护理。
- 51. 简述 Graves 病甲状腺毒症致高代谢症候群、精神神经系统及消化系统的临床表现。

**六、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)**

52. 患者, 男性, 75 岁, 吸烟 50 年, 糖尿病史 15 年。今日清晨于睡眠中突然出现心前区压榨样疼痛, 舌下含服硝酸甘油不缓解, 疼痛持续 4 小时伴烦躁, 大汗及濒死感, 急诊入院。

查体: 心电图 V<sub>1</sub>-V<sub>5</sub> 导联 ST 段弓背向上抬高, 出现深而宽的 Q 波, 血清 cTnT(肌钙蛋白 T) 升高。医生诊断为急性心肌梗死, 并急诊经股动脉穿刺行介入治疗, 于左冠状动脉前降支狭窄处植入支架 1 枚。

请写出: (1) 导致该患者发生急性心肌梗死的主要危险因素。

(2) 患者急性心肌梗死的诊断依据。

(3) 患者行冠脉支架术后拔除动脉鞘管后休息与活动的护理。

53. 患者, 男性, 46 岁, 主因“眼睑浮肿 12 年, 恶心纳差半年, 加重一周”入院。12 年来患者常于晨起出现双侧眼睑浮肿未在意。半年来出现恶心, 纳差, 自行服用胃药无效。1 周前受凉后咳嗽、咳白痰, 伴水肿加重、乏力, 尿量减少, 每日尿量约 600ml。既往患“慢性肾炎”10 年。

查体: T38.2℃, BP130 / 80mmHg, 面色晦暗, 口唇、甲床苍白, 眼睑及颜面部水肿, 双足踝部轻度可凹性水肿。心、肺、腹未见异常。化验血常规示 Hb70g / L, 肾功能检查示肌酐清除率 15ml / min, 血尿素氮 22mmol / L, 血肌酐 650 μmol / L, 入院诊断为“慢性肾功能衰竭, 肾衰竭期(按我国慢性肾衰分期标准)”。

请写出: (1) 此次病情加重的诱因。

(2) 该患者肾衰竭期的分期依据。

(3) 护士对该患者蛋白质、盐、水的摄入指导。