

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

<a href="#">基础班</a>	<a href="#">申讲班</a>	<a href="#">精品班</a>	<a href="#">套餐班</a>	<a href="#">实验班</a>	<a href="#">习题班</a>	<a href="#">高等数学预备班</a>	<a href="#">英语零起点班</a>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------------

网校推荐课程：

<a href="#">思想道德修养与法律基础</a>	<a href="#">马克思主义基本原理概论</a>	<a href="#">大学语文</a>	<a href="#">中国近现代史纲要</a>
<a href="#">经济法概论（财经类）</a>	<a href="#">英语（一）</a>	<a href="#">英语（二）</a>	<a href="#">线性代数（经管类）</a>
<a href="#">高等数学（工专）</a>	<a href="#">高等数学（一）</a>	<a href="#">线性代数</a>	<a href="#">政治经济学（财经类）</a>
<a href="#">概率论与数理统计（经管类）</a>	<a href="#">计算机应用基础</a>	<a href="#">毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论</a>	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

全国 2011 年 10 月高等教育自学考试  
儿科护理学（二）试题  
课程代码：03011

**一、单项选择题(本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分)**

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 新生儿期是指（ ）  
A. 自出生脐带结扎到 1 周岁  
B. 自受孕到出生脐带结扎  
C. 自出生脐带结扎开始到生后 28 天  
D. 自出生后第一天到生后第 30 天
2. 婴儿开始能够有意识地叫出“爸爸”“妈妈”的月份是（ ）  
A. 6 个月  
B. 8 个月  
C. 10 个月  
D. 12 个月
3. 在婴儿饮食中添加米糊的适宜时间是生后（ ）  
A. 1~3 个月  
B. 4~6 个月  
C. 7~9 个月  
D. 10~12 个月
4. 一健康女婴，体重 6kg，使用 5%糖牛奶喂养，按能量需要计算其每日所需奶量约为（ ）  
A. 550ml  
B. 660ml  
C. 770ml  
D. 880ml
5. 一 5 个月的健康小儿，来保健门诊接受预防接种，他应当接种的疫苗是（ ）

- A. 卡介苗  
B. 乙肝第一针  
C. 脊髓灰质第二剂  
D. 百白破第三针
6. 营养性缺铁性贫血患儿在服用铁剂时应避免 ( )  
A. 与果糖同服  
B. 与牛奶同服  
C. 与氨基酸同服  
D. 与维生素 C 同服
7. 一早产儿生后 3 天体温 34℃, 无其他异常, 目前最主要的处理应是 ( )  
A. 应用激素  
B. 保暖  
C. 应用抗生素  
D. 补液及纠正酸中毒
8. 新生儿败血症最常见的并发症是 ( )  
A. 化脓性脑膜炎  
B. 骨髓炎  
C. 肝脓肿  
D. 肺炎
9. 维生素 D 缺乏性佝偻病患儿辅助检查常出现 ( )  
A. 血清白蛋白降低  
B. 碱性磷酸酶降低  
C. 钙磷乘积降低  
D. 血胆固醇降低
10. 佝偻病串珠表现最明显的肋骨是 ( )  
A. 1~2 肋  
B. 3~4 肋  
C. 5~6 肋  
D. 7~10 肋
11. 学龄前小儿使用鼻导管吸氧时, 氧气流量应为 ( )  
A. 1.0L / 分  
B. 2.0L / 分  
C. 3.0L / 分  
D. 4.0L / 分
12. 婴幼儿急性感染性喉炎的典型特征是 ( )  
A. 起病急  
B. 发热  
C. 犬吠样咳嗽  
D. 呼气性呼吸困难
13. 诊断支气管哮喘是否有气流受限的辅助检查是 ( )  
A. 肺功能测定  
B. 胸部 X 线检查  
C. 白细胞计数和分类  
D. 过敏原测试
14. 长期控制哮喘的首选药物是 ( )  
A. 吸入型糖皮质激素  
B. 白三烯调节剂  
C. 缓释茶碱  
D. 抗生素
15. 一腹泻伴脱水患儿经补液后已排尿, 按医嘱继续补液 5% 葡萄糖 300ml, 此时最多可加入 10% 氯化钾 ( )  
A. 3ml  
B. 4.5ml  
C. 6ml  
D. 9ml
16. 小儿重型腹泻与轻型腹泻的主要区别为是否出现 ( )

- A. 水样大便  
B. 发热、呕吐  
C. 腹痛、腹泻  
D. 水、电解质、酸碱平衡紊乱
17. 按公式计算一个 3 岁小儿平均血压的正常值是 ( )  
A. 60 / 40mmHg  
B. 86 / 58mmHg  
C. 96 / 60mmHg  
D. 100 / 60mmHg
18. 左向右分流型先心病患儿生长发育落后是由于 ( )  
A. 肺循环血量增加  
B. 肺动脉高压  
C. 体循环血量增加  
D. 体循环血量减少
19. 婴儿生后 2~3 个月时红细胞数降至  $3.0 \times 10^{12} / L$ , 血红蛋白量降至 110g/L, 可能出现了 ( )  
A. 溶血性贫血  
B. 生理性贫血  
C. 营养性缺铁性贫血  
D. 地中海贫血
20. 11 个月患儿面部皮肤呈蜡黄色, 有震颤, 血红蛋白 60g/L, 血象显示红细胞体积较大。应首先考虑 ( )  
A. 溶血性贫血  
B. 营养性缺铁性贫血  
C. 再生障碍性贫血  
D. 营养性巨幼红细胞性贫血
21. 肾病综合征低蛋白血症的主要原因是 ( )  
A. 肾小管重吸收蛋白不足  
B. 蛋白质摄入不足  
C. 肝脏合成蛋白不足  
D. 肾小球毛细血管通透性增加
22. 导致小儿急性泌尿系感染最常见的致病菌为 ( )  
A. 大肠杆菌  
B. 变形杆菌  
C. 绿脓杆菌  
D. 金黄色葡萄球菌
23. 出生后 2 月内婴儿化脓性脑膜炎最常见的病原菌是 ( )  
A. 脑膜炎双球菌和大肠杆菌  
B. 肺炎链球菌和脑膜炎双球菌  
C. 流感嗜血杆菌和 B 组溶血性链球菌  
D. 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌
24. 出生时存在, 以后逐渐消失的反射是 ( )  
A. 腹壁反射  
B. 觅食反射  
C. 角膜反射  
D. 咽反射
25. 过敏性紫癜皮疹分布最密集的部位是 ( )  
A. 面部  
B. 躯干  
C. 上肢  
D. 下肢
26. 地方性先天性甲状腺功能减退症的主要病因是 ( )  
A. 甲状腺不发育  
B. 合成甲状腺素酶缺乏  
C. 孕妇饮食中缺碘  
D. 孕妇服用抗甲状腺药物
27. 典型麻疹患儿的皮疹特点是 ( )

- A. 出血性皮炎  
B. 玫瑰色斑丘疹  
C. 疹间无正常皮肤  
D. 疹退后有色素沉着及脱屑
28. 中毒性痢疾发病年龄多见于 ( )  
A. 1 岁以内  
B. 2~7 岁  
C. 8~9 岁  
D. 10—14 岁
29. 患儿脑细胞死亡发生在脑完全缺血缺氧后 ( )  
A. 1~3 分钟  
B. 4~6 分钟  
C. 7~9 分钟  
D. 10~12 分钟
30. 使用带套囊的气管插管时, 气囊放气的时间间隔为 ( )  
A. 1 小时  
B. 2 小时  
C. 3 小时  
D. 4 小时

## 二、填空题(本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31. 出生时前囟约 1.5~2cm, \_\_\_\_\_ 岁至 \_\_\_\_\_ 岁闭合。
32. 分离性焦虑可分为三个阶段: \_\_\_\_\_ 阶段、 \_\_\_\_\_ 阶段和超然或否认阶段。
33. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症临床典型症状为惊厥、 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。
34. 适用于儿童呼吸道疾病的胸部物理治疗方法有 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_ 及震颤三种方式。
35. 小儿液体疗法静脉补液需做到“三定”, 即定量、 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_。

## 三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

36. 治疗性游戏
37. 肺泡表面活性物质
38. 真性菌尿
39. 癫痫持续状态
40. 猩红热帕氏征

## 四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

41. 简述影响生长发育的因素。
42. 简述预防急性白血病患者感染的护理措施。
43. 简述急性肾小球肾炎患儿休息的原则。
44. 简述结核菌素试验阳性反应的临床意义。
45. 简述患儿心肺脑复苏后的护理要点。

## 五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

46. 某新生儿, 日龄 7 天, 生后第三天出现皮肤黄染, 次日加重, 但精神食欲正常, 白细胞正常, 血清胆红素  $171 \mu\text{mol/L}$  ( $10\text{mg/dl}$ ), 以间接胆红素为主。

请根据以上资料回答：

- (1)该新生儿最可能的医疗诊断。
- (2)该新生儿血清胆红素升高的原因。
- (3)针对以上情况应采取的措施。

47. 患儿，女，2岁，因反复咳嗽、发热3天入院。入院后测体温 $39^{\circ}\text{C}$ ，可在咽喉部及肺部闻及痰鸣音，其母主述患儿痰多不易咳出，诊断为“急性支气管炎”。

请根据以上资料回答：

- (1)患儿2个主要的护理问题。
- (2)针对患儿情况应采取的主要护理措施。



自考365  
www.zikao365.com