

17. 与尿路结石形成无关的药物是 ()
- A. 糖皮质激素
B. 磺胺
C. 维生素 D
D. 乙酰唑胺
18. 属于条件必需氨基酸的是 ()
- A. 精氨酸
B. 亮氨酸
C. 异亮氨酸
D. 缬氨酸
19. 若胸腔闭式引流以排气为主, 导管位置应在患侧锁骨中线 ()
- A. 第 2 肋间
B. 第 3~4 肋间
C. 第 5~6 肋间
D. 第 7~8 肋间
20. 前列腺增生症病人最重要的症状是 ()
- A. 尿频
B. 进行性排尿困难
C. 尿潴留
D. 尿流中断

二、多项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21. 关节软骨的作用有 ()
- A. 减轻冲击
B. 吸收震荡
C. 分散应力
D. 稳定关节
E. 物质交换媒介
22. 颅内压增高的发生原因包括 ()
- A. 颅内血肿
B. 脑积水
C. 脑室引流
D. 狭颅症
E. 颅骨骨折
23. 对前列腺增生症病人常用的检查方法包括 ()
- A. 直肠指诊
B. 尿流率检查
C. 残余尿量测定
D. 膀胱镜检查
E. 腹部平片
24. 门静脉高压症病人行分流术后出现肝性脑病可能的原因包括 ()
- A. 氨中毒
B. 血容量不足
C. 疼痛
D. 上消化道出血

- E. 高蛋白饮食
25. 急性胰腺炎病人术后常见并发症包括 ()
- A. 出血
B. 胰痿
C. 肠痿
D. Oddi 括约肌痉挛
E. 切口感染
26. 革兰阴性杆菌引起的脓毒症可出现的“三低”现象是指 ()
- A. 低体温
B. 低脉率
C. 低血压
D. 低呼吸频率
E. 低白细胞
27. 对确诊胰腺炎有帮助的检查是 ()
- A. 血清脂肪酶
B. 血清钙测定
C. 尿脂肪酶
D. 尿淀粉酶
E. 血胆红素
28. 呼吸机高压报警的原因可见于 ()
- A. 管道扭曲
B. 气管痉挛
C. 呼吸机参数设置不当
D. 气囊破裂
E. 导管积水
29. 影响关节运动的因素有 ()
- A. 骨骺未闭合
B. 关节交锁
C. 滑液质和量改变
D. 关节炎症
E. 骨骼肌萎缩
30. 右半结肠癌病人的主要临床表现有 ()
- A. 肠梗阻
B. 便秘
C. 贫血
D. 全身症状
E. 腹部肿块

三、名词解释 (本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

31. 橘皮征
32. 门静脉高压症
33. 营养支持疗法
34. 脊髓震荡

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

35. 列举骨筋膜室综合征病人“5P”征的内容。
36. 简述原发性甲状腺功能亢进病人术前药物准备的目的是。简述硫脲类药物和碘剂各自的药理作用。
37. 简述低血容量休克治疗时，先输晶体液的目的。
38. 列举烧伤现场急救时保护受伤部位的主要措施。

五、病例分析题（本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

39. 女性，47 岁，车祸致腰段脊柱骨折伴脊髓损伤，损伤平面以下感觉、运动和反射功能全部丧失，入院急诊手术治疗。手术顺利安返病房，但其下肢功能尚未恢复。病人苏醒后一直情绪低落，不停流泪，担心以后再也站不起来了。术后数日病人一直未排便，腹胀明显，病人和家属更加担心病情，询问护士为何出现便秘，如何处理。问：
 - (1)列举该病人目前 3 个主要的护理诊断 / 问题。
 - (2)该病人受伤 1 个月内应采取的排尿方法有哪些？
 - (3)列举脊髓损伤截瘫病人发生便秘的原因及其处理措施。
40. 男性，32 岁，运动后突然出现右上腹部剧痛，疼痛放射至右侧中下腹部，伴恶心、呕吐，尿液呈浓茶色。查体：腹软，右下腹部深压痛，右肾区叩击痛。急诊就诊，尿常规检查可见尿中红细胞明显增多，KUB 平片显示右侧脊柱旁肾区可见 0.5cm 大小阴影。因出现血尿，病人有些焦虑，向医生、护士询问自己的诊断和治疗方案，由于疼痛剧烈，病人要求立即用止痛药止痛。问：
 - (1)该病人可能的医疗诊断是什么？可能的治疗方案是什么？
 - (2)列出该病人存在的 2 个护理诊断 / 问题。
 - (3)该病人目前的护理措施有哪些？