

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次: (请点击相应班次查看班次介绍)

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程:

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论(财经类)	英语(一)	英语(二)	线性代数(经管类)
高等数学(工专)	高等数学(一)	线性代数	政治经济学(财经类)
概率论与数理统计(经管类)	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)

[课程试听>>](#)

[我要报名>>](#)

## 全国 2012 年 1 月高等教育自学考试 外科护理学(二)试题 课程代码: 03203

### 一、单项选择题(本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 颅底骨折致脑脊液漏病人应避免用力排便, 目的是为了( )  
A. 脑脊液逆流  
B. 硬脑膜愈合不良  
C. 脑疝危象  
D. 脑脊液流出量增加
- 胆道疾病病人禁用的止痛剂是( )  
A. 哌替啶  
B. 东莨菪碱  
C. 阿托品  
D. 吗啡
- 幽门梗阻病人典型的临床表现是( )  
A. 营养不良  
B. 上腹部胀痛  
C. 呕吐宿食  
D. 食欲减退
- 男性, 70 岁, 因前列腺增生造成排尿困难, 已 15 小时未排尿。正确的促进排尿的护理措施是( )  
A. 坐起排尿  
B. 听流水声  
C. 用温水冲洗会阴部  
D. 行导尿术
- 以雷诺五联症为典型临床表现的胆道疾病是( )  
A. 急性胆囊炎  
B. 急性胆管炎  
C. 胆管结石合并急性胆管炎  
D. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- 机械性肠梗阻病人的腹痛特点是( )  
A. 阵发性绞痛  
B. 持续性疼痛进行性加重

- C. 持续性胀痛  
D. 定位不确切的隐痛
7. 关于泌尿系感染的预防措施正确的是( )  
A. 引流袋置于膀胱水平以下  
B. 从导尿管采集尿标本  
C. 疑似导尿管堵塞应立即冲洗  
D. 每周更换集尿袋
8. 在西方国家引起急性胰腺炎最常见的病因是( )  
A. 胆道疾病  
B. 过量饮酒  
C. 暴饮暴食  
D. 十二指肠液反流
9. 男性, 48 岁, 因门静脉高压症行脾切除术, 术后 12 天出现腹痛、腹胀、便血, 应考虑( )  
A. 腹膜炎  
B. 膈下脓肿  
C. 肠系膜血栓形成  
D. 结肠炎
10. 在甲状腺功能亢进病人术前药物准备中, 能阻止甲状腺素合成, 但可导致甲状腺肿大充血的药物是( )  
A. 丙硫氧嘧啶  
B. 卢戈氏液  
C. 普萘洛尔  
D. 地西洋
11. 休克代偿期相当于微循环变化的( )  
A. 扩张期  
B. 衰竭期  
C. 收缩期  
D. 抑制期
12. 膀胱癌病人就诊时最常见的临床表现是( )  
A. 排尿困难  
B. 血尿  
C. 尿痛  
D. 尿频
13. 腰椎间盘突出症病人保守治疗时可采用( )  
A. 双侧小腿皮牵引  
B. 骨盆带牵引  
C. 骨盆悬吊牵引  
D. 双侧股骨髁上骨牵引
14. 女性, 35 岁, 因脾破裂行脾切除术, 在该病人术后血常规检查中, 应格外关注( )  
A. 白细胞计数  
B. 红细胞计数  
C. 血小板计数  
D. 血红蛋白量
15. 急腹症病人最重要的腹部体征是( )  
A. 腹式呼吸减弱消失  
B. 腹膜刺激征阳性  
C. 肝浊音界缩小  
D. 肠鸣音消失
16. 肺叶切除病人术后最适宜的体位是( )  
A. 平卧位  
B. 头低脚高位  
C. 半卧位  
D. 侧俯卧位
17. 结直肠癌最常见的转移途径为( )  
A. 直接蔓延  
B. 腹腔种植转移  
C. 血运转移  
D. 淋巴转移



- C. 对抗肺从健侧向患侧的移位  
D. 胸腔灌药  
E. 排除胸腔积液
26. 乳腺癌病人的综合治疗方法包括( )  
A. 手术治疗  
B. 介入治疗  
C. 放疗  
D. 化疗  
E. 内分泌治疗
27. 前列腺增生症病人的主要临床表现有( )  
A. 进行性排尿困难  
B. 尿频  
C. 尿潴留  
D. 血尿  
E. 充盈性尿失禁
28. 可用于肝癌免疫治疗的药物有( )  
A. 卡介苗  
B. 干扰素  
C. 胸腺肽  
D. 转移因子  
E. 阿霉素
29. L<sub>1-2</sub> 脊髓损伤病人康复护理应达到的目标是( )  
A. 步行  
B. 能将骨盆抬起使足跨越楼梯  
C. 使用轮椅外出活动  
D. 用辅助工具进食  
E. 在他人协助下坐起
30. 壶腹部癌病人常见的临床表现包括( )  
A. 黄疸  
B. 消瘦  
C. 腹痛  
D. 高热  
E. 腹胀

### 三、名词解释(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

31. 低排高阻型感染性休克  
32. 外科感染  
33. 开放性气胸  
34. 胃大部切除术

### 四、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

35. 列举肠梗阻病人进行胃肠减压的作用。  
36. 简述食管癌术后饮食护理要点。  
37. 简述胃十二指肠溃疡出血病人的术前护理要点。  
38. 列举复位后骨折部位固定的目的, 并举例说明固定的两个基本形式。

### 五、病例分析题(本大题共 2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分)

39. 男性，68 岁，尿频、夜尿多、排尿不畅 4 年。10 小时前饮酒后突然出现小便不能自解，急诊就诊，主诉下腹部胀痛。体格检查：下腹膨隆，叩诊浊音，轻度压痛，直肠指诊可触及前列腺增大，光滑、质韧、中央沟消失。查血清 PSA 为 2ng / ml。既往史：吸烟 40 年，每天 20 支，饮酒 35 年，每天白酒约 1 两。问：

- (1) 该病人可能的医疗诊断是什么?诊断依据有哪些?
- (2) 该病人目前出现了何种情况?应如何处理?
- (3) 若该病人需要接受手术治疗，术前护理措施有哪些?

40. 男性，35 岁，因头部受棒击，昏迷不醒 8 小时，偶能睁眼。查体：脉搏 88 次 / 分，呼吸 20 次 / 分，血压 130 / 85mmHg，体温 37.0℃。右侧瞳孔散大，对光反应消失，右眼眶周围肿胀，皮下有淤血。左上肢不能活动，左侧巴氏征(+)。腰椎穿刺：脑脊液压力 180mmH<sub>2</sub>O，呈均匀血性脑脊液。X 线颅骨平片示：右眼眶骨折。CT 扫描：右额颞部有低密度区。问：

- (1) 此病人可能的诊断是什么?
- (2) 列举目前病情观察的要点。
- (3) 目前的处理原则有哪些?