

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次: (请点击相应班次查看班次介绍)

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程:

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论(财经类)	英语(一)	英语(二)	线性代数(经管类)
高等数学(工专)	高等数学(一)	线性代数	政治经济学(财经类)
概率论与数理统计(经管类)	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)

[课程试听>>](#)

[我要报名>>](#)

全国 2012 年 1 月高等教育自学考试 外科护理学(二)试题 课程代码: 03203

一、单项选择题(本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 颅底骨折致脑脊液漏病人应避免用力排便, 目的是为了避开()
A. 脑脊液逆流
B. 硬脑膜愈合不良
C. 脑疝危象
D. 脑脊液流出量增加
- 胆道疾病病人禁用的止痛剂是()
A. 哌替啶
B. 东莨菪碱
C. 阿托品
D. 吗啡
- 幽门梗阻病人典型的临床表现是()
A. 营养不良
B. 上腹部胀痛
C. 呕吐宿食
D. 食欲减退
- 男性, 70 岁, 因前列腺增生造成排尿困难, 已 15 小时未排尿。正确的促进排尿的护理措施是()
A. 坐起排尿
B. 听流水声
C. 用温水冲洗会阴部
D. 行导尿术
- 以雷诺五联症为典型临床表现的胆道疾病是()
A. 急性胆囊炎
B. 急性胆管炎
C. 胆管结石合并急性胆管炎
D. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- 机械性肠梗阻病人的腹痛特点是()
A. 阵发性绞痛
B. 持续性疼痛进行性加重

- C. 持续性胀痛
D. 定位不确切的隐痛
7. 关于泌尿系感染的预防措施正确的是()
A. 引流袋置于膀胱水平以下
B. 从导尿管采集尿标本
C. 疑似导尿管堵塞应立即冲洗
D. 每周更换集尿袋
8. 在西方国家引起急性胰腺炎最常见的病因是()
A. 胆道疾病
B. 过量饮酒
C. 暴饮暴食
D. 十二指肠液反流
9. 男性, 48 岁, 因门静脉高压症行脾切除术, 术后 12 天出现腹痛、腹胀、便血, 应考虑()
A. 腹膜炎
B. 膈下脓肿
C. 肠系膜血栓形成
D. 结肠炎
10. 在甲状腺功能亢进病人术前药物准备中, 能阻止甲状腺素合成, 但可导致甲状腺肿大充血的药物是()
A. 丙硫氧嘧啶
B. 卢戈氏液
C. 普萘洛尔
D. 地西洋
11. 休克代偿期相当于微循环变化的()
A. 扩张期
B. 衰竭期
C. 收缩期
D. 抑制期
12. 膀胱癌病人就诊时最常见的临床表现是()
A. 排尿困难
B. 血尿
C. 尿痛
D. 尿频
13. 腰椎间盘突出症病人保守治疗时可采用()
A. 双侧小腿皮牵引
B. 骨盆带牵引
C. 骨盆悬吊牵引
D. 双侧股骨髁上骨牵引
14. 女性, 35 岁, 因脾破裂行脾切除术, 在该病人术后血常规检查中, 应格外关注()
A. 白细胞计数
B. 红细胞计数
C. 血小板计数
D. 血红蛋白量
15. 急腹症病人最重要的腹部体征是()
A. 腹式呼吸减弱消失
B. 腹膜刺激征阳性
C. 肝浊音界缩小
D. 肠鸣音消失
16. 肺叶切除病人术后最适宜的体位是()
A. 平卧位
B. 头低脚高位
C. 半卧位
D. 侧俯卧位
17. 结直肠癌最常见的转移途径为()
A. 直接蔓延
B. 腹腔种植转移
C. 血运转移
D. 淋巴转移

- C. 对抗肺从健侧向患侧的移位
D. 胸腔灌药
E. 排除胸腔积液
26. 乳腺癌病人的综合治疗方法包括()
A. 手术治疗
B. 介入治疗
C. 放疗
D. 化疗
E. 内分泌治疗
27. 前列腺增生症病人的主要临床表现有()
A. 进行性排尿困难
B. 尿频
C. 尿潴留
D. 血尿
E. 充盈性尿失禁
28. 可用于肝癌免疫治疗的药物有()
A. 卡介苗
B. 干扰素
C. 胸腺肽
D. 转移因子
E. 阿霉素
29. L₁~₂ 脊髓损伤病人康复护理应达到的目标是()
A. 步行
B. 能将骨盆抬起使足跨越楼梯
C. 使用轮椅外出活动
D. 用辅助工具进食
E. 在他人协助下坐起
30. 壶腹部癌病人常见的临床表现包括()
A. 黄疸
B. 消瘦
C. 腹痛
D. 高热
E. 腹胀

三、名词解释(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

31. 低排高阻型感染性休克
32. 外科感染
33. 开放性气胸
34. 胃大部切除术

四、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

35. 列举肠梗阻病人进行胃肠减压的作用。
36. 简述食管癌术后饮食护理要点。
37. 简述胃十二指肠溃疡出血病人的术前护理要点。
38. 列举复位后骨折部位固定的目的, 并举例说明固定的两个基本形式。

五、病例分析题(本大题共 2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分)

39. 男性, 68 岁, 尿频、夜尿多、排尿不畅 4 年。10 小时前饮酒后突然出现小便不能自解, 急诊就诊, 主诉下腹部胀痛。体格检查: 下腹膨隆, 叩诊浊音, 轻度压痛, 直肠指诊可触及前列腺增大, 光滑、质韧、中央沟消失。查血清 PSA 为 2ng/ml 。既往史: 吸烟 40 年, 每天 20 支, 饮酒 35 年, 每天白酒约 1 两。问:

- (1) 该病人可能的医疗诊断是什么? 诊断依据有哪些?
- (2) 该病人目前出现了何种情况? 应如何处理?
- (3) 若该病人需要接受手术治疗, 术前护理措施有哪些?

40. 男性, 35 岁, 因头部受棒击, 昏迷不醒 8 小时, 偶能睁眼。查体: 脉搏 88 次/分, 呼吸 20 次/分, 血压 $130/85\text{mmHg}$, 体温 37.0°C 。右侧瞳孔散大, 对光反应消失, 右眼眶周围肿胀, 皮下有淤血。左上肢不能活动, 左侧巴氏征 (+)。腰椎穿刺: 脑脊液压力 $180\text{mmH}_2\text{O}$, 呈均匀血性脑脊液。X 线颅骨平片示: 右眼眶骨折。CT 扫描: 右额颞部有低密度区。问:

- (1) 此病人可能的诊断是什么?
- (2) 列举目前病情观察的要点。
- (3) 目前的处理原则有哪些?

