

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次: (请点击相应班次查看班次介绍)

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| 基础班 | 串讲班 | 精品班 | 套餐班 | 实验班 | 习题班 | 高等数学预备班 | 英语零起点班 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|

网校推荐课程:

| | | | |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|
| 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义基本原理概论 | 大学语文 | 中国近现代史纲要 |
| 经济法概论(财经类) | 英语(一) | 英语(二) | 线性代数(经管类) |
| 高等数学(工专) | 高等数学(一) | 线性代数 | 政治经济学(财经类) |
| 概率论与数理统计(经管类) | 计算机应用基础 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | |

[更多辅导专业及课程>>](#)

[课程试听>>](#)

[我要报名>>](#)

全国 2012 年 4 月高等教育自学考试 儿科护理学(一)试题 课程代码: 03003

一、单项选择题(本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 小儿乳牙出齐的时间为()
A. 16~22 个月
B. 24~30 个月
C. 31~36 个月
D. 37~42 个月
2. 6 个月以内小儿的最佳食品是()
A. 母乳
B. 牛乳
C. 羊乳
D. 全脂奶粉
3. 婴儿期发展健全人格最初而且最重要的因素为()
A. 满足感
B. 自主感
C. 信任感
D. 成就感
4. 一新生儿胎龄 36 周, 出生体重 2600g, 其出生体重在同胎龄儿平均体重的第 85 百分位, 该新生儿是()
A. 早产儿、小于胎龄儿
B. 早产儿、适于胎龄儿
C. 早产儿、大于胎龄儿
D. 足月儿、适于胎龄儿

- 5.下列选项符合早产儿外观特点的是()
- A.皮肤薄嫩、全身皮肤毳毛多
B.足底纹理多
C.耳壳软骨发育好
D.男婴睾丸已降入阴囊
- 6.新生儿鹅口疮常用的清洁口腔的液体是()
- A.1%龙胆紫
B.生理盐水
C.2%碳酸氢钠溶液
D.蒸馏水
- 7.重度营养不良患儿的体重低于正常均值的()
- A.15%~20%
B.25%~30%
C.35%~40%
D.40%以上
- 8.为预防小儿维生素 D 缺乏性佝偻病发生,每日维生素 D400IU 应口服至()
- A.1 岁
B.2 岁
C.3 岁
D.4 岁
- 9.对哮喘患儿进行健康教育时,护士应教会患儿的呼吸技巧为()
- A.鼻吸气,鼻呼气
B.口吸气,鼻呼气
C.鼻吸气,口呼气
D.鼻吸气,缩唇式呼气
- 10.患儿,10 个月,因发热、咳嗽 4 天以支气管肺炎收住院,目前出现烦躁,呼吸急促,面灰唇紫,查体:R72 次/分,气管居中,两肺广泛中小水泡音,心音低钝,HR188 次/分,肝肋下 3.5cm,考虑患儿发生了()
- A.中毒性脑病
B.心力衰竭
C.脓气胸
D.气胸
- 11.低渗性脱水是指血清钠浓度低于()
- A.130mmol/L
B.135mmol/L
C.140mmol/L
D.150mmol/L
- 12.5 岁小儿正常血压平均值是()
- A.60/40mmHg
B.80/50mmHg
C.90/60mmHg
D.100/60mmHg
- 13.一先天性心脏病患儿,查体:无青紫,胸骨左缘 2、3 肋间可闻及粗糙的连续性、机器样杂音,脉压差>40mmHg,并伴有周围血管征:水冲脉、毛细血管搏动和股动脉枪击音,其诊断最可能是()
- A.房间隔缺损
B.室间隔缺损
C.动脉导管未闭
D.法洛四联症
- 14.法洛四联症患儿,多有蹲踞症状,其主要作用是()
- A.下肢屈曲,增加体循环阻力,可减少右向左分流,增加肺血流量
B.下蹲可以休息片刻,恢复体力
C.可以缓解气急

D.可增加体循环血流量,有利于小儿生长发育

15.病毒性心肌炎常见的病原体是()

- A.风疹病毒
B.柯萨奇病毒
C.麻疹病毒
D.腺病毒

16.导致小儿缺铁性贫血的最主要原因是()

- A.体内贮铁不足
B.生长发育过快
C.铁的丢失过多
D.铁的摄入不足

17.小儿急性泌尿系感染最常见的感染途径是()

- A.上行感染
B.血行感染
C.直接蔓延
D.淋巴感染

18.患儿,男,9岁,因眼睑浮肿、少尿、茶色尿3天,以急性肾小球肾炎收住入院,该患儿可以恢复正常生活的指征是()

- A.血沉正常
B.Addis 计数正常
C.血压正常
D.水肿消退及肉眼血尿消失

19.下列有关典型化脓性脑膜炎脑脊液检查的描述,正确的是()

- A.压力正常或增高,外观清亮
B.白细胞明显增加,以中性粒细胞为主
C.蛋白质含量明显下降
D.糖含量显著增高

20.关于婴幼儿类风湿病的临床表现,下列选项错误的是()

- A.关节炎常较轻
B.多形性皮疹
C.肝、脾、淋巴结肿大
D.常出现心脏炎

21.下列过敏性紫癜表现最具特征性的是()

- A.突发腹痛、恶心、呕吐、便血
B.起病前1~4周有上呼吸道感染史
C.病程中反复出现皮肤紫癜
D.关节肿痛

22.儿童糖尿病最常见的类型是()

- A.非胰岛素依赖型
B.胰岛素依赖型
C.继发性糖尿病
D.非糖尿病性葡萄糖尿症

23.筛查新生儿先天性甲状腺功能减低症最常用的方法是()

- A.干血滴纸片测定 TSH
B.血清 T₄、TSH 测定
C.TRH 刺激试验
D.甲状腺扫描

24.一糖尿病患儿突然出现头晕、心慌、出汗、手抖、全身无力的症状,应考虑其可能发生了()

- A.低血糖
B.酮症酸中毒
C.低血压
D.急性感染

25.对免疫缺陷病患儿错误的做法是()

- A.保护性隔离
B.接种活疫苗
C.必要时使用抗生素预防感染
D.给予丙种球蛋白替代疗法
- 26.引起水痘的病原体是()
A.水痘病毒
B.带状疱疹病毒
C.柯萨奇病毒
D.水痘-带状疱疹病毒
- 27.下列有关流行性脑脊髓膜炎流行病学特点的描述不正确的是()
A.传染源为病人和健康带菌者
B.通过飞沫传播
C.冬末春初为发病高峰
D.多见于 5 岁以上儿童
- 28.下列症状不属于结核性脑膜炎早期表现的是()
A.性情改变
B.发热
C.呕吐
D.惊厥频繁
- 29.颅内高压是指脑脊液压力超过()
A.160mmHg
B.180mmHg
C.160mmH₂O
D.180mmH₂O
- 30.毒鼠药物(敌鼠)中毒后的主要临床特点是()
A.出血现象
B.肌张力增高
C.瞳孔扩大
D.心动过速

二、填空题(本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 31.全脂奶粉配成乳液时, 奶粉与水的比例按重量计算为_____, 按体积计算为_____。
- 32.新生儿易出现溢乳的原因是_____和_____。
- 33.为缓解支气管哮喘患儿呼吸困难症状, 应采取_____体位, 给予_____吸氧。
- 34.引起 3 个月至 3 岁小儿化脓性脑膜炎的病原菌中, 以_____和_____多见。
- 35.流行性腮腺炎是由_____引起的小儿常见急性传染病。
- 36.流行性脑脊髓膜炎的隔离期从发病之日起不少于_____天。

三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

- 37.发育
38.被动免疫
39.支气管哮喘
40.学龄期
41.临界温度

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

- 42.简述新生儿重症监护的主要内容。

- 43.简述腹泻患儿的主要护理措施。
- 44.简述小儿充血性心力衰竭的临床诊断标准。
- 45.简述糖尿病患儿预防感染的主要措施。
- 46.简述抗结核药异烟肼、链霉素及乙胺丁醇的毒性反应。

五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

47.一个孩子体重 12kg, 身高 85cm; 能双脚跳, 会用勺子吃饭; 会说 2~3 字构成的句子; 能完成简单的动作, 如拾起地上的物品; 能表达喜、怒、怕等。请根据以上资料写出:

- (1)该小儿的年龄。
- (2)该小儿处于哪一个年龄期。
- (3)此年龄期小儿的保健重点。

48.患儿, 男, 5 岁, 面部及双下肢浮肿 2 周收入院, 目前给予肾上腺皮质激素治疗。查体: 精神可, 眼睑、颜面水肿, 心、肺无异常, 腹稍膨隆, 移动性浊音(+), 阴囊中度水肿, 下肢可凹性水肿。实验室检查: 尿蛋白++++, 血浆总蛋白及白蛋白明显减低, 血清胆固醇明显升高, 补体 C₃ 正常。请根据以上资料写出:

- (1)该患儿最有可能的医疗诊断。
- (2)该患儿主要护理措施。

