

绝密 ★ 考试结束前

全国 2012 年 10 月高等教育自学考试

妇产科护理学(一)试题

课程代码：03002

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 某女，妊娠 9 周，个人申请终止妊娠，最适宜采用的方法是

- A. 引产术
B. 吸宫术
C. 钳刮术
D. 药物流产

2. 静脉化疗时如果出现药物外渗，下列处理正确的是

- A. 马上停止药物输入
B. 局部可待自然恢复
C. 外渗 48 小时内局部冷敷
D. 外渗 24 小时内局部热敷

3. 正常产褥期胎盘附着处的子宫内膜基本完成修复需要的时间是

- A. 2 周
B. 4 周
C. 6 周
D. 8 周

4. 卵巢癌切除肠道转移灶时需胃肠减压，下列护理措施正确的是

- A. 为了保证减压通畅，每 4 小时用生理盐水通胃管一次
B. 观察胃液的性质和量，有出血时及时通知医生
C. 保持胃管间断减压，每次减压保持通畅
D. 减压期间可以适当进食进水

- 5.关于晚期产后出血，下列描述正确的是
- A.滋养细胞疾病可引起晚期产后出血
 - B.胎膜残留引起的出血，多数发生在产后 5~6 天
 - C.分娩后 12 小时阴道发生大量出血称晚期产后出血
 - D.胎盘附着面复旧不全引起的出血，多数发生在产后 20 余日
- 6.王女士，行会阴切开缝合术后第 2 天，会阴切口水肿严重，护士可采用湿热敷的药物是
- A.50%硫酸镁
 - B.75%硫酸镁
 - C.50%酒精
 - D.75%酒精
- 7.按卵巢功能发生障碍的时期，临床上将功能失调性子宫出血分为
- A.原发性和继发性
 - B.无排卵性和有排卵性
 - C.绝对性和相对性
 - D.生理性和病理性
- 8.某孕妇骨盆外测量出口横径为 8cm，为判断能否经阴道分娩，需进一步测量
- A.骶耻内径
 - B.耻骨弓角度
 - C.髂棘间径
 - D.出口后矢状径
- 9.关于胎儿窘迫的临床表现，下列描述正确的是
- A.胎心监护表现为轻度可变减速
 - B.羊水浅绿色提示胎儿急性缺氧
 - C.胎儿缺氧早期表现为胎动次数减少
 - D.胎儿窘迫最明显的临床征象是胎心率异常
- 10.子宫内膜癌最突出的症状是
- A.子宫增大
 - B.子宫出血
 - C.分泌物异常
 - D.疼痛
- 11.确诊宫颈癌前期病变和宫颈癌最可靠的方法是
- A.子宫颈刮片细胞学检查
 - B.阴道镜检查
 - C.宫颈活体组织检查
 - D.碘实验
- 12.滴虫性阴道炎的直接传播途径是
- A.性交
 - B.衣物
 - C.游泳池
 - D.妇科检查器具
- 13.关于妇科肿瘤化疗的不良反应，下列描述正确的是

- A.白细胞常在用药后 2~3 天开始下降，停药后维持 8~9 天开始回升
- B.口腔溃疡多发生在用药后 7~10 天，停药后 2~3 天自愈
- C.甲氨蝶呤可引起皮肤炎性反应，严重时可导致剥脱性皮炎
- D.腹泻超过 6 次/日时，应及时通知医生停药
- 14.第二产程宫缩间歇时，胎头不再回缩，称为胎头
- A.仰伸
B.衔接
C.拨露
D.着冠
- 15.关于妇科手术后护理，下列描述正确的是
- A.硬膜外麻醉患者采取去枕平卧、头偏向一侧的姿势保持 6~8 小时
- B.为了防止伤口出血，伤口处压 1kg 重的沙袋 12 小时
- C.手术后疼痛超过 12 小时，可遵医嘱给予止痛剂
- D.腹部切口一般手术后 10~12 天拆线
- 16.某马拉松运动员，19 岁，未婚，13 岁月经初潮，周期规律，近半年闭经，已排除妊娠，垂体兴奋试验阳性，最可能的诊断是
- A.下丘脑性闭经
B.垂体性闭经
C.卵巢性闭经
D.子宫性闭经
- 17.妊娠合并贫血的妇女，当 Hb<60/L 时，最佳的治疗方式是
- A.口服速力菲
B.肌注叶酸
C.补充富含铁剂食物
D.给予多次少量输血
- 18.葡萄胎患者接受清宫术前，应准备好静脉通路并备血，其原因是
- A.葡萄胎清宫术前需要输血输液
B.防止病人术中紧张造成血管穿刺困难
C.葡萄胎清宫术中需要静脉给药
D.防止清宫术中大出血造成休克
- 19.卵巢肿瘤患者腹水较多时，为了缓解症状，一次可放腹水的量不应超过
- A.5000ml
B.4000ml
C.3000ml
D.2000ml
- 20.关于正常新生儿的生理特点，下列描述正确的是
- A.主动免疫功能强
B.呼吸表浅，频率较快
C.足月儿出生后 24 小时出现黄疸
D.体温调节中枢不完善，有颤抖反应
- 21.关于不全流产的临床表现，下列描述正确的是

- A.轻微腹痛
B.阴道出血逐渐停止
C.宫颈口可见组织物堵塞
D.子宫大小符合孕周
- 22.关于初乳的特点，下列描述正确的是
A.含丰富蛋白质
B.脂肪含量较高
C.糖含量较高
D.产后3天转为成熟乳
- 23.枕左前位分娩时，胎头衔接的径线是
A.双顶径
B.枕额径
C.枕颈径
D.枕下前凶径
- 24.成年女性正常耻骨弓角度约为
A.60°
B.70°
C.80°
D.90°
- 25.分娩后检查胎盘的目的，最重要的是了解
A.胎盘的大小
B.胎盘的形状
C.胎盘是否钙化
D.胎盘小叶有无缺损

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分)

- 26.妊娠合并贫血常见的是缺铁性贫血，其次为_____性贫血。
- 27.乙肝疫苗主动免疫，应在新生儿出生后_____小时内、1个月、6个月各接种一次疫苗。
- 28.滋养细胞肿瘤肺转移患者化疗时最适宜的给药途径是_____给药。
- 29.中期妊娠利凡诺引产时，如_____小时无宫缩发动说明引产失败。
- 30.产力包括子宫收缩力、腹肌及膈肌收缩力和_____收缩力。
- 31.子宫内膜生长在子宫肌层内称为_____病。
- 32.阴道镜检查术后，一般_____周复诊。
- 33.择期行卵巢肿瘤切除术，术后的切口属于_____类切口。
- 34.治疗滴虫性阴道炎时，甲硝唑可通过_____到达胎儿体内，孕妇禁用。
- 35.绒毛膜癌镜下可见滋养细胞极度不规则增生并分化不良，_____结构消失。

- 36.按蜕膜与受精卵的部位关系可将蜕膜分为_____蜕膜、包蜕膜和_____蜕膜。
- 37.在下丘脑—垂体—卵巢轴的调节过程中，当卵巢分泌的激素增多时，可使下丘脑受到抑制，此为_____反馈。
- 38.实施产钳助产术，根据胎儿在骨盆腔位置的高低，分为低位产钳、中位产钳、高位产钳和_____产钳。
- 39.妊娠期母体生殖系统变化最大，其中变化最为明显的是_____。

三、名词解释题(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

- 40.紧急避孕
- 41.潜伏期延长
- 42.绝对不孕
- 43.输卵管通液术
- 44.骨产道

四、简答题(本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分)

- 45.简述产褥感染妇女的处理原则。
- 46.简述慢性宫颈炎患者行物理疗法时的护理措施。
- 47.简述产妇乳头皲裂的护理措施。
- 48.简述围绝经期综合征患者的护理措施。
- 49.妊娠合并糖尿病妇女，于半小时前自然分娩一男婴，体重 3800 克，Apgar 评分 10 分。简述该新生儿的主要护理措施。

五、论述题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

50.王女士，28 岁，孕 1 产 0，孕 32 周，以“无痛性阴道出血半天”入院。孕妇自述阴道出血前腹部未受到外力撞击，出血比经量少。检查：血压 110/80mmHg，脉搏 90 次/分，无宫缩，腹部无压痛，胎心率 140 次/分。B 超结果显示胎盘组织部分覆盖宫颈内口。

根据以上资料，请回答：

- (1)该患者可能的医疗诊断。
- (2)对该类孕妇急性出血时的护理措施。
- 51.患者，女，35 岁，主诉“经期延长，经量增多 1 年半”入院。患者无明显诱因出现经期延长，由 3 天延至 10 天，经量较以往增加约 1/3。妇科检查：宫颈光滑，子宫前位，增大如孕 10 周大小，质硬，活动差，双附件未触及异常。盆腔彩超：子宫体积增大，实质回声不

均匀，宫体可见数个低回声肿物，最大为 40mm×33mm，边界清，轮廓规则，位于后壁，双附件未见异常。

根据以上资料，请回答：

- (1)该患者的医疗诊断。
- (2)该类患者的护理措施。



自考 365
www.zikao365.com