

- A.孕前经量多者，应多食含铁食物
B.发生变性时，以玻璃样变最多见
C.妊娠足月时，均行剖宫产结束分娩
D.肌瘤直径<10cm 而无症状者，无需特殊处理
- 6.腹膜外剖宫产术的适应证是
A.巨大胎儿
B.前置胎盘
C.妊娠合并心脏病
D.妊娠合并宫腔感染
- 7.某女，32岁，妊娠28周，主诉活动后心悸、轻度气短，休息时无自觉症状。该患者的心功能属于
A. I级
B. II级
C. III级
D. IV级
- 8.关于子宫破裂的处理原则，下列描述正确的是
A.立即肌注哌替啶减轻疼痛
B.若宫口开全可行阴道助娩术
C.为预防产后出血应行子宫切除术
D.无论胎儿是否存活均应尽快做好术前准备
- 9.最常见的外阴癌是
A.基底细胞癌
B.前庭大腺癌
C.鳞状细胞癌
D.恶性黑色素瘤
- 10.关于产褥感染，下列描述正确的是
A.由病毒感染所致
B.主要是外源性感染
C.指导患者取俯卧位休息
D.感染症状一般在产后3~7天出现
- 11.反复流产最常见的原因是
A.染色体缺失
B.染色体断裂
C.染色体数目异常
D.染色体平衡易位
- 12.女性生殖系统中最常见的良性肿瘤是
A.子宫肌瘤
B.卵巢肿瘤
C.巧克力囊肿
D.滋养细胞肿瘤
- 13.诊断异位妊娠破裂出血简单可靠的方法是
A. B型超声检查
B.腹腔穿刺

- C.阴道后穹隆穿刺
D.子宫内膜病理检查
- 14.分娩过程中，持续性枕横位胎心听诊的正确部位应在母体
- A.脐上一侧偏外
B.脐上正中
C.脐下一侧偏外
D.脐下正中
- 15.宫颈癌最常见的类型是
- A.外生型
B.内生型
C.溃疡型
D.颈管型
- 16.子宫内膜异位的发生部位最多见于
- A.卵巢
B.阔韧带
C.宫颈
D.输卵管
- 17.羊膜镜检查时，正常羊水的颜色是
- A.黄色
B.绿色
C.棕色
D.乳白色
- 18.造成尿瘘最主要的原因是
- A.产伤
B.妇科手术损伤
C.泌尿系统结核浸润
D.生殖道肿瘤放射治疗
- 19.某女，孕 34 周，因胎膜早破、不规律宫缩入院。查体后，医嘱给予地塞米松肌内注射，其目的是
- A.抑制宫缩
B.预防感染
C.促胎肺成熟
D.预防羊水栓塞
- 20.关于利凡诺引产的护理措施，下列描述正确的是
- A.术前 1 日冲洗阴道
B.引产后 6 周内禁止性生活
C.用药后 48 小时无宫缩说明引产失败
D.引产后每 2 小时协助排尿 1 次防止尿潴留
- 21.关于妇科化疗患者的给药途径，下列描述错误的是
- A.治疗子宫恶性肿瘤可使用动脉插管给药
B.鞘内注射是治疗脑转移的有效方法
C.肺转移患者最好使用静脉给药
D.治疗腹水可口服给药

22. 在高危妊娠监护中, 测定孕妇尿中雌激素/肌酐(E/C)比值的目的是评估
- A. 胎儿成熟度
B. 胎儿胎盘单位功能
C. 胎儿宫内缺氧状况
D. 胎儿宫内贮备能力
23. 胎儿生长受限最常见的病因是
- A. 胎儿因素
B. 孕妇因素
C. 脐带因素
D. 胎盘因素
24. 初产妇, 孕 33 周, 12 天前出现乏力、食欲欠佳, 近 5 天出现呕吐、巩膜黄染, 入院时神志不清, 查体: 血压 130/90mmHg, 血胆红素 $30 \mu\text{mol/L}$ 。最可能的情况是
- A. 药物性肝损害
B. 妊娠高血压疾病肝损害
C. 妊娠脂肪肝
D. 妊娠合并肝炎
25. 绒毛膜癌最常见的转移部位是
- A. 脑
B. 肺
C. 阴道
D. 盆腔
26. 关于妊娠滋养细胞和滋养细胞疾病, 下列描述正确的是
- A. 滋养细胞疾病均继发于妊娠
B. 滋养细胞疾病是一组恶性肿瘤
C. 妊娠滋养细胞侵蚀能力仅限于蜕膜层
D. 滋养细胞疾病是来源于子宫壁的疾病
27. 某女, 28 岁, 体健, 现妊娠 13 周要求终止妊娠, 最适宜的方法是
- A. 利凡诺引产
B. 人工流产钳刮术
C. 人工流产负压吸引术
D. 米索前列醇引产
28. 某中年女性, 主诉外阴奇痒。查体: 外阴皮肤发白, 未见其它异常。最可能的原因是
- A. 蛲虫病
B. 外阴疱疹病毒感染
C. 滴虫性阴道炎
D. 外阴鳞状上皮细胞增生
29. 关于阴道灌洗的护理要点, 下列描述正确的是
- A. 灌洗液温度以 $41-43^{\circ}\text{C}$ 为宜
B. 灌洗筒与床沿距离应超过 70cm
C. 灌洗头插入不宜过深且弯头向下
D. 产后 3 天内生殖道感染者可行低位灌洗
30. 胎儿基因诊断的遗传筛查方法是

- A.绒毛活检
B.胎儿镜检查
C.羊膜腔胎儿造影
D.胎儿心电图

二、多项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

31.关于妇科化疗患者的护理措施, 下列描述正确的是

- A.口腔溃疡患者应减少进食
B.使用 5-FU 的患者禁止饮用酸奶
C.白细胞减少患者应做好保护性隔离
D.静脉滴注若药物漏出应立即停止药物输入
E.配好的药物常温下放置时间不超过 4 小时

32.晚期产后出血的病因包括

- A.蜕膜残留
B.子宫复旧不全
C.产妇营养不良
D.剖宫产术后子宫伤口裂开
E.产后子宫滋养细胞肿瘤

33.骨盆狭窄的产妇在分娩过程中易出现

- A.滞产
B.急产
C.子宫破裂
D.胎位异常
E.产后生殖道瘘

34.关于卵巢肿瘤的处理, 下列描述正确的是

- A.卵巢实性肿瘤, 应及时手术切除
B.巨大肿瘤术后, 需备沙袋腹部加压
C.需放腹水者, 每次放腹水 5000ml 左右
D.非赘生性肿瘤直径<5cm 的患者定期随访
E.腹腔化疗患者应绝对制动以保证药物有效吸收

35.下列属于丈夫精液人工受精(AIH)适用证的是

- A.丈夫为阳痿
B.丈夫为尿道下裂
C.丈夫为无精症
D.丈夫为白化病
E.妻子为宫颈狭窄

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

36. 母子血型不合

37. 葡萄胎

38. 遗传咨询

39. 直肠-腹部诊

40. 外阴白色病变

四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分)

41. 简述子痫患者的护理措施。

42. 简述下丘脑性闭经的原因。

43. 简述接受高危妊娠监护孕妇的护理措施。

44. 简述放置宫内节育器的时间和要求。

45. 简述妊娠合并心脏病患者早期心力衰竭的临床表现。

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

46. 某女,孕 39 周, G₁P₀。临产后出现继发性宫缩乏力、潜伏期延长,行人工破膜,破膜后不久,产妇突然出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、心率加快,肺部听诊可闻及湿啰音。

根据以上资料请回答:

(1) 该产妇最可能的医疗诊断。

(2) 该类疾病的抢救措施。

47. 某女,47 岁,已婚, G₃P₁。因“性生活后阴道出血 3 个月”入院,确诊为宫颈鳞癌 II A 期,行开腹广泛性子宫切除术。

根据以上资料,请回答:

(1) 该患者术后可能出现的并发症。

(2) 该类手术患者术后并发症的观察和护理。