

2022年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

妇产科护理学（一）

（课程代码 03002）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共25小题，每小题1分，共25分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 关于黄体功能不足导致的功血特点，下列描述正确的是
A. 月经周期正常 B. 经期延长
C. 基础体温呈双相 D. 多见于青春期女性
2. 某女士，25岁，停经3个月，不规则阴道流血2周。查体：阴道排出物中见水泡状组织，子宫增大如孕5个月大小，首先考虑的医疗诊断是
A. 葡萄胎 B. 异位妊娠
C. 双胎妊娠流产 D. 子宫肌瘤
3. 子宫内膜癌诊断的最后依据是
A. 组织学检查 B. 淋巴造影
C. 肿瘤标志物 D. B超检查
4. 关于女性生殖系统炎症的传播途径，下列描述正确的是
A. 产褥感染扩散的主要途径是直接蔓延
B. 阑尾炎引起输卵管炎的主要途径是直接蔓延
C. 生殖器官结核感染的主要途径是淋巴系统蔓延
D. 淋病感染的主要途径是经淋巴系统蔓延
5. 关于外阴炎的局部治疗方法，下列描述正确的是
A. 0.5%醋酸冲洗阴道 B. 1:5000高锰酸钾溶液坐浴
C. 制霉菌素阴道上药 D. 2%~4%碳酸氢钠冲洗阴道

6. 产钳助产时，如果胎儿为臀位，当胎体娩出后，可以考虑使用
A. 低位产钳 B. 中位产钳
C. 高位产钳 D. 后出头产钳
7. 月经量过多是指经期出血量超过
A. 30ml B. 50ml
C. 70ml D. 80ml
8. 正常孕妇开始自觉胎动的时间通常在
A. 孕10~12周 B. 孕13~15周
C. 孕18~20周 D. 孕22~24周
9. 在分娩机制中，当胎头枕部达耻骨联合下缘时，以耻骨弓为支点完成的动作是
A. 衔接 B. 俯屈 C. 仰伸 D. 复位
10. 妇科肿瘤化疗患者出现肠道菌群紊乱时，需补充革兰阴性杆菌，可多饮用
A. 果汁 B. 豆浆 C. 浓茶 D. 酸奶
11. 关于新生儿卡介苗的预防接种，下列描述正确的是
A. 卡介苗可于室温环境中保存
B. 卡介苗稀释后，应在半小时内用完
C. 接种方法主要是皮下注射法
D. 注射完需用酒精棉球擦拭注射部位皮肤
12. 糖尿病孕妇控制血糖的首选药物是
A. 胰岛素 B. 二甲双胍 C. 格列苯脲 D. 阿卡波糖
13. 自然流产最多见的原因是
A. 染色体异常 B. 全身性疾病
C. 内分泌疾病 D. 母儿血型不合
14. 某女士，20岁，无性生活史。体操运动后出现右下腹剧烈疼痛伴呕吐。体温37℃，脉搏96次/分，下腹部拒按。B超提示右侧附件区有直径8cm的囊性包块。推测最可能的诊断是
A. 输卵管妊娠流产 B. 急性盆腔炎
C. 卵巢囊肿蒂扭转 D. 阑尾周围脓肿
15. 某孕妇，G₁P₀，孕37周，对角径为13cm，坐骨棘间径大于10cm，坐骨结节间径小于7.5cm，坐骨结节间径与出口后矢状径和为14cm。该孕妇存在的骨产道异常是
A. 骨盆入口狭窄 B. 中骨盆狭窄
C. 骨盆出口狭窄 D. 均小骨盆

第二部分 非选择题

16. 关于持续性枕后位的临床表现, 下列描述错误的是
- A. 不易并发胎膜早破
 - B. 临产后先露部下降不满意
 - C. 产程中过早有大便感
 - D. 阴道检查宫口开全, 胎头明显塑形
17. 关于妊娠 28 周末胎儿的发育特征, 下列描述正确的是
- A. 体重约 700g
 - B. 可有呼吸运动
 - C. 身长约 30cm
 - D. 指甲超过指端
18. 下列属于不孕症妇女卵巢功能检查的是
- A. 诊断性刮宫
 - B. 基础体温测定
 - C. 腹腔镜检查
 - D. 输卵管碘油造影
19. 某女士, 40 岁, 患 2 型糖尿病 10 年。近 1 周出现阴道瘙痒、烧灼感, 白带增多。妇科检查: 阴道分泌物呈白色粘稠豆渣样。首先应考虑的是
- A. 滴虫性阴道炎
 - B. 外阴阴道假丝酵母菌病
 - C. 宫颈肥大
 - D. 盆腔炎
20. 子宫颈癌最主要的扩散途径是
- A. 直接蔓延
 - B. 肺转移
 - C. 脊柱转移
 - D. 肾转移
21. 妇科肿瘤化疗采用动脉插管给药, 该方法适用于
- A. 癌性胸腹水者
 - B. 心包积液者
 - C. 脑和脊髓有病变者
 - D. 肿瘤晚期不宜手术者
22. 关于初乳的特点, 下列描述正确的是
- A. 糖含量多
 - B. 蛋白质含量少
 - C. 脂肪含量多
 - D. 能促进胎粪排出
23. 关于妇科手术患者术后护理措施, 下列描述不正确的是
- A. 术后第 1 日晨取半卧位
 - B. 为防止伤口出血减少活动
 - C. 术后遵医嘱给予止痛剂
 - D. 保持留置尿管通畅
24. 关于药物避孕的健康指导, 下列描述正确的是
- A. 复方短效口服避孕药宜早上服用
 - B. 若漏服应在 72 小时内补服
 - C. 如需生育应提前 3 个月停药
 - D. 服用避孕药期间不宜服用利福平
25. 关于诊断性刮宫的术前术后护理措施, 下列描述正确的是
- A. 术前 1 天禁食
 - B. 术前 2 天禁性生活
 - C. 术后卧床休息 30 分钟
 - D. 术后禁止盆浴 4 周

二、填空题: 本大题共 15 空, 每空 1 分, 共 15 分。

26. 新生儿出生后生理性体重下降, 可于_____天恢复至出生体重。
27. 胎体最先进入母体骨盆入口的部分称为_____。
28. 妊娠合并贫血最常见的类型是_____贫血。
29. 胎儿出生体重 \geq _____g 为巨大胎儿。
30. 产后出血是指胎儿娩出 24 小时内阴道出血量超过_____ ml。
31. 会阴切开缝合术常用的方式有会阴左中侧切与_____切开。
32. 老年性阴道炎常见于绝经后妇女, 因_____功能下降, 雌激素水平低落所致。
33. 宫颈炎最常用的有效治疗方法是_____治疗, 如激光、冷冻等方法。
34. 子宫颈癌的病理类型以_____癌为主。
35. 根据与子宫肌层的关系, 子宫肌瘤可分为肌壁间肌瘤、浆膜下肌瘤和_____肌瘤。
36. 无排卵性功血诊刮目的是_____和明确子宫内膜病理诊断。
37. 检查者用一手的两指或一指放入阴道, 另一手在腹部配合检查, 称为_____。
38. 临床常通过_____穿刺以辨明子宫直肠陷凹有无积液或邻近肿块的性质及原因。
39. 妇科肿瘤患者化疗时, 化疗药物用量大多是按_____计算。
40. 产褥病率是指产后_____小时至产后 10 天内, 口表测量体温, 每日至少测 4 次, 2 次体温达到或高于 38℃者。

三、名词解释题: 本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

- 41. 绝育
- 42. 难产
- 43. 第一产程
- 44. 胎儿窘迫
- 45. 原发性闭经

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

46. 简述骨盆的骨骼组成。
47. 简述不孕症病因中的女方因素。
48. 简述哺乳期妇女乳头皲裂的护理。
49. 简述早期识别妇科手术后腹腔内出血的征象。
50. 简述考虑妊娠期可能出现早期心力衰竭的表现。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

51. 某孕妇，32 岁，G₁P₀，宫内孕 34 周，未定期产检。近两天来感觉疲乏、头痛、视物不清。测血压 180/120mmHg，尿蛋白 6g/24h。追问病史，1 个月前血压 150/100mmHg，未治疗。产科检查：子宫大小与孕周相符，胎心率 150 次/分，枕右前位。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该孕妇最主要的医疗诊断；
- (2) 针对该类孕妇应采取的护理措施。

52. 某女士，38 岁，G₂P₁。3 个月前因葡萄胎行清宫术，术后定期随诊，3 天前出现咳嗽，痰中带血，检查后确诊为侵蚀性葡萄胎肺转移。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者发生肺转移的传播途径；
- (2) 该类肺转移患者的护理措施。