

2023年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

内科护理学（二）

（课程代码 03202）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 缺氧对呼吸的兴奋作用是通过
A. 外周压力感受器实现
B. 中枢压力感受器实现
C. 外周化学感受器实现
D. 中枢化学感受器实现
2. 肺炎患者出现胸痛时，应采取的体位是
A. 患侧卧位
B. 健侧卧位
C. 仰卧位
D. 俯卧位
3. 下列慢性心力衰竭治疗药物中，用以减轻心脏负荷的是
A. 地高辛
B. 多巴胺
C. 硝普钠
D. 比索洛尔
4. 患者，男性，67岁，反复发作一过性晕厥伴胸闷、乏力，心电图诊断为二度Ⅱ型房室传导阻滞，该患者首选的治疗是
A. 刺激迷走神经
B. 安装永久起搏器
C. 静注异丙肾上腺素
D. 静注阿托品
5. 患者，男性，71岁，因“间断胸痛2年，加重6小时”急诊以“急性心肌梗死”收入院，医嘱予24小时心电监护，在该患者发病24小时内最多见的心律失常类型是
A. 窦性心动过缓
B. 窦性心动过速
C. 房室传导阻滞
D. 室性期前收缩

6. 患者，男性，22岁，因“消化性溃疡”入院，幽门螺杆菌（+），经治疗后病情好转。护士指导其根除幽门螺杆菌治疗后，复查时应首选的检查是
A. 快速尿素酶试验
B. 幽门螺杆菌抗体检测
C. ^{13}C 或 ^{14}C 呼气试验
D. 粪便幽门螺杆菌抗原检测
7. 患者，男性，45岁。患溃疡性结肠炎多年，近半年自觉病情好转，未规律用药。2天前腹泻加重，伴呕吐、腹胀明显。查体腹部膨隆，可见胃肠型，压痛（+），反跳痛（-），肠鸣音消失。该患者最可能出现的并发症是
A. 中毒性巨结肠
B. 绞窄性肠梗阻
C. 结肠癌变
D. 结肠大出血
8. 目前认为，对于诊断早期肝性脑病包括亚临床脑病最有效的检查是
A. 血氨水平
B. 脑电图检查
C. 脑诱发电位检查
D. 心理智能测验
9. 慢性肾衰竭患者最常见的电解质紊乱是
A. 高钾血症
B. 高钙血症
C. 低镁血症
D. 低磷血症
10. 患者，男性，66岁，因慢性肾功能衰竭行血液透析治疗。在透析过程中，患者出现面色苍白、出汗、恶心等表现。护士应考虑该患者出现的并发症是
A. 失衡综合征
B. 低血压
C. 致热原反应
D. 感染
11. 甲状腺危象的治疗中，为抑制甲状腺激素合成及 T_4 转变为 T_3 ，应首选
A. 丙基硫氧嘧啶
B. 碘化钠
C. 糖皮质激素
D. β 受体阻滞剂
12. 糖尿病发生微血管病变可引起
A. 冠心病
B. 肾动脉硬化
C. 糖尿病肾病
D. 肢体动脉硬化
13. 导致肾综合征出血热的病原是
A. HBV
B. 埃博拉病毒
C. HCV
D. 汉坦病毒
14. 应按照甲类传染病管理及对患者施行严密隔离的疾病是
A. 狂犬病
B. 霍乱
C. 艾滋病
D. 肝炎
15. 脑栓塞最常见的病因是
A. 寄生虫卵
B. 脂肪栓子
C. 空气栓子
D. 心源性栓子

二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 护士指导肺炎患者留取合格痰标本，下列指导中正确的有
- A. 留取晨起第一口痰
B. 双氧水漱口 3 次
C. 用力咳出深部痰液
D. 送检时间不超过 2 小时
E. 无痰者可暂不留取标本
17. 护士对慢性肺源性心脏病患者进行的运动指导中，正确的有
- A. 活动前后应充分休息
B. 尽量在止喘药发挥最大作用时活动
C. 活动强度以运动后 30 分钟内呼吸恢复至运动前水平为宜
D. 街舞、杠铃等是较为适宜的运动形式
E. 有条件的应进行运动氧疗
18. 慢性左心衰竭患者可表现为
- A. 咳嗽、咯痰
B. 颈静脉怒张
C. 夜间阵发性呼吸困难
D. 上腹胀满、食欲不振
E. 肝脏肿大
19. 关于房颤治疗的描述，正确的有
- A. 持续房颤转复心律首选索他洛尔
B. 药物无效时应及时选用非同步电复律
C. 永久性房颤可应用洋地黄控制心室率
D. 射频消融术是房颤治疗的有效方法
E. 永久性房颤应长期接受华法林抗凝治疗
20. 高血压病的非药物治疗包括
- A. 限制钠摄入
B. 减轻体重
C. 适量运动
D. 戒烟
E. 戒酒
21. 下列因素中，可诱发肝性脑病的有
- A. 上消化道出血
B. 大量放腹水
C. 高纤维素饮食
D. 高蛋白饮食
E. 感染
22. 下列临床表现和实验室检查中，提示可能为重症胰腺炎的有
- A. 发热
B. 血钙降低
C. 腹痛
D. 血糖降低
E. 脐周皮肤瘀斑

23. 肾病综合征患者采用糖皮质激素治疗，护士向患者解释激素治疗应遵循的原则和方法中，正确的有
- A. 小剂量开始
B. 减撤药要慢
C. 维持用药要久
D. 可联合使用两种糖皮质激素类药物
E. 一天的剂量宜在早晨 8 点顿服
24. 糖尿病患者血脂紊乱的典型表现包括
- A. 低密度脂蛋白降低
B. 甘油三酯升高
C. 低密度脂蛋白升高
D. 高密度脂蛋白升高
E. 高密度脂蛋白降低
25. 霍乱患者在脱水虚脱期可表现为
- A. 剧烈腹泻
B. 喷射性呕吐
C. 脱水
D. 循环衰竭
E. 电解质紊乱及代谢性酸中毒

第二部分 非选择题

三、填空题：本大题共 20 空，每空 1 分，共 20 分。

26. 肺结核的主要传染源是_____的肺结核患者。
27. 肺血栓栓塞症溶栓治疗的主要并发症为_____。
28. 用脉搏血氧仪经皮测得的_____可用于评价氧合功能，大于 94%为正常，小于 90%提示低氧血症。
29. 心脏传导系统的细胞均能发出冲动，但以_____的自律性最高。
30. 急性左心衰竭患者应采取坐位，两腿下垂，以_____静脉回流。
31. 心房颤动患者听诊第一心音强弱不等，心室律_____，有脉短绌。
32. 安装永久起搏器后患者应避免剧烈运动，以防_____移位或脱落。
33. 引起急性病毒性心肌炎最常见的病毒是_____病毒。
34. 穿孔是消化性溃疡常见的并发症之一，最常发生于_____溃疡。
35. 溃疡性结肠炎一般首选_____治疗，因其可经肠菌分解为 5-氨基水杨酸和磺胺吡啶，前者为主要的有效成分。
36. 急性胰腺炎治疗的目标是抑制_____分泌，抑制胰酶活性及减少并发症的发生。
37. 上消化道大出血使用抑制胃酸分泌药物，可提高胃内_____值，有促进止血作用。
38. 慢性肾小球肾炎患者 24 小时尿蛋白定量多在_____ g/d。
39. 急性肾衰竭患者出现进行性_____增多是肾功能开始恢复的标志。

40. 胰腺胰岛 B 细胞分泌的_____是促进细胞摄取和利用葡萄糖,从而降低血糖的主要激素。
41. 目前认为 Graves 病属_____性甲状腺病,发病个体具有遗传易感性。
42. 糖尿病患者三餐热量分配可根据饮食习惯,选择 1/3、1/3、1/3 或_____均可。
43. 类风湿关节炎发生的关节肿胀主要累及小关节,尤其是_____关节的对称性多关节炎。
44. 系统性红斑狼疮患者最具特征性的皮疹为双面颊和鼻梁部位的_____。
45. 艾滋病潜伏期较长,可达 2 年~_____年。

四、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

46. 支气管哮喘
47. 急性心力衰竭
48. 甲状腺功能减退症
49. 系统性红斑狼疮
50. 中毒

五、简答题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。

51. 简述慢性心衰患者使用利尿剂治疗的药物护理要点。
52. 简述肝硬化患者的饮食护理要点。
53. 简述肾盂肾炎患者健康教育的主要内容。
54. 简述急性中毒昏迷患者病情观察的要点。

六、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

55. 患者,男性,65 岁。近 5 年来常于晨起出现咳嗽、咳白色粘痰,冬春交季时咳嗽较为明显。近半年来自觉体力下降,爬 2~3 层楼即出现喘息、气短,咳嗽咳痰亦较前加重,痰量增多,日常生活尚能自理。为进一步治疗来我院就诊。既往吸烟 40 余年,每日 30~40 支,饮酒 30 余年,啤酒 200ml/天,否认心脑血管疾病、糖尿病等疾病。

查体:BP 130/80mmHg, R 20 次/分,桶状胸、肋间隙增宽,双肺呼吸音粗,未闻及干湿啰音,HR 88 次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音,余(—)。

化验检查:血 WBC $8 \times 10^9/L$, Neut 65%, Hb 130g/L; AST 20U/L, Scr $87 \mu\text{mol/L}$;
血气分析示 pH 7.36, PaO₂ 62mmHg, PaCO₂ 45mmHg。

肺功能:FEV₁/FVC=59.57%, FEV₁实际/预测=70.8%, TLC 实际/预测=164.3%。

胸片:双肺纹理增粗。

诊断为“慢性阻塞性肺疾病”,给予茶碱口服治疗。

请写出:

- (1) 该患者诊断为“慢性阻塞性肺疾病”的诊断依据;
- (2) 医嘱患者进行长期家庭氧疗,护士指导患者应采取的氧流量和吸氧时间;
- (3) 护士指导患者进行缩唇腹式呼吸的原理和方法。

56. 患者,男性,36 岁,半年前无诱因开始头晕、乏力,间断出现下肢皮肤出血点,刷牙出血,服用中药治疗未见好转,近一周来上述症状加重,为求进一步诊治入院。患者既往体健,病后无鼻出血和黑便,二便正常。

查体:T 36.0℃, P 100 次/分, R 20 次/分, BP 120/70mmHg, 贫血貌,双下肢散在出血点,浅表淋巴结未触及,胸骨无压痛,心肺无异常,肝脾未触及。

化验检查:RBC $1.5 \times 10^{12}/L$, WBC $3.0 \times 10^9/L$, PLT $35 \times 10^9/L$, Hb 45g/L。

入院后为明确诊断行骨髓穿刺检查后诊断为“慢性再生障碍性贫血”,医嘱予丙酸睾酮 100mg, Qd, 肌肉注射。

请写出:

- (1) 该患者诊断为“慢性再生障碍性贫血”的主要依据;
- (2) 该患者骨髓象表现特点;
- (3) 丙酸睾酮治疗的主要护理措施。