

2023年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

外科护理学（一）

（课程代码 03001）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 手术伤口感染的外在因素是  
A. 切口部位选择不妥  
B. 机体抵抗力低下  
C. 伤口存在血肿  
D. 病人手术区的皮肤状况
2. 烟卷引流一般留置时间为  
A. 24小时  
B. 48~72小时  
C. 5天  
D. 7天
3. 深静脉血栓形成的危险因素不包括  
A. 年老  
B. 肥胖  
C. 术后活动少  
D. 男性
4. 给予高钾血症患者静脉注射碳酸氢钠的目的是  
A. 补充血容量  
B. 补钠  
C. 转移钾离子  
D. 增加肌肉兴奋性
5. 某大出血患者，护士测得其血压为98/50mmHg，脉率为110次/分，根据休克指数，该患者为  
A. 无休克  
B. 休克前期  
C. 有休克  
D. 严重休克
6. 能够动态监测营养治疗效果的最佳方法是  
A. 体重  
B. 白蛋白  
C. 前白蛋白  
D. 氮平衡

7. 男性，36岁，双下肢包括臀部全部烧伤，其面积为  
A. 30%  
B. 35%  
C. 40%  
D. 46%
8. 女性，23岁，清晨测血压130/70mmHg，脉率105次/分，判断其甲亢程度属于  
A. 正常  
B. 轻度  
C. 中度  
D. 重度
9. 乳腺癌患者，若癌肿侵犯cooper韧带，其典型的临床表现是  
A. 乳房疼痛  
B. 出现酒窝征  
C. 乳房局部隆起  
D. 出现橘皮样改变
10. 男性，45岁，十二指肠溃疡病史5年余。以“间断上腹痛”主诉入院。20天前食辛辣食物后出现上腹不适、恶心呕吐，进食后加重，呕吐呈非喷射性，量多，为胃内容物，为隔夜宿食，呕吐后腹胀可缓解。判断该患者最可能出现了  
A. 幽门梗阻  
B. 肠梗阻  
C. 出血  
D. 反流性食管炎
11. 高位小肠梗阻除腹痛外最主要症状是  
A. 腹胀明显  
B. 呕吐频繁  
C. 腹部包块  
D. 停止排便排气
12. 内痔主要的临床特点是  
A. 无痛性间歇性便后出鲜血  
B. 排便时疼痛伴痔核脱出  
C. 排便时无痛，但便中带血  
D. 排便、咳嗽时有疼痛
13. 原发性肝癌最有效的治疗方法是  
A. 放疗  
B. 化疗  
C. 手术  
D. 免疫疗法
14. 典型的胆管炎病人的高热呈  
A. 稽留热  
B. 间歇热  
C. 弛张热  
D. 波状热
15. 急性胰腺炎发病之初3~4小时，最有诊断价值的指标是  
A. 血糖升高  
B. 血淀粉酶升高  
C. 血清脂肪酶升高  
D. 血白细胞计数升高
16. 符合小脑幕切迹疝临床表现的是  
A. 头痛剧烈、呕吐频繁  
B. 无意识障碍  
C. 瞳孔持续缩小  
D. 心跳先于呼吸停止
17. 硬脑膜外血肿典型的意识障碍是  
A. 持续昏迷状态  
B. 昏迷-清醒-再昏迷  
C. 昏迷-清醒后不再昏迷  
D. 清醒-昏迷

18. 颅脑术后中枢性高热的特点是
- A. 体温超过 40°C                      B. 常在术后 72 小时后出现
- C. 常伴瞳孔散大                        D. 物理降温效果好
19. 男性, 28 岁, 左胸刀刺伤 1 小时, 出现进行性呼吸困难, 发绀。查体: 气管向右侧移位, 左胸壁皮下气肿, 呼吸音消失。目前应首先采取的紧急处理措施是
- A. 吸氧                                      B. 胸膜腔穿刺抽气
- C. 止痛                                        D. 开放静脉
20. 急性颅内压增高时常有明显的进行性意识障碍甚至昏迷, 出现 Cushing 综合征, 表现为
- A. 脉搏缓慢、呼吸深慢、血压升高
- B. 脉搏加快、呼吸深慢、血压升高
- C. 脉搏缓慢、呼吸深慢、血压降低
- D. 脉搏缓慢、呼吸加快、血压升高
21. 男性, 55 岁, 体检发现右上肺叶阴影, 形态不规则, 边缘有毛刺, 考虑是肺癌。如要明确诊断, 应建议患者进行的检查是
- A. CT    B. 血液肿瘤标记物
- C. 支气管镜活检                            D. MRI
22. 食管癌的早期表现是
- A. 消瘦                                        B. 进食呛咳
- C. 发热                                        D. 进食哽噎感
23. 某患者进行尿三杯试验, 第一杯尿液有镜下血尿, 提示病变部位在
- A. 前尿道                                      B. 膀胱颈
- C. 后尿道                                      D. 膀胱三角区
24. 男性, 45 岁, 建筑工人, 从高处跌落骨盆骨折, 导致尿道裂伤, 留置导尿管。为预防尿道狭窄, 应采取的措施是
- A. 留置导尿 1 个月
- B. 拔除导尿管后 1 个月做尿道扩张
- C. 拔出导尿管后每周 2 次尿道扩张, 持续 1 个月后定期尿道扩张
- D. 拔出导尿管后每周 1 次尿道扩张, 持续 1 个月后定期尿道扩张
25. 护士在对尿石症患者进行健康教育时建议患者多饮水预防结石, 其机制是
- A. 解除尿路梗阻                            B. 稀释尿液以减少尿中晶体形成
- C. 溶解结石                                    D. 改变尿液 pH 值
26. 膀胱结石的典型症状是
- A. 血尿                                        B. 尿痛
- C. 排尿突然中断                            D. 尿频

27. 男性, 75 岁, 经尿道前列腺电切术后, 留置三腔气囊导管持续膀胱冲洗, 护士发现患者尿色加深, 此时应该
- A. 停止冲洗                                    B. 加快冲洗速度
- C. 减慢冲洗速度                            D. 间断冲洗
28. 肾肿瘤的“三联症”是
- A. 尿频、疼痛、肿块                        B. 血尿、尿频、尿潴留
- C. 血尿、肿块、尿潴留                        D. 血尿、疼痛、肿块
29. 为骨折患者行骨牵引时, 一般下肢的牵引重量是体重的
- A. 1/12                                        B. 1/10
- C. 1/7    D. 1/5
30. 女性, 75 岁, 不慎跌倒后导致股骨颈骨折, 行人工假体置换术。对该患者的术后体位指导正确的是
- A. 术后 12 小时后可半卧位                    B. 术后一周内禁止侧卧
- C. 术后 48 小时床头抬高 45°                    D. 术后 24 小时床头抬高不宜超过 30°

## 第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 20 空, 每空 1 分, 共 20 分。

31. 局麻患者应注意观察的不良反应包括\_\_\_\_\_反应和\_\_\_\_\_反应。
32. 营养支持患者非蛋白质热卡与氮的比值维持在\_\_\_\_\_kcal~\_\_\_\_\_kcal: 1g 氮最佳。
33. 当血压和中心静脉压均低时, 提示\_\_\_\_\_不足, 应\_\_\_\_\_补液。
34. 甲状腺功能亢进患者术前准备常用的碘剂是\_\_\_\_\_, 其作用是抑制\_\_\_\_\_释放。
35. 肠梗阻按照有无血运障碍可分为\_\_\_\_\_肠梗阻、\_\_\_\_\_肠梗阻。
36. 夏柯(Charcot)三联症: \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、黄疸。
37. 正常成人颅内压为\_\_\_\_\_mmH<sub>2</sub>O, 其生理调节主要通过\_\_\_\_\_的增加或减少来实现。
38. 胸腔闭式引流管引流积液时, 应放置在腋中线和腋后线间的第\_\_\_\_\_肋间隙; 引流积气应放置在第\_\_\_\_\_肋间锁骨中线外侧。
39. 急性尿潴留患者一次导尿不超过\_\_\_\_\_ml, 防止膀胱内压迅速降低而导致休克及\_\_\_\_\_。
40. 骨折治疗的三大原则是复位、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

41. 高渗性脱水
42. 腹膜刺激征
43. 深静脉通畅试验
44. 中心静脉压监测
45. 骑跨伤

四、简答题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

46. 简述腹部手术患者发生切口全层裂开的处理。
47. 简述肠梗阻患者基础治疗和术前护理要点。
48. 简述腰椎间盘突出症患者术后预防神经根粘连的措施。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

49. 患者男，66 岁，诊断为“甲状腺功能亢进”，行甲状腺大部切除术，术后第 1 日出现恶心呕吐，烦躁不安，心动过速，高热、出汗。T 39.6℃，P 128 次/分，R 24 次/分，BP 100/60mmHg，神志清，但表情紧张。

问：(1) 目前患者发生了什么情况，可能由什么原因引起？

(2) 目前该患者的护理诊断/问题有哪些？

(3) 目前应采取哪些紧急护理措施？

50. 患者男，65 岁，因胃癌进行胃大部切除术，术后第 8 天。餐后半小时发生腹痛、腹胀、恶心、晕厥、心悸、大量出汗等症状。查体：T 35.5℃，P 58 次/分，R 18 次/分，BP 133/84mmHg。

问：(1) 患者出现了什么问题？其原因是什么？

(2) 如何预防该问题的发生？