

妇产科护理学（一）

（课程代码 03002）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共25小题，每小题1分，共25分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 某女，妊娠合并心脏病，产后2小时，腹部压沙袋，其目的是预防
A. 羊水栓塞
B. 产后出血
C. 心力衰竭
D. 腹部不适
2. 下列属于先兆临产表现的是
A. 见红
B. 规律性子宫收缩
C. 进行性宫颈口扩张
D. 进行性胎先露下降
3. 产褥感染的患者应采取的卧位是
A. 平卧位
B. 俯卧位
C. 侧卧位
D. 半坐卧位
4. 滞产的概念是指
A. 第一产程超过16小时
B. 第二产程超过2小时
C. 第三产程超过1小时
D. 总产程超过24小时
5. 第二产程时娩出胎儿的主要力量是
A. 肛提肌收缩力
B. 子宫收缩力
C. 膈肌收缩力
D. 腹肌收缩力

6. 在下丘脑-垂体-卵巢轴的调节过程中，能够分泌雌激素的器官是
A. 卵巢
B. 垂体
C. 下丘脑
D. 子宫
7. 关于妇科腹部手术后患者的出院教育，下列描述正确的是
A. 伤口拆线后即可盆浴
B. 首次随诊时间为术后3个月
C. 全子宫切除术患者自手术日起休息6周
D. 宫外孕手术的患者应禁止性生活3个月
8. 关于妇科肿瘤患者化疗药物外渗的处理，下列描述正确的是
A. 外渗后立即停药并局部封闭治疗
B. 外渗1~2天内局部冷敷
C. 外渗3~4天内局部冷热敷交替进行
D. 外渗5~6天只行局部热敷即可
9. 关于新生儿呼吸特点，下列描述正确的是
A. 呼吸肌发育很完善
B. 呼吸中枢调节功能良好
C. 以腹式呼吸为主
D. 频率为每分钟约20次
10. 正常产褥期胎盘附着面的子宫内膜基本完成修复大约需要
A. 2周
B. 4周
C. 6周
D. 8周
11. 关于阴道镜检查患者的护理要点，下列描述正确的是
A. 检查前1周禁止性生活
B. 检查后1个月内禁止盆浴
C. 检查前24小时内不做妇科检查
D. 不典型增生上皮涂复方碘液后呈棕褐色
12. 关于避孕药的不良反应及处理，下列描述正确的是
A. 类早孕反应轻者持续半年后可自行消失，不需处理
B. 若服药后出现闭经一年，可停药改用其他避孕方法
C. 月经前半周期出现突破性出血，多因孕激素不足
D. 长期口服避孕药，可降低卵巢癌发生的风险
13. 胎儿发生宫内窘迫最明显的临床征象是
A. 胎心率异常
B. 羊水胎粪污染
C. 胎动异常活跃
D. 胎儿酸中毒
14. 普查宫颈癌前期病变和早期宫颈癌，最常用的方法是
A. 宫颈刮片细胞学检查
B. 碘试验
C. 宫颈管活体组织检查
D. 阴道镜检查

15. 侵蚀性葡萄胎最主要的转移途径是
- A. 种植转移 B. 淋巴转移
C. 血行转移 D. 直接侵犯
16. 下列炎症中，需要夫妻双方同时治疗的是
- A. 外阴炎 B. 滴虫性阴道炎
C. 慢性宫颈炎 D. 老年性阴道炎
17. 产后出血是指胎儿娩出后 24 小时内阴道出血量超过
- A. 200 ml B. 300 ml
C. 400 ml D. 500 ml
18. 关于主韧带，下列描述正确的是
- A. 对固定子宫颈位置十分重要
B. 使宫颈向上、向后牵引，保持子宫前倾位
C. 子宫两侧向外伸展至骨盆侧壁的翼形腹膜结构
D. 含有丰富的血管、神经、淋巴管及疏松的结缔组织
19. 关于子宫内膜异位症患者的临床表现，下列描述错误的是
- A. 下腹痛 B. 不孕
C. 月经期延长 D. 月经周期紊乱
20. 目前最常用的剖宫产术式为
- A. 子宫下段纵切口 B. 子宫下段横切口
C. 古典型剖宫产术 D. 腹膜外剖宫产术
21. 下列辅助检查中，有助于前置胎盘诊断与分类的是
- A. B 型超声检查 B. 血 HCG 检查
C. 腹腔镜检查 D. 子宫血管造影检查
22. 关于全子宫切除术术前的阴道准备，下列描述正确的是
- A. 术前 3 日用 1: 40 络合碘冲洗阴道
B. 术前 3 日晚于宫颈口和穹窿处涂甲紫
C. 术前 3 日给予甲硝唑泡腾片置于阴道内
D. 如有阴道出血者，应多次彻底冲洗阴道
23. 功能失调性子宫出血的一线治疗方式是
- A. 手术治疗 B. 药物治疗
C. 放疗 D. 刮宫
24. 参与构成胎盘的蜕膜是
- A. 底蜕膜 B. 包蜕膜
C. 真蜕膜 D. 壁蜕膜
25. 一般情况下，妊娠晚期的子宫呈不同程度的
- A. 前倾 B. 后屈
C. 右旋 D. 左旋

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

26. 产后若原来胎盘附着面的蜕膜长期残留，子宫复旧不良，可发生晚期_____。
27. 妊娠合并心脏病妇女的孕期体重增长不宜超过_____Kg。
28. 影响分娩的四大因素包括产力、_____、胎儿及精神心理因素。
29. 羊水污染分为三度，I 度为_____色，常见于胎儿慢性缺氧。
30. 根据子宫内膜癌的病变形态和范围，可分为弥漫型和_____型。
31. 阴道上皮细胞中的糖原，在阴道杆菌的作用下可分解为_____。
32. 在放置胎头吸引器时，注意吸引器应避免胎头_____门。
33. 骨盆底内层由耻尾肌、髂尾肌及坐尾肌三部分共同组成_____肌。
34. 有排卵性功血可分为_____和子宫内膜不规则脱落两种。
35. 产后随子宫蜕膜的脱落，含有血液、坏死蜕膜组织和黏液的阴道排出物称为_____。
36. 妊娠期尺测子宫底高度是指从耻骨联合上缘经_____至子宫底测得的弧形长度。
37. 吸宫术是应用_____的方法将宫腔内妊娠产物吸出，而达到终止妊娠的目的。
38. 妇科肿瘤化疗中，最常见和最严重的不良反应是_____。
39. 全子宫切除术后 7~14 天内患者阴道有少量粉红色分泌物，此为_____缝线溶化所致。
40. 产程停滞是指宫口持续_____小时以上不开大，先露不下降。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

41. 骨盆轴
42. 胎盘滞留
43. 绝对不孕
44. 继发性闭经
45. 药物流产

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

46. 简述外阴炎患者的护理措施。
47. 简述新生儿居住条件的要求。
48. 简述第二产程护理中接生者的准备内容。
49. 简述羊水的作用。
50. 简述妇科化疗中血小板减少后易发生出血的部位及症状。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

51. 某孕妇，35 岁，孕 1 产 0，以“妊娠 29 周，头痛、眼花、恶心 3 天”入院，查体：血压 150/100mmHg，脉搏 90 次/分，双下肢水肿 (+)，尿蛋白 (++)，胎心 134 次/分。初步医疗诊断为“子痫前期”，医嘱进行硫酸镁治疗。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该类孕妇的护理措施；
- (2) 使用硫酸镁的注意事项。

52. 某女，23 岁，已婚，停经 86 天，近 1 周有不规则阴道出血。妇科检查：子宫底位于脐耻之间，质软。实验室检查：HCG 阳性。超声提示：宫腔内未见胎心胎芽，呈暴风雪样改变。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者最可能的医疗诊断及主要处理原则；
- (2) 该类患者出院宣教的主要内容。