

2023年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

护理学研究

(课程代码 03008)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共20小题, 每小题1分, 共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 科学精神最根本的一条就是
A. 自愿
B. 客观
C. 实事求是
D. 公平合理
2. 在临床中, 对护理技术、特护措施、护患关系等方面的研究属于
A. 护理理论研究
B. 护理管理的研究
C. 各专科临床护理研究
D. 护理学历史的研究
3. 在研究中, 身高(cm)、体重(kg)、脉搏(次/min)等属于
A. 数值变量
B. 定性变量
C. 有序分类变量
D. 无序分类变量
4. 反映研究变量及其相互关系的一种逻辑的、抽象的结构是
A. 理论
B. 概念
C. 框架
D. 命题
5. 按照学科内部逻辑次序排列, 从总论到各论, 从一般到具体, 从低级到高级进行编排的目录是
A. 主题目录
B. 著者目录
C. 书名目录
D. 分类目录

6. 查找文献最方便的文献检索途径是
A. 分类途径
B. 书名途径
C. 序号途径
D. 著者途径
7. 在MEDLINE中, 文摘的缩写是
A. AU
B. AI
C. AD
D. AB
8. 文献检索时的核心步骤是
A. 查找文献线索
B. 获取原始文献
C. 选择检索工具, 确定检索方法
D. 分析检索课题, 明确检索目的
9. 某护士在正式开始研究之前要进行一个预试验, 他估算的正式研究中所需的总样本量为200例, 根据预试验中样本量确定的原则, 他在预试验中可以选择的样本量为
A. 10例
B. 15例
C. 25例
D. 50例
10. 检验因果假设最有说服力的研究设计是
A. 类实验性研究
B. 根基理论研究
C. 实验性研究
D. 现象学研究
11. 某护士欲使用概率抽样方法进行研究中的抽样, 如果希望抽样误差最小, 他应该选择的抽样方法是
A. 整群抽样
B. 系统抽样
C. 单纯随机抽样
D. 分层抽样
12. 某护士正在进行艾滋病患者自我照护经历的质性研究, 她先访问了一位艾滋病患者, 然后由该患者推荐, 再访问第二人, 访问第二人后, 由第二位患者推荐, 再访问第三人, 如此继续下去, 最终访谈了11位艾滋病患者。该护士采用的抽样方法是
A. 目的抽样
B. 理论抽样
C. 滚雪球抽样
D. 定额抽样
13. 档案记录收集法的缺点是
A. 涉及伦理问题
B. 存在应答偏差
C. 花费较大
D. 需要研究对象合作
14. 某护士通过邮寄问卷的方法进行资料的收集, 较为满意的问卷回收率至少应达到
A. 50%以上
B. 60%以上
C. 70%以上
D. 80%以上
15. 常用来表示研究工具稳定性的是
A. 折半信度
B. 重测信度
C. 复本信度
D. 评定者间信度

16. 某护士自设哮喘患者自理行为问卷，欲了解该问卷中的条目关系是否体现此问卷所测量的自理行为概念，需测量
- A. 表面效度 B. 同时效度
C. 结构效度 D. 预测效度
17. 某护士计划针对偏态分布的计量资料进行两变量间相关性分析，应使用的统计学方法是
- A. Kendall 相关分析 B. 单样本 t 检验
C. Pearson 相关分析 D. 独立样本 t 检验
18. 某护士在研究中使用焦虑自评量表，根据评分标准，以 40 分为界，将总分转化为无焦虑和有焦虑，并分别计算两组的例数。这样的资料是
- A. 计数资料 B. 等级资料
C. 计量资料 D. 定量资料
19. 护理研究论文基本属性中最重要的是
- A. 实用性 B. 科学性
C. 先进性 D. 可读性
20. 某护理研究者对采用母乳、牛乳、混合乳三种不同方式喂养的 268 例健康婴儿的头发样品进行微量元素测定，研究论文题目为“对不同喂养方式婴儿头发中微量元素含量的比较”。这个文题反映了护理研究论文的题目所需遵循的原则是
- A. 切题 B. 客观
C. 新颖 D. 广泛

二、多项选择题：本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

21. 在以人为研究对象的研究中所遵循的尊重人的尊严的伦理原则包括
- A. 隐私权 B. 自主决定权
C. 公平治疗的权利 D. 充分认知的权利
E. 不被剥削或利用的权利
22. 研究所选指标的准确性是指所选指标能够准确反映研究的内容，且具有特异性。如判断泌尿系感染，下列属于特异性指标的有
- A. 体温 B. 尿急
C. 尿频 D. 尿痛
E. 血常规
23. 研究问题可以来自
- A. 研究者个人的兴趣 B. 个人实践
C. 受他人研究的启发 D. 研究者的灵感
E. 目前或未来需要探讨的问题

24. 理想的理论框架或概念框架图应具备的特征包括
- A. 逻辑性 B. 全面性
C. 唯一性 D. 指导性
E. 普遍性
25. 文献的类型按照文献的出版形式可划分为
- A. 图书 B. 期刊
C. 报纸 D. 特种文献
E. 微缩型文献
26. 某护士欲开展一项实验性研究，在其科研设计中必须具备的内容有
- A. 干预 B. 随机化
C. 盲法 D. 设立对照
E. 分层
27. 信息性偏倚的控制方法包括
- A. 随机化 B. 采用盲法收集资料
C. 匹配 D. 尽量使用客观的指标
E. 制定严格的资料收集和质量控制方法
28. 下列对自设问卷时的用词要求的描述，正确的有
- A. 清晰 B. 考虑教育程度较高者是否能理解
C. 不要暗示答案 D. 敏感性问题可以用第一人称进行询问
E. 问题应无倾向性
29. 访谈法的缺点包括
- A. 费时 B. 应答率较低
C. 花费大 D. 影响因素多
E. 所获资料不够丰富
30. 关于预测效度，下列陈述正确的有
- A. 是由评估人根据自己对所要测量的概念的理解来判断工具是否适当
B. 是指测量工具作为未来情况预测指标的有效程度
C. 是指研究工具与现有标准之间的相关
D. 重点是了解工具的内在属性
E. 属于校标关联效度
31. 对于正态分布的计量资料，比较组间差异的统计学方法有
- A. 单样本 t 检验 B. Mann-Whitney U 检验
C. 单因素方差分析 D. Kruskal-Wallis 秩和检验
E. 配对 t 检验

32. 护理研究者引进国外量表的步骤包括
- A. 翻译
 - B. 回译
 - C. 专家咨询
 - D. 等同性检验
 - E. 预试验
33. 护理综述论文的特征包括
- A. 信息性
 - B. 新颖性
 - C. 主观性
 - D. 综合性
 - E. 评述性

第二部分 非选择题

三、名词解释题：本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。

- 34. 外变量
- 35. 非实验性研究
- 36. 测量法
- 37. 样本
- 38. 护理经验论文
- 39. 评定量表

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

- 40. 简述研究中的研究假设的作用。
- 41. 简述结构式访谈适用的情况。
- 42. 简述统计图中纵轴和横轴的绘制要求。
- 43. 简述护理个案论文的正文写作格式。

五、应用题：本大题共 1 小题，10 分。

44. 某护理研究者欲探讨家庭康复指导对脑卒中患者日常生活能力的影响。将 60 例脑卒中出院患者分为两组，各 30 例。干预组定期家访，提供家庭康复指导；对照组不进行家访。3 个月后，采用日常生活能力量表（ADL）对两组患者进行测评。结果：干预组患者 ADL 得分为 30.45 ± 4.82 分，对照组为 37.58 ± 5.89 分。计划分析家庭康复指导对改善患者日常生活能力是否有效。请回答：

- (1) 本研究要分析的变量“ADL 得分”是哪类资料？
- (2) 两组的 ADL 得分均为正态分布，计划进行两组 ADL 得分的比较，选用的统计学方法是什么？选择此种统计学方法的依据是什么？
- (3) 使用此统计学方法进行统计分析的具体步骤是什么？