

2023年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

内科护理学（二）

（课程代码 03202）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 下列关于胸膜腔的叙述，正确的是
A. 由胸膜围成的密闭潜在腔隙
B. 壁层胸膜无感觉神经分布
C. 脏层胸膜有痛觉神经分布
D. 胸膜腔内压力一般为正压
2. 患者，男性，78岁，2小时前哮喘急性发作，其典型的表现是
A. 发作性伴哮鸣音的吸气性呼吸困难
B. 持续性伴湿啰音的吸气性呼吸困难
C. 发作性伴哮鸣音的呼气性呼吸困难
D. 持续性伴湿啰音的呼气性呼吸困难
3. 患者，男性，20岁，因社区获得性肺炎入院。其病原体侵入下呼吸道引起肺炎的最可能途径是
A. 直接吸入空气中的细菌
B. 血流播散
C. 邻近部位感染直接蔓延
D. 上呼吸道定植菌误吸
4. 患者，女性，83岁，因易疲劳、乏力就诊，查ECG发现持续房颤，心室率达130~150次/分，采取药物转复无效，考虑为永久性房颤，为控制心室率可应用的药物是
A. 胺碘酮
B. 洋地黄类药物
C. 普鲁帕酮
D. 索他洛尔
5. 患者，女性，66岁，因剧烈头痛、恶心，门诊查血压165/100mmHg，患者3年前确诊2型糖尿病，则其降压治疗的血压目标值为
A. <150/90mmHg
B. <140/90mmHg
C. <130/80mmHg
D. <120/80mmHg

6. 患者，男性，22岁，近半年反复出现上腹痛，为饥饿样，常于空腹或半夜出现，适当进食可缓解，伴返酸、嗝气。护士建议其首选的检查是
A. 快速尿素酶试验
B. 胃镜检查
C. ¹³C或¹⁴C呼气试验
D. 腹部B超检查
7. 患者，男性，45岁，因“反复腹泻伴脓血便3个月”入院，将于近日做结肠镜检查。护士对其检查前饮食指导中，正确的是
A. 检查前2~3天软食
B. 检查前1天半流食
C. 检查前当天流食
D. 检查当天禁食
8. 急性肾衰竭发生高钾血症时，最有效的处理措施是
A. 静脉注射10%葡萄糖酸钙
B. 静脉注射5%碳酸氢钠
C. 口服离子交换树脂
D. 血液透析
9. 目前普遍认可的慢性粒细胞白血病的根治性标准治疗方法是
A. 高白细胞单采治疗
B. 化学治疗
C. 造血干细胞移植
D. 脾区放射治疗
10. 淡漠型甲亢的特点是
A. 高代谢症候群显著
B. 易发生甲状腺危象
C. 多见于青少年
D. 甲状腺肿大显著
11. 下列药物中系统性红斑狼疮患者应避免服用的是
A. 糖皮质激素
B. 环磷酰胺
C. 异烟肼
D. 环孢素
12. 患者，男性，45岁，因喷洒有机磷农药中毒被送至急诊。患者主诉胸闷、恶心、视物模糊。查体：瞳孔缩小、大汗、流涎，心率50次/分。此症状称为
A. 中枢神经系统症状
B. 中间型综合征
C. 烟碱样症状
D. 毒蕈碱样症状
13. 传染的五种表现形式中最常见的是
A. 病原体被清除
B. 隐性感染
C. 显性感染
D. 病原携带状态
14. 狂犬病的潜伏期一般为
A. 5~12天
B. 15~30天
C. 1~3个月
D. 4~6个月
15. 患者，男性，70岁，因突发肢体瘫痪及意识障碍急诊以脑出血收入院。为确诊首选的检查是
A. 头颅CT
B. 头颅MRI
C. 脑血管造影
D. 经颅多普勒超声

二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 哮喘的治疗可以归纳为三大类，包括
- A. 抗炎
B. 祛痰
C. 解痉
D. 免疫疗法
E. 联合疗法
17. 患者，男性，22 岁，2 天前受凉后出现发热、咳嗽、咳痰，咳嗽和深吸气时左侧胸痛。查体：T 39.1℃，R 24 次/分，P 108 次/分，双肺呼吸音粗，可闻及散在啰音。初步诊断为“肺炎”。下列护理措施中，正确的是
- A. 卧床休息
B. 多饮水
C. 药物降温为主
D. 右侧卧位
E. 叩背协助排痰
18. 护士对肺栓塞患者进行的健康教育中，正确的是
- A. 减肥
B. 多饮水
C. 戒烟
D. 避免长期静坐
E. 弹力袜会减慢静脉回流，不推荐
19. 患者，男性，53 岁，突发心悸、头晕伴胸闷，急诊就诊查 ECG 示阵发性室上性心动过速，此时可采取的刺激迷走神经以终止发作的方式有
- A. 刺激咳嗽、咳痰
B. 压迫眼球
C. 诱导恶心
D. 嘱屏气用力
E. 按摩颈动脉窦
20. 患者，男性，49 岁，因突发剧烈胸痛、大汗伴濒死感，急诊以急性冠脉综合征收入院，在留观期间护士发现患者意识丧失，心电监护示波为室颤，则其心电图表现符合
- A. 示波为形态、频率及振幅均完全不规则的波动
B. 频率在 100~150 次/分
C. 频率在 150~500 次/分
D. QRS-T 波群难以区分
E. QRS-T 波群完全消失
21. 患者，男性，45 岁，乙肝后肝硬化多年。目前自觉纳差、上腹饱胀，查体可见巩膜黄染，前胸部可见蜘蛛痣，双手肝掌，脐周可见静脉曲张，腹软，肝脏未触及，脾脏肋下 2 指，移动性浊音 (-)。提示该患者肝功能减退的体征有
- A. 巩膜黄染
B. 脾脏肋下 2 指
C. 脐周静脉曲张
D. 肝掌
E. 蜘蛛痣

22. 护士对急性肾盂肾炎患者的健康指导中，正确的是
- A. 适量饮水
B. 勤排尿
C. 避免劳累
D. 勤换内衣裤
E. 易转为慢性肾盂肾炎
23. 患者，女性，21 岁，因持续低热、乏力，经门诊查血常规、骨髓穿刺活检诊断为急性非淋巴细胞白血病，给予 DA 方案化疗。治疗期间主要由柔红霉素引起的毒副作用包括
- A. 末梢神经炎
B. 静脉炎
C. 心脏传导损害
D. 出血性膀胱炎
E. 心肌损害
24. 对于病情突然恶化的狼疮性肾炎和严重中枢神经系统病变者采取大剂量激素冲击治疗时，可因此引起的不良反应包括
- A. 严重感染
B. 向心性肥胖
C. 高血压
D. 心律失常
E. 高血糖
25. 下列关于短暂性脑缺血发作 (TIA) 的叙述，正确的是
- A. 为一过性脑动脉供血不足
B. 为脑组织缺血、缺氧性坏死
C. 一般持续 10~15 分钟
D. 可能遗留神经功能缺损
E. 是脑梗死发生的重要危险因素之一

第二部分 非选择题

三、填空题：本大题共 20 空，每空 1 分，共 20 分。

26. 糖皮质激素治疗哮喘的机制是抑制气道变应性炎症，降低气道_____。
27. 肺结核化疗的原则是早期、_____、适量、规则和全程。
28. 肺心病发生的关键环节是肺动脉_____。
29. 氧合指数的正常值为 400~500mmHg，急性呼吸窘迫综合征时≤_____mmHg。
30. 机械通气最基本的作用是改善_____。
31. 依据美国 NYHA 心功能分级标准，心功能 I 级患者的体力活动_____。
32. 导致慢性心力衰竭的主要病因是原发性心肌损害和心室_____过重。
33. 治疗急性肺水肿患者时应给予_____流量氧气吸入。
34. 可用于肝性脑病患者长期治疗，以减少肠内毒物生成和吸收的首选药物是_____。
35. 肝硬化造成上消化道出血的患者，不宜输注库存血，是因为库存血中含_____较高，易诱发肝性脑病。

36. 慢性肾炎患者控制高血压的首选药物是_____类药物。
37. 缺氧和_____是促红细胞生成素生成的最主要刺激因素。
38. 在我国成人血红蛋白测定男性低于_____g/L可诊断为贫血。
39. 特发性血小板减少性紫癜发病的主要机制是_____因素。
40. 糖尿病酮症酸中毒患者表现出呼吸深大，呼气中出现_____味。
41. 类风湿关节炎患者恢复期进行关节功能锻炼或借助物理疗法，以避免_____。
42. 系统性红斑狼疮患者在活动期应卧床休息，卧床期间注意保持关节_____位。
43. 对于急性甲型及戊型肝炎患者应采取的隔离方式为_____隔离。
44. 震颤是帕金森患者的常见首发症状，其特点是静止性和_____性。
45. 癫痫诊断最常用的一种辅助检查方法是_____。

四、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

46. 慢性阻塞性肺疾病
47. 心脏电复律术
48. IgA 肾病
49. 溶血性贫血
50. 镇静催眠药慢性中毒

五、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

51. 简述肺结核大咯血窒息病人的抢救措施。
52. 简述慢性肾衰竭患者饮食中热量摄入的原则及原因。
53. 简述糖尿病患者运动治疗的方法。
54. 简述急性一氧化碳中毒的病因及发病机制。

六、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者，男性，58 岁，1 周前在骑车上坡时感心前区痛，并向左肩放射，经休息可缓解，近 2 天来走路快时亦有类似情况发作，每次持续 3~5 分钟，自服速效救心丸可缓解，为求进一步诊治来诊。患者既往有高血压病史 5 年，血压 150~180/90~100mmHg，无药物过敏史，吸烟 10 余年，1 包/天，家族无早发冠心病史。
查体：T 36.5℃，P 84 次/分，R 18 次/分，BP 180/100mmHg，一般情况好，无皮疹，浅表淋巴结未触及，巩膜不黄，心界不大，心律 84 次/分，律齐，无杂音，肺、腹（-），下肢无水肿。
化验检查：血常规、血脂、肌钙蛋白 T 及 CK-MB 测定未见异常，ECG 检查为正常心电图。初步诊断为“冠心病不稳定型心绞痛（初发劳力型）”，予硝酸甘油舌下含服，阿司匹林、普伐他汀口服治疗。

请写出：

- (1) 依据病史判断该患者具备的冠心病的易患因素；
- (2) 该患者初步诊断为“不稳定型心绞痛（初发劳力型）”的依据；
- (3) 护士指导患者正确服用硝酸甘油的内容要点。

56. 患者，男性，45 岁，4 小时前大量饮酒后出现上腹持续疼痛、阵发加重，呕吐一次，为胃内容物。1 小时前腹痛加重就诊。

查体：T 39.8℃，P 118 次/分，BP 100/60mmHg，R 20 次/分，神清、烦躁，心肺（-），脐周可见瘀斑，腹肌紧张，全腹压痛、反跳痛，移动性浊音（+），肠鸣音消失。

化验检查：血 WBC $14.5 \times 10^9/L$ ，Neut 85%，Hb 130g/L；血淀粉酶 520U/L，血钙 1.7mmol/L，血糖 12mmol/L。腹部 CT 提示出血坏死性胰腺炎。

诊断为“重症胰腺炎”，给予禁食、胃肠减压、补液和静点生长抑素等治疗。

请写出：

- (1) 提示该患者的胰腺炎为重症的表现和实验室指标；
- (2) 医嘱给予禁食和胃肠减压的目的；
- (3) 护士进行病情观察的要点。