

2024 年 4 月高等教育自学考试

急救护理学试题

课程代码:03007

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 急诊患者就诊过程中常常会产生优先感,其原因可能是
 - A. 拥挤嘈杂的环境导致
 - B. 认为自己病情最重
 - C. 会诊和检查的项目多
 - D. 等候时间过长
2. 急诊分诊护士应至少具备的急诊临床护理工作经验年限是
 - A. 2 年
 - B. 3 年
 - C. 4 年
 - D. 5 年
3. 急诊分诊中对于疑似传染病患者的处理,不正确的是
 - A. 直接转入感染性疾病科
 - B. 消毒接诊室
 - C. 直接进入急诊诊治流程
 - D. 加强患者的宣教
4. 胸膜炎患者胸痛加剧的常见诱因是
 - A. 咳嗽
 - B. 情绪激动
 - C. 劳累
 - D. 翻身
5. 患者,男性,34 岁,2 小时前无明显诱因突然出现腹部疼痛,疼痛位于右侧腰部,沿输尿管向下放射至会阴部。患者面色苍白,痛苦不安,伴大汗。尿常规示红细胞满视野。该患者腹痛最可能的病因是
 - A. 急性阑尾炎
 - B. 急性胆囊炎
 - C. 泌尿系结石
 - D. 急性胰腺炎

6. 院内心搏骤停患者的生存主要取决于
- A. 心搏骤停的监测与预防 B. 识别和启动应急反应系统
- C. 即时高质量心肺复苏和快速除颤 D. 高级生命维持和骤停后护理
7. 直接参与机体酸碱平衡调节的组织或器官不包括
- A. 肺脏 B. 血液
- C. 肾脏 D. 肝脏
8. 血清钾浓度的正常值为
- A. 1.4~3.4mmol/L B. 3.5~5.5mmol/L
- C. 5.6~7.6mmol/L D. 7.7~9.7mmol/L
9. 死亡率最高的休克类型是
- A. 低血容量性休克 B. 心源性休克
- C. 梗阻性休克 D. 分布性休克
10. 胸外心脏非同步直流电除颤时，双相波除颤仪的除颤电量一般选择
- A. 100J B. 150J
- C. 200J D. 250J
11. 使用止血带止血时，扎止血带的时间一般应小于
- A. 15min B. 30min
- C. 1h D. 4h
12. 海平面静息状态下呼吸空气时，提示为II型呼吸衰竭的动脉血气分析结果是
- A. PaO₂ 55mmHg, PaCO₂ 30mmHg B. PaO₂ 55mmHg, PaCO₂ 40mmHg
- C. PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 45mmHg D. PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 60mmHg
13. 心力衰竭患者心源性猝死发生率明显增加的左心室射血分数（LVEF）界值是
- A. 55% B. 45%
- C. 35% D. 25%
14. 上消化道出血病因诊断的首选方法是
- A. 胃镜检查 B. X线钡剂造影
- C. 选择性动脉造影 D. 放射性核素扫描
15. 下列属于下尿路结石的是
- A. 肾盂结石 B. 肾盏结石
- C. 输尿管结石 D. 膀胱结石
16. 糖尿病酮症酸中毒患者少见但可致命的并发症是
- A. 低血糖 B. 低血钾
- C. 代谢性酸中毒 D. 脑水肿

17. 低血糖昏迷患者升血糖治疗不宜采用
- A. 静脉注射 50%葡萄糖 B. 静脉输注 10%葡萄糖液
- C. 皮下注射胰高血糖素 D. 口服补充葡萄糖液
18. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是
- A. 颅内肿瘤 B. 脑血管畸形
- C. 高血压合并动脉硬化 D. 颅内动脉瘤破裂
19. 椎基底动脉系统梗死患者的典型表现为
- A. 失语 B. 眩晕
- C. 对侧偏瘫 D. 同向性偏盲
20. 提示脑卒中患者出现脑疝的典型临床表现是
- A. 头痛 B. 恶心呕吐
- C. 呼吸减慢 D. 双侧瞳孔不等大
21. 头颅 CT 发现边界清楚的椭圆形高密度影提示
- A. 脑栓塞 B. 脑血栓形成
- C. 脑出血 D. 蛛网膜下腔出血
22. 根据新九分法，总面积在 10%~29%的二度烧伤，其严重度为
- A. 轻度烧伤 B. 中度烧伤
- C. 重度烧伤 D. 特重度烧伤
23. 决定分娩是否顺利的主要因素不包括
- A. 年龄 B. 产力
- C. 产道 D. 胎儿
24. 按照损伤部位，眼球贯通伤中最常见的是
- A. 角膜贯通伤 B. 角巩膜贯通伤
- C. 巩膜贯通伤 D. 眼球壁贯通伤
25. 某患者因生石灰溅入右眼 3 小时来就诊，查体可见右眼角膜缘组织缺血坏死，呈瓷白色混浊，视力严重下降。该患者的病情程度为
- A. 轻度损伤 B. 中度损伤
- C. 重度损伤 D. 极重度损伤
26. 人体最常见的骨折是
- A. 颅骨骨折 B. 鼻骨骨折
- C. 颈椎骨折 D. 胫骨骨折
27. 热射病的三联征表现为
- A. 高热、无汗、意识障碍 B. 低热、无汗、血压下降
- C. 高热、大汗、血压下降 D. 低热、大汗、意识障碍

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

36. 简述稽留热的特点及常见原因。
37. 简述高质量胸外按压的标准。
38. 简述洋地黄中毒的临床表现及处理。
39. 简述癫痫发作的共性特征。

四、论述题：本大题共 1 小题，10 分。

40. 试述损伤急救中止血的方法及适应证。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

41. 某急性心肌梗死患者拟行急诊冠状动脉支架成形术（PCI），在送往导管室途中，患者突然出现双眼凝视、全身抽搐，心电图示波如题 41 图所示：



题 41 图

请写出：

- (1) 该患者双眼凝视和全身抽搐最可能的原因；
 - (2) 现场 2 名医务人员应立即采取的急救措施。
42. 患者，男性，28 岁，消化性溃疡病史 3 年。今日晨起出现呕吐咖啡色胃内容物，量约 400ml，解柏油样大便 4 次，量约 700 克，感头晕、大汗，立即被送来医院。体格检查：T 37.8℃ P128 次/分 R 24 次/分 BP 85/50mmHg，神清合作，面色苍白，皮肤巩膜无黄染，未见肝掌、蜘蛛痣，双肺呼吸音清晰，心界不大，心率 128 次/分，节律齐，未闻及杂音，腹软，剑突下压痛，无反跳痛，肝、脾未扪及。肠鸣音 18 次/分，移动性浊音阴性。四肢冷，膝反射正常。实验室检查：血常规 Hb 65g/L，WBC $9.0 \times 10^9/L$ 。

请写出：

- (1) 该患者可能出现的消化性溃疡的并发症；
- (2) 针对该患者应立即采取的急救护理措施。