

儿科护理学（二）

(课程代码 03011)

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 儿科临床特点不包括

A. 起病急	B. 来势猛
C. 变化多	D. 无危险
2. 儿童体格生长发育第二个高峰期出现在

A. 婴儿期	B. 幼儿期
C. 学龄期	D. 青春期
3. 儿童头围与胸围约相等的年龄是

A. 1岁	B. 2岁
C. 3岁	D. 4岁
4. 前囟的测量方法为

A. 对角线	B. 长边长
C. 对边中点连线	D. 短边长
5. 儿童时期特有的能量需求是

A. 基础代谢	B. 生长发育
C. 活动消耗	D. 排泄消耗
6. 护理新生儿颅内出血患儿时注意

A. 保持安静，减少刺激	B. 多搬动
C. 鼓励母亲抱起哺乳	D. 可轻摇哄睡
7. 新生儿败血症的最典型的临床表现是

A. 黄疸	B. 贫血
C. 无特征性表现	D. 呼吸衰竭
8. 新生儿败血症体温过高的护理措施是

A. 松解包被	B. 使用退热剂
C. 冰盐水灌肠	D. 降低病房温度
9. 新生儿寒冷损伤综合征最主要的护理措施是

A. 喂养	B. 复温
C. 预防感染	D. 补液
10. 儿童获取维生素 D 的主要来源是

A. 药物补充	B. 食物
C. 晒太阳	D. 睡眠
11. 维生素 D 缺乏性佝偻病引起骨质软化的表现为

A. 手镯	B. 肋骨串珠
C. 方颅	D. 乒乓头
12. 引起儿童秋季腹泻的是

A. 诺如病毒	B. 轮状病毒
C. 柯萨奇病毒	D. 星状病毒
13. 慢性腹泻是指病程超过

A. 2周	B. 1个月
C. 2个月	D. 3个月
14. 腹泻患儿的护理措施正确的是

A. 积极服用抗生素	B. 积极使用止泻剂
C. 严格禁食	D. 肛周皮肤保持清洁干燥
15. 先天性心脏病最常见的类型是

A. 室间隔缺损	B. 房间隔缺损
C. 动脉导管未闭	D. 法洛氏四联症
16. 法洛氏四联症患儿发生急性脑缺氧时应采用的体位是

A. 仰卧位	B. 俯卧位
C. 截石位	D. 膝胸卧位
17. 患儿，男，14 月龄，因面色稍苍白就诊，生后一直纯母乳喂养，外周血涂片可见红细胞大小不等，以小细胞多见，中央淡染区扩大，其可能的病因是

A. 感染	B. 未及时添加含铁辅食
C. 先天储铁不足	D. 吸收障碍

18. 营养性巨幼红细胞性贫血的病因是缺乏
 A. 维生素 D B. 铁
 C. 叶酸 D. 维生素 C
19. 化脓性脑膜炎患儿的脑脊液典型表现为
 A. 外观清亮 B. 外观血性
 C. 压力正常 D. 外观混浊
20. 有关病毒性脑炎的描述正确的是
 A. 大多数病程呈自限性 B. 脑脊液外观混浊
 C. 一般不发热 D. 治疗上主要使用糖皮质激素
21. 麻疹患儿最常见的并发症是
 A. 肺炎 B. 腹泻
 C. 心肌炎 D. 喉炎
22. 麻疹患儿可能出现的临床表现是
 A. 不发烧 B. 皮疹最先出现在胸腹部
 C. 痘间无正常皮肤 D. 出现口腔麻疹黏膜斑
23. 关于麻疹患儿应采取的护理措施是
 A. 积极降温 B. 无需隔离
 C. 清淡饮食 D. 多洗澡，清除皮屑
24. 有关流行性腮腺炎描述正确的是
 A. 腮腺炎患者是唯一传染源 B. 呼吸道传播是唯一的传播途径
 C. 一般只出现在一侧 D. 可引发睾丸炎
25. 5岁儿童的身高按照公式计算应为
 A. 110cm B. 112cm
 C. 114cm D. 116cm
26. 患儿男，胎龄33周，生后半小时，入温箱，下列护理措施不正确的是
 A. 温箱需提前预热 B. 接触患儿前后均需洗手
 C. 喂哺时需将患儿抱出温箱 D. 每天测量患儿体重
27. 判断儿童营养不良程度的重要指标是
 A. 身高 B. 皮下脂肪层厚度
 C. 肌张力 D. 精神状态
28. 新生儿，G1P1，胎龄38周，体重2600g，哭声响亮，四肢屈曲，脐带已结扎，此时最主要的护理措施是
 A. 保暖 B. 喂养
 C. 沐浴抚触 D. 接种卡介苗
29. 患儿，女，3个月，家长诉近两周以来患儿经常无诱因的出现哭闹，夜间入睡困难，易惊醒，多汗。患儿突发惊厥，四肢抽动，两眼上翻。护士采取护理措施错误的是
 A. 立即吸氧 B. 就地抢救，保持安静
 C. 遵医嘱使用葡萄糖酸钙 D. 立即补充维生素D
30. 轻型腹泻与重型腹泻的区别主要是
 A. 发热程度 B. 腹泻次数
 C. 大便性状 D. 是否伴随有水电解质紊乱

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共5小题，每空1分，共10分。

31. 正常足月新生儿是指胎龄满_____，出生体重在_____，无任何畸形和疾病的活产婴儿。
32. 水痘患儿皮肤黏膜相继出现和同时存在_____、丘疹、疱疹和_____等各类皮疹。
33. 足月儿出生时已经具有的原始反射有觅食反射、_____、握持反射、_____和交叉伸腿反射。
34. 维生素D缺乏性手足搐搦症典型症状是_____、手足搐搦和_____。
35. 母乳蛋白质以_____为主，钙、磷比例为_____，利于婴儿消化吸收。

三、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。

36. 新生儿期
 37. 适中温度
 38. 骨髓外造血
 39. 法洛四联症
 40. 头围

四、简答题：本大题共5小题，每小题5分，共25分。

41. 简述母乳喂养的优点。
 42. 儿童生长发育遵循怎样的规律？
 43. 简述口服铁剂的注意事项。
 44. 一岁以内儿童计划免疫的“五苗七病”分别是指什么？
 45. 新生儿生理性黄疸的临床表现有哪些？

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 请针对急性肾小球肾炎患儿进行活动指导与饮食指导。

47. 患儿，男，2岁，因“发热、咳嗽3天，加重1天”入院，3天前患儿受凉后出现

咳嗽、发热($T39.8^{\circ}\text{C}$)，家长自行给予感冒药和退热处理，今日患儿出现烦躁不安，

气促加重，咳嗽剧烈，痰液粘稠，不易咳出。既往体弱，有支气管炎反复发作病史。

体格检查： $T39.9^{\circ}\text{C}$ ， $P132$ 次/分， $R36$ 次/分， $BP80/65\text{mmHg}$ 。面色稍苍白，精神

萎靡，咽部充血，听诊双肺可闻及较密集中细湿啰音。

请根据以上资料回答：

(1) 该患儿最有可能的临床诊断。

(2) 该患儿 2 个主要护理问题。

(3) 针对该患儿主要的护理措施。