

2024年10月高等教育自学考试  
儿科护理学(本)试题  
课程代码:13200

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 女婴,体重8kg,身长72cm,坐立时能左右转身,已会爬,能发简单的“爸爸”、“妈妈”的音节,推断其月龄为  
A. 3~5个月  
B. 6~7个月  
C. 8~9个月  
D. 10~11个月
2. 小儿,3岁半,仍有经常性的不自主排尿,夜里尿床,母亲带孩子来咨询是否为遗尿症,护士告知诊断遗尿症的年龄应大于  
A. 3岁  
B. 4岁  
C. 5岁  
D. 6岁
3. 胎龄32周早产儿,体重1450g,体温不升,呼吸50次/min,血氧饱和度95%,胎脂较多。护士首先应采取的护理措施是  
A. 将患儿置于暖箱中  
B. 给予鼻导管高流量吸氧  
C. 立即擦净胎脂  
D. 接种卡介苗
4. 新生儿肺透明膜病的病因是  
A. 出生前感染  
B. 胎粪吸入  
C. 羊水吸入  
D. 缺乏肺泡表面活性物质

5. 婴儿营养不良的主要原因是
- A. 先天不足  
B. 长期发热  
C. 喂养不当  
D. 活动增加
6. 佝偻病患儿 3~6 个月出现的骨骼改变是
- A. 方颅  
B. 颅骨软化  
C. 漏斗胸  
D. 肋骨串珠
7. 患儿女, 2 岁, 以化脓性脑膜炎入院。治疗期间突然出现烦躁不安, 频繁呕吐, 四肢肌张力明显增高, 双侧瞳孔大小不等、对光反射迟钝。提示患儿出现的并发症是
- A. 硬膜下积液  
B. 脑疝  
C. 脑积水  
D. 呼吸衰竭
8. 3 个月的健康小儿应当接种的疫苗是
- A. 卡介苗  
B. 乙肝疫苗第一针  
C. 脊灰灭活疫苗第一针  
D. 百白破疫苗第一针
9. 病毒性心肌炎患儿在急性期应至少卧床休息至体温正常后
- A. 1~2 周  
B. 3~4 周  
C. 5~6 周  
D. 7~8 周
10. 患儿女, 14 个月, 因青紫诊断为法洛四联症。今患儿用力大便后突然出现呼吸困难、青紫加重伴抽搐, 考虑该患儿可能发生了
- A. 缺氧发作  
B. 脑血栓  
C. 心力衰竭  
D. 脑膜炎
11. 治疗小儿心力衰竭使用硝普钠时, 应注意
- A. 快速输注  
B. 避免与强心药同用  
C. 避免与利尿药同用  
D. 输液时药瓶和管道应避光
12. 儿童糖尿病急症死亡的主要原因是
- A. 低血糖  
B. 高血钾  
C. 酮症酸中毒  
D. 代谢性碱中毒
13. 为避免先天性甲状腺功能减退症患儿出现神经系统功能损害, 甲状腺素制剂开始治疗的时间应在出生
- A. 3 个月内  
B. 6 个月后  
C. 9 个月后  
D. 12 个月后
14. 小儿液体疗法中补充累积损失量时, 低渗性脱水应补充的溶液是
- A. 1/3 张含钠液  
B. 1/2 张含钠液  
C. 2/3 张含钠液  
D. 等张含钠液
15. 患儿男, 10 个月, 腹泻 3 天, 精神淡漠, 皮肤弹性极差, 眼窝前凶明显凹陷, 哭时无泪, 尿量极少, 其脱水程度为
- A. 轻度脱水  
B. 中度脱水  
C. 重度脱水  
D. 极重度脱水

16. 患儿男, 6 岁, 单纯型肾病, 精神可, 食欲减退, 全身浮肿尤其阴囊水肿明显, 此时首要的护理措施是
- A. 保持床铺整洁  
B. 密切观察病情变化  
C. 提供高蛋白饮食  
D. 用丁字带托起阴囊, 保护皮肤
17. 肾炎型肾病的临床特点是
- A. 多见于 2~7 岁起病  
B. 水肿比单纯型肾病明显  
C. 可出现血尿或高血压  
D. 易并发消化道感染
18. 关于过敏性紫癜皮疹的特点, 叙述不正确的是
- A. 胸部最多见  
B. 对称性分布  
C. 反复成批出现  
D. 不痛、不痒
19. 川崎病发病早期静脉注射丙种球蛋白的主要作用是
- A. 预防冠状动脉病变  
B. 纠正心律失常  
C. 补充营养  
D. 预防感染
20. 婴儿沐浴水温应控制在
- A. 30~32℃  
B. 32~34℃  
C. 35~37℃  
D. 38~40℃
21. 哮喘长期控制治疗的首选吸入药物为
- A. 沙丁胺醇  
B. 布地奈德  
C. 异丙托溴胺  
D. 氨茶碱
22. 流行性腮腺炎的最主要传播途径是
- A. 接触传播  
B. 血液传播  
C. 飞沫传播  
D. 消化道传播
23. 手足口病的病原体为
- A. 腺病毒  
B. 肠道病毒 71 型  
C. 链球菌  
D. 致病性大肠杆菌
24. 患儿确诊为肺结核, 遵医嘱使用利福平, 下列属于该药物毒性反应的是
- A. 肝功能损害, 血清转氨酶增高  
B. 大剂量时可出现精神兴奋或异常  
C. 对红绿两色分辨能力减退、视野缩小  
D. 引起耳聋、耳鸣、眩晕
25. 采取催吐方法解毒适用于食入毒物
- A. 4~6 小时内  
B. 6~8 小时内  
C. 8~10 小时内  
D. 10~12 小时内

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 二、简答题:本大题共5小题,每小题6分,共30分。

26. 简述婴儿配方乳喂养时的注意事项。
27. 简述护士与家长协作应对患儿住院分离的护理措施。
28. 简述新生儿缺氧缺血性脑病的护理措施。
29. 简述小儿液体疗法补液阶段病情观察的主要内容。
30. 简述急性肾小球肾炎典型临床表现。

### 三、论述题:本大题共2小题,每小题10分,共20分。

31. 患儿,男,5岁,因发热伴咳嗽3天收入院。患儿入院后以干咳为主,有痰咳不出,体温39℃,呼吸35次/分,胃纳欠佳。实验室检查肺炎支原体抗体阳性。肺部CT提示左下肺实变。确认为肺炎支原体肺炎。

请根据以上资料回答:

- (1) 患儿现存的2个主要护理问题;
- (2) 针对该患儿主要的护理措施。

32. 患儿,女,9个月,出现面色苍白2个月,伴精神不振,不爱活动,食欲差。生后6个月不规则添加米粉糊,未添加其他食物。查体:精神萎靡,营养发育较差,反应迟钝,皮肤粘膜和甲床苍白,前囟1.6×1.6cm,心率135次/分,律齐,双肺无异常,肝肋下3cm,脾肋下1.5cm,质软。实验室检查:血红蛋白65g/L,外周血涂片见红细胞体积小、中央淡染区扩大。

请根据以上资料回答:

- (1) 写出该患儿的临床诊断;
- (2) 写出患儿出现肝脾肿大的原因;
- (3) 列出该患儿的主要护理问题;
- (4) 列出该患儿饮食管理及用药护理措施。