

# 2024 年 10 月高等教育自学考试

## 内科护理学(专)试题

课程代码: 14035

- 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
- 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

### 选择题部分

**注意事项:**

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题:**本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

- 肺炎链球菌肺炎典型的痰液颜色为
  - 红棕色
  - 黄绿色
  - 铁锈色
  - 粉红色
- 患者,女性,25岁,因“支气管哮喘”遵医嘱使用普米克都保。该患者使用都保的操作,不正确的是
  - 移去瓶盖,确保红色旋柄在下方
  - 握住瓶身,垂直竖立
  - 将底座向左旋转到底,再向右旋转到底
  - 先对着吸嘴呼气,然后用双唇包住吸嘴吸气
- 下列属于继发性肺结核的是
  - 胸内淋巴结结核
  - 浸润性肺结核
  - 血行播散性肺结核
  - 结核性胸膜炎
- 原发性支气管肺癌最常见的类型为
  - 腺癌
  - 鳞癌
  - 大细胞癌
  - 小细胞肺癌
- 不属于自发性气胸的是
  - 交通性气胸
  - 张力性气胸
  - 医源性气胸
  - 单纯性气胸

6. 右冠状动脉起源于
- A. 前降支    B. 回旋支  
C. 右主动脉窦                                    D. 冠状静脉窦
7. 左心衰竭的典型表现是
- A. 不同程度的呼吸困难                        B. 咳嗽、咳痰、咯血  
C. 疲乏、无力、头晕                            D. 食欲缺乏、恶心、呕吐
8. 患者，男性，48岁，高血压病史2年。5小时前无明显诱因出现胸痛，位于心前区巴掌样大小，呈持续性闷痛，向后背放射，心电图显示V<sub>1</sub>~V<sub>6</sub>导联ST段明显弓背向上抬高。该患者的胸痛最可能是由于
- A. 稳定型心绞痛                                B. 不稳定型心绞痛  
C. 恶化型心绞痛                                D. 急性心肌梗死
9. 患者，男性，46岁，因上腹痛2周门诊胃镜检查确诊“胃溃疡”，医嘱予以兰索拉唑治疗，该药的主要作用是
- A. 降低胃蛋白酶活性                            B. 抑制H<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-ATP酶  
C. 促进内源性前列腺素合成                    D. 阻止组胺与H<sub>2</sub>受体结合
10. 进展期胃癌最常见的症状是
- A. 食欲不振                                        B. 呕吐  
C. 咽下困难                                        D. 上腹痛
11. 克罗恩病最常见的并发症是
- A. 腹腔内脓肿                                    B. 肠梗阻  
C. 中毒性巨结肠                                D. 肠穿孔
12. 急性胰腺炎的首发症状是
- A. 发热    B. 恶心  
C. 腹痛    D. 呕吐
13. 慢性肾小球肾炎患者血压控制目标为
- A. 120/80mmHg以下                            B. 130/80mmHg以下  
C. 140/90mmHg以下                            D. 150/90mmHg以下
14. 肾结构和功能的基本单位是
- A. 肾单位                                        B. 肾小体  
C. 肾小管                                        D. 肾小球
15. 诱发DIC最主要的病因是
- A. 输血反应                                      B. 大面积烧伤  
C. 严重感染                                      D. 休克

16. 下列不符合单纯性甲状腺肿的实验室检查结果是  
A. 血清总甲状腺素 (TT<sub>4</sub>) 基本正常  
B. 血清三碘甲腺原氨酸 (TT<sub>3</sub>) 基本正常  
C. 血清促甲状腺素 (TSH) 基本正常  
D. TT<sub>3</sub>/TT<sub>4</sub> 比值常降低
17. 患者，男性，19岁，诊断为“甲状腺功能亢进”，医嘱予以甲巯咪唑 10mg tid 口服。服药1周后患者自觉咽痛，此时应首先建议患者  
A. 停用甲巯咪唑                           B. 加用抗生素  
C. 卧床休息                                D. 复查血常规
18. 类风湿关节炎的基本病理改变是  
A. 关节滑膜炎                            B. 骨质破坏  
C. 血管内膜炎                            D. 软骨破坏
19. 提示类风湿关节炎病情活动的不包括  
A. 血红蛋白下降                           B. 红细胞沉降率升高  
C. C反应蛋白升高                        D. 晨僵
20. 系统性红斑狼疮患者饮食护理中应注意避免进食  
A. 菠菜                                      B. 白菜  
C. 杨桃                                      D. 芹菜
21. 有机磷中毒患者的死因主要为  
A. 呼吸衰竭                                B. 肾衰竭  
C. 心力衰竭                                D. 肝衰竭
22. 患者，女性，36岁，因家中煤气泄漏发生昏迷。下列处理不正确的是  
A. 立即脱离中毒环境                      B. 持续低流量吸氧  
C. 防治脑水肿                             D. 控制高热和抽搐
23. 最常见的中暑类型是  
A. 热射病                                    B. 日射病  
C. 热衰竭                                    D. 热痉挛
24. 自病原体侵入机体至开始出现临床症状的一段时期称为  
A. 潜伏期                                    B. 前驱期  
C. 症状明显期                             D. 恢复期
25. 丙型肝炎的主要传播途径为  
A. 粪-口传播                                B. 血液传播  
C. 母婴传播                                D. 性接触传播

## 非选择题部分

### 注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 二、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

26. 简述呼吸衰竭按动脉血气的分类及各类型血气分析的特点。
27. 简述肝性脑病的诱因。
28. 简述肾性水肿患者的皮肤护理措施。
29. 简述糖尿病代谢紊乱症候群的临床表现。
30. 简述被狂犬咬伤后清创处理的措施。

### 三、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

31. 患者，男性，67岁，2年前出现胸闷症状，诊断为急性心肌梗死行支架置入治疗。5天前患者上呼吸道感染后出现气短，伴咳嗽、咳白色泡沫痰，不能平卧，在室内稍事活动即感症状加重。查体：T 37.3℃，P 116 次/分，R 28 次/分，BP 150/90mmHg，神清，呼吸急促，双肺可闻干湿啰音，心界向左扩大，心率 116 次/分，律齐。血常规白细胞  $19.69 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分数 80.9%；BNP 明显升高。临床诊断为“冠心病、慢性心力衰竭”，给予利尿、强心、抗感染等治疗。

请写出：（1）该患者慢性心力衰竭的诊断依据；

- （2）该患者目前心功能分级；
- （3）该患者休息与活动的指导。

32. 患者，男性，40岁，乏力伴发热2周就诊。查体：T 37.8℃，P 86 次/分，R 18 次/分，BP 110/70mmHg，贫血貌，心肺（-），胸骨下段压痛（+），肝肋下 0.5cm，脾肋下 1.5cm。血常规示白细胞  $86.6 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 52g/L，血小板  $12 \times 10^9/L$ ，骨髓穿刺报告示增生极度活跃，以“急性粒细胞性白血病”收住入院。医嘱予以抗感染、输注红细胞、血小板等治疗，拟行 IA（去甲氧柔红霉素、阿糖胞苷）方案诱导缓解治疗。

请写出：（1）该患者诱导缓解治疗的目的；

- （2）该患者化疗中防治局部静脉炎的护理措施；
- （3）针对去甲氧柔红霉素可能出现的心脏毒性的护理要点。