

2024年10月高等教育自学考试全国统一考试

外科护理学（一）

（课程代码 03001）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 不符合手术室规则的做法是
A. 上呼吸道感染者应戴口罩入内
B. 同一房间接台，应先安排无菌手术
C. 参加手术者应提前做好无菌准备
D. 进入手术室必须更衣、换鞋、戴好帽和口罩
2. 代谢性酸中毒最突出的临床表现是
A. 疲乏、头昏、甚至昏迷
B. 面部潮红，心率快
C. 呼吸深而快，有酮味
D. 二氧化碳结合力下降，尿呈酸性
3. 下列表现符合早期休克的是
A. 面色苍白、烦躁不安
B. 血压降低
C. 代谢性酸中毒
D. 皮肤粘膜出现瘀斑
4. 全营养混合液（TNA）应在配制后多少小时内输完
A. 4h
B. 8h
C. 12h
D. 24h
5. 某烧伤患者，体重50kg，I度烧伤面积为20%，II度以上烧伤面积为60%，第一个8小时的理论补液总量为
A. 3250ml
B. 4250ml
C. 6500ml
D. 8500ml
6. 甲亢术后出现手足抽搐的原因是
A. 基础代谢率异常
B. 误切或挫伤甲状旁腺
C. 甲状腺切除过多
D. 术前甲亢症状未很好地控制
7. 乳腺癌多发生于
A. 乳房内上象限
B. 乳房内下象限
C. 乳房外上象限
D. 乳房外下象限
8. 单纯性疝与绞窄性疝最主要的不同点是
A. 疝块大小
B. 疝内容物能否还纳
C. 局部压痛程度
D. 疝内容物是否有循环障碍
9. 腹腔空腔脏器破裂的主要表现是
A. 腹部压痛、反跳痛、肌紧张
B. 腹穿有血性液体
C. 移动性浊音
D. 恶心、呕吐
10. 可诱发胃、十二指肠溃疡大出血的药物是
A. 青霉素
B. 阿司匹林
C. 倍他乐克
D. 化疗药
11. 单纯性机械性肠梗阻的特点是
A. 阵发性腹痛伴肠鸣音亢进
B. 持续性绞痛，频繁呕吐
C. 腹胀明显，停止排气排便
D. 持续性剧痛，腹胀不对称
12. 阑尾切除术后，嘱病人早期起床活动的目的主要是
A. 预防肺部并发症
B. 预防尿潴留
C. 预防肠粘连
D. 预防褥疮
13. 左半结肠癌的特点是容易出现
A. 全身中毒症状
B. 持续性腹痛
C. 腹部肿块
D. 慢性肠梗阻
14. 门静脉高压症分流术后体位摆放正确的是
A. 鼓励早期起床活动
B. 头低位卧床一周
C. 低半坐卧位48小时
D. 平卧3天即可起床活动
15. 刘某，女，45岁。饱餐后突发右上腹疼痛，阵发性加剧，疼痛向右肩部放射并有恶心、呕吐、发热。Murphy（+），初步诊断为
A. 急性胆囊炎
B. 急性胆管炎
C. 慢性胆囊炎
D. 胆囊结石
16. 急性胰腺炎治疗的主要方法是
A. 静脉快速补液
B. 抑制胰腺分泌
C. 抗生素的应用
D. 密切观察血压、脉搏

17. 李某, 男, 40岁, 下肢静脉曲张患者。做 Perthes 试验, 结果三分钟充盈之静脉仍不消失, 应考虑
- A. 深静脉阻塞 B. 深静脉通畅
C. 交通支瓣膜功能不全 D. 大隐静脉瓣膜功能不全
18. 治疗急性颅内高压的首选药物是
- A. 地塞米松 B. 30%尿素
C. 20%甘露醇 D. 25%山梨醇
19. 头部损伤后, 出现球结膜下出血, 脑脊液鼻漏应考虑
- A. 鼻骨骨折 B. 颅前窝骨折
C. 颅中窝骨折 D. 颅后窝骨折
20. 患者, 男, 34岁。不慎从2楼坠落, 即出现胸闷, 气急, 到医院就诊。发现患者呼吸极度困难, 烦躁不安, 发绀。血压 10/7kPa, 胸部和颈部有皮下气肿, 左侧胸部饱满, 叩诊鼓音。首先应采取的处理是
- A. 气管插管, 呼吸机辅助呼吸 B. 镇静药物
C. 胸腔穿刺排气 D. 剖胸探查
21. 普查食管癌简便而有效的方法是
- A. 纤维食管镜 B. 食管钡餐 X线
C. B超 D. 食管脱落细胞学拉网检查
22. 不会引起尿潴留的情况是
- A. 蛛网膜下腔麻醉术后 B. 前列腺增生症
C. 急性肾功能衰竭 D. 脊柱骨折合并截瘫
23. 患者, 男, 46岁。左腰部被撞1小时, 左腰痛入院。神志清, 面色苍白, 脉细速, 血压 66/46mmHg, 左脊肋角下方肿胀、压痛, 腹软, 无肌紧张, 无移动性浊音, 肠鸣音正常。经导尿引出黄色透明液约 200ml, 予快速输液 1000ml, 血浆 400ml, 全血 400ml, 病情无好转, 血压继续下降。最可能诊断为
- A. 脾破裂 B. 肾部分裂伤
C. 肾全层裂伤 D. 肾蒂断裂
24. 体外震波碎石 (ESWL) 术后要注意
- A. 尿量 B. 收集尿中碎石
C. 大量饮水 D. 以上都正确
25. 前列腺增生症最典型的症状为
- A. 间歇性无痛性血尿 B. 进行性排尿困难
C. 充盈性尿失禁 D. 尿频

26. 怀疑膀胱癌者, 最有价值的诊断方法是
- A. 尿细胞学检查 B. 尿常规
C. 膀胱造影 D. 膀胱镜检查
27. 石膏绷带固定病人的正确护理措施是
- A. 有伤口者应在石膏干燥后开窗
B. 手指、脚趾端应包裹在石膏内
C. 石膏未干前用手掌托扶, 不可留下手指压痕
D. 石膏内肢体局部疼痛时, 应填塞物品衬垫
28. 骨折术后的病人早期功能锻炼是指
- A. 下肢骨折者可进行引体抬臀动作
B. 扶拐下床伤肢不着地活动
C. 伤后 1~2 周进行伤肢肌肉舒缩活动
D. 逐步进行以重点关节为主的全面功能锻炼
29. 患儿, 男, 9岁。右小腿疼痛 8日, 伴寒战、高热 2日。8天前无明显诱因下出现右小腿疼痛, 当时未引起重视。近 2日来, 疼痛加剧, 出现寒战、高热。查体: T 39.5℃。右小腿上端肿胀、压痛明显, 余未见异常。目前首选的辅助检查是
- A. X线 B. B超
C. CT D. 骨膜下分层穿刺
30. 下列不属于恶性骨肿瘤的诊断特点的是
- A. 局部多无疼痛或疼痛较轻 B. 容易远处转移
C. 生长快 D. 晚期出现恶病质

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 空, 每空 1 分, 共 20 分。

31. 常见的导致急性乳腺炎的原因有: _____ 和 _____。
32. 胃溃疡常见的并发症包括: 急性穿孔、急性大出血、_____、_____。
33. 急性阑尾炎的典型症状是 _____, 最常见的重要体征是 _____。
34. 细菌性肝脓肿大多是由 _____、_____、厌氧菌引起的多发性脓肿。
35. 肺萎陷在 _____ 为中量气胸, _____ 为大量气胸。
36. 少数肺癌可伴有肺外症状, 又称副癌综合征, 如 _____、男性乳房发育、_____ 等。
37. 夏柯三联症即腹痛、_____、_____。
38. 泌尿系统肿瘤中以 _____ 最为常见, 该肿瘤的最常见致癌因素为 _____。

39. 骨折的专有体征是：_____、_____、骨擦音或骨擦感。
40. 颈椎病按临床表现可分为四型：_____、脊髓型颈椎病、_____、交感型颈椎病。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

41. 烧伤
42. 甲状腺功能亢进
43. 肠梗阻
44. 假性尿失禁
45. 脑疝

四、简答题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

46. 简述乳腺癌患者术后患侧上肢的护理。
47. 简述直肠、肛管良性疾病温水坐浴要点及作用。
48. 简述胆总管术后 T 管引流护理措施。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

49. 刘某，男，50 岁。因“进食后呕血”急诊入院。呕血量约为 380ml，色暗红。查体：神志清楚，情绪高度紧张。T 37℃、P 120 次/分、BP 90/60mmHg。余查体无特殊。既往史：肝硬化 5 年。立即行抢救治疗。
- (1) 该患者呕血的原因是什么？（1 分）
- (2) 该患者最主要的护理诊断是什么？（1 分）
- (3) 简述该患者的抢救措施。（5 分）
- (4) 该患者病情稳定后行手术治疗，有什么护理措施可预防术后出现肝性脑病？（3 分）
50. 李某，女，53 岁，食管癌根治术后第五天拔除胃管，次日开始进流质后出现明显胸痛、呛咳、气急、呼吸困难、高热，胸透发现手术侧胸腔积液。
- (1) 病人出现了什么问题？（1 分）
- (2) 导致该问题发生的原因有哪些？（4 分）
- (3) 主要护理要点有哪些？（5 分）