

妇产科护理学（二）

(课程代码 03010)

注意事项：

- 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
- 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
- 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

- 在施行附件切除或结扎子宫动脉时，最易损伤的邻近器官是
 - 尿道
 - 膀胱
 - 输尿管
 - 直肠
- 关于双合诊检查的描述，正确的是
 - 一手指置于直肠，另一手腹部配合查
 - 正常输卵管偶可扪及
 - 正常情况下偶可扪到卵巢
 - 未婚女性也可以做双合诊
- 妊娠期孕妇乳晕变黑，乳晕上的皮脂腺肥大形成散在的结节状小隆起，称之为
 - 乳晕淋巴结
 - 蒙氏结节
 - 乳晕色素沉着
 - 乳晕增生
- 观察产程进展的重要指标是
 - 胎头着冠
 - 自主屏气
 - 宫缩强度
 - 宫口扩张和胎头下降
- 胎盘附着部位子宫内膜完全修复的时间是
 - 产后 3 周
 - 产后 4 周
 - 产后 5 周
 - 产后 6 周
- 在电子胎心监护发生变异减速时，最简便有效的应对方法是
 - 立刻终止妊娠
 - 立即抑制宫缩
 - 给予吸氧
 - 嘱孕妇左侧卧位

- 输卵管妊娠最主要的原因是
 - 输卵管慢性炎症
 - 内分泌失调
 - 受精卵游走
 - 神经精神功能紊乱
 - 胎盘早剥与先兆子宫破裂的相似点是
 - 跨耻征阳性
 - 子宫压痛
 - 血尿
 - 出现病理性缩复环
 - 关于孕期口服补铁的说法正确的是
 - 可用茶水送服
 - 应在餐前服用
 - 服药期间黑色便是正常现象
 - 可与抗酸药同时服用
 - 不协调性子宫收缩乏力的恰当处理应是
 - 人工破膜
 - 肌注哌替啶
 - 静脉滴注缩宫素
 - 温肥皂水灌肠
 - 宫缩乏力性产后出血的临床表现，正确的是
 - 宫体软，轮廓不清
 - 血色暗红、无凝块，全身瘀斑
 - 胎儿娩出后即见血液不断流出
 - 胎盘剥离前出血不止，伴有第三产程延长
 - 外阴阴道假丝酵母菌病的主要传染途径是
 - 母婴垂直传播
 - 性交直接传染
 - 内源性传染
 - 衣物间接传染
 - 确诊葡萄胎后，首选处理措施是
 - 放射治疗
 - 化学药物治疗
 - 免疫治疗
 - 清宫术
 - 目前早期诊断子宫内膜癌最常用且最有价值的诊断方法是
 - 阴道镜
 - 宫腔镜
 - 分段诊断性刮宫
 - B 型超声检查
 - 导致男性不育的最主要原因是
 - 精液异常
 - 工作压力
 - 精子免疫
 - 经济负担
- 二、多项选择题：**本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
- 有关早孕临床表现正确的有
 - 停经
 - 早孕反应约 6 周出现，12 周消失
 - 子宫增大变硬
 - 黑加征（+）
 - 阴道分泌物增多

17. 下列属于纵产式胎位的有
 A. 枕左前 B. 枕左横
 C. 骶右后 D. 骶左横
 E. 肩右后
18. 下列属于晚期妊娠出血性疾病的有
 A. 流产 B. 异位妊娠
 C. 前置胎盘 D. 胎盘早剥
 E. 早产
19. 下列关于子宫肌瘤的说法正确的有
 A. 子宫体部肌瘤多于宫颈部肌瘤 B. 以肌壁间肌瘤最多见
 C. 各类肌瘤均引起月经过多 D. 绝经后肌瘤有萎缩倾向
 E. 症状的轻重与肌瘤大小有关
20. 下列有关葡萄胎的说法，正确的有
 A. 有停经史 B. 子宫小于孕周
 C. hCG 水平高 D. 病因与染色体异常有关
 E. 葡萄胎排空后卵巢黄素囊肿自行消失
- 三、判断题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。判断下列各题正误，正确的在答题卡相应位置涂“A”，错误的涂“B”。
21. 女性功能逐渐成熟，以月经来潮为标记。
 22. 异位妊娠最常见的着床部位是子宫颈。
 23. 妊娠期糖尿病产妇所生的新生儿易发生低血糖。
 24. 子宫收缩乏力可能会导致胎盘滞留。
 25. 胎膜早破者不用监测胎心情况。
 26. 滴虫性阴道炎阴道分泌物的性状为脓性豆渣样。
 27. 绝经后子宫内膜癌的早期临床表现是阴道出血。
 28. 侵蚀性葡萄胎最严重的转移部位是肺。
 29. 有排卵性功血基础体温呈双相性。
 30. 宫内节育器的避孕原理是影响精子与卵子的相结合。
31. 下列属于稽留流产的有
 A. 激素补充治疗
 B. 相对不孕
32. 下列属于相对不孕的有
 A. 稽留流产
 B. 相对不孕
- 五、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。
 33. 简述胎盘剥离的征象。
 34. 简述羊水胎粪污染的程度分类。
 35. 简述妊娠滋养细胞肿瘤患者阴道转移病人的护理要点。
 36. 简述妇科腹部手术的手术适应证。
- 六、论述题：本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。
 40. 某 30 岁初产妇，足月临产，急产，胎儿娩出后，立即有活动性阴道出血，色鲜红，约 200ml，胎盘自娩，检查胎盘胎膜完整，但阴道出血仍多，伴血块约 300ml。检查：BP：95/68mmHg，P：100 次/分，宫底脐上一指，子宫收缩良好，会阴 II 度撕裂，行会阴修补术过程中产妇疼痛明显，烦躁不安。
 问：（1）该产妇产后出血可能的原因是什么？
 （2）请列出针对该产妇的护理措施。
41. 某女士，55 岁，宫颈浸润性鳞状细胞癌 IB1 期。在全麻下行腹腔镜下广泛全子宫切除+双附件切除+盆腔淋巴结清扫术，术中置左右腹腔负压引流管各 1 根，留置尿管。今为术后第一天，患者诉腹部伤口疼痛，腹胀，肛门尚未排气。查体：T：37.9℃，P：78 次/min，R：19 次/min，BP：124/80mmHg。腹软，无压痛，切口敷料干燥，腹腔引流通畅，色淡红。尿管引流通畅，尿色清。
 问：（1）该患者现阶段可能的护理诊断/问题有哪些？
 （2）针对护理诊断列出相关护理措施。
42. 某女士，28 岁，G₁P₀，妊娠 37 周入院待产，曾有先天性房间隔缺损介入治疗病史。自诉一般体力活动轻度受限，活动后心悸、轻度气短，休息时无症状。查体：T36.6℃，HR：96 次/min，BP：110/80mmHg，R：20 次/min。现宫缩 2~3min 一次，持续时间 30~40s，强度中等，宫颈口开大 8cm，胎头在坐骨棘水平下 2cm，胎心 128 次/min。
 问：（1）该产妇目前的心功能分级。
 （2）针对该产妇的护理措施。

第二部分 非选择题

四、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

31. 胎产式
 32. 子宫复旧