



16. 碘化物治疗甲状腺危象的主要机制是
- A. 使有机碘形成减少      B. 使增生的甲状腺缩小  
C. 抑制甲状腺激素的释放      D. 促进甲状腺激素的合成
17. 尿毒症期的临床表现应除外
- A. 厌食、恶心      B. 皮肤瘙痒  
C. 内生肌酐清除率在 50ml/min      D. 记忆力减退
18. 甲亢所致甲状腺肿大最有鉴别意义的是
- A. 弥漫性对称性肿大      B. 质地柔软  
C. 有震颤和杂音      D. 随吞咽上下移动
19. 糖尿病多尿的原因是
- A. 肾小管浓缩减少      B. 醛固酮增加  
C. 饮水多      D. 尿糖使尿胶体渗透压增大
20. 肾小球肾病的饮食治疗应给予
- A. 低钠、低蛋白、高糖、高维生素饮食  
B. 高蛋白、高脂肪、低糖、高维生素饮食  
C. 高钠、低蛋白、高糖、高维生素饮食  
D. 低钠、高蛋白、低糖、低维生素饮食
21. 患者，女，65岁。情绪激动时出现剧烈头痛、呕吐，继之昏迷，体温 36.5℃，血压 220/120mmHg，既往有高血压病史近 10 年。查体：右侧上、下肢软瘫，考虑为脑出血，本病急性期主要威胁患者生命的是
- A. 脑水肿并发脑疝      B. 肺部感染  
C. 电解质紊乱      D. 下肢深静脉血栓形成
22. 诊断癫痫的主要依据是
- A. 头颅 x 线片      B. 脑 CT  
C. 体格检查      D. 病史和脑电图
23. 左心衰竭最早出现的呼吸困难是
- A. 阵发性夜间呼吸困难      B. 劳力性呼吸困难  
C. 端坐呼吸      D. 心源性哮喘
24. 急性下壁心肌梗死的特征性心电图改变出现于
- A. V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>、V<sub>3</sub> 导联      B. V<sub>3</sub>、V<sub>4</sub>、V<sub>5</sub> 导联  
C. II、III、aVF 导联      D. I、II、aVL 导联
25. 成人缺铁性贫血最常见的病因是
- A. 尿毒症      B. 慢性失血  
C. 肝炎      D. 妊娠

26. 男性，20岁，贫血 4 月，牙龈有时出血，易感冒。查体：皮肤有少量出血点，巩膜无黄染，胸骨无压痛，肝脏肋下未触及。血红蛋白 80g/L，白细胞 3.0×10<sup>9</sup>/L，血小板 50×10<sup>9</sup>/L，血涂片未见幼稚细胞，血 Ham's 试验(-)，尿 Rous 试验(-)，骨髓增生减低，粒、红、巨核三系细胞减少。首先采取的治疗为
- A. 补充叶酸、维生素 B<sub>12</sub>      B. 雄激素治疗  
C. 积极输血      D. 脾切除
27. 患者，男，30岁。发热、口腔溃疡 1 周，皮肤有瘀点、瘀斑，鼻出血，脾脏肋下可触及边缘。血红蛋白 90g/L，白细胞计数 24.6×10<sup>9</sup>/L，血小板 26.3×10<sup>9</sup>/L，骨髓幼稚细胞明显增多，过氧化物酶染色阴性，其诊断为
- A. 急性淋巴细胞性白血病      B. 急性粒细胞性白血病  
C. 慢性粒细胞性白血病      D. 血小板减少性紫癜
28. 系统性红斑狼疮活动期皮肤表现为
- A. 蝶形红斑      B. 斑丘疹  
C. 口腔黏膜溃疡      D. 甲周红斑
29. 类风湿性关节炎的关节症状相比于风湿性关节炎，其具有特征性的是
- A. 全身不适，手足发冷      B. 晨僵  
C. 关节畸形      D. 局部发热
30. 脑栓塞常见的栓子来源是
- A. 肺动脉血栓      B. 颈动脉粥样硬化斑块  
C. 脂肪栓塞      D. 心脏栓子

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

31. 支气管扩张病人的典型临床特征有
- A. 慢性咳嗽      B. 大量脓痰  
C. 反复咯血      D. 水肿  
E. 哮鸣音
32. WHO/ISH 建议的一线降压药包括
- A. 利尿药      B. α<sub>1</sub>受体阻滞剂  
C. 钙通道阻滞药      D. 血管紧张素转换酶抑制剂  
E. 血管紧张素 II 受体拮抗药
33. 对于洋地黄类药物中毒患者应采取的处理措施包括
- A. 停用洋地黄类药物      B. 停用排钾利尿药  
C. 纠正心律失常      D. 使用血管扩张药  
E. 静脉补充钾盐

34. 门静脉高压的临床表现有
- A. 脾肿大
  - B. 腹水
  - C. 出血倾向或贫血
  - D. 蜘蛛痣
  - E. 侧支循环建立
35. 血液透析常见的并发症有
- A. 低血压
  - B. 失衡综合征
  - C. 热源反应
  - D. 出血
  - E. 心律失常

## 第二部分 非选择题

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

- 36. 冠心病
- 37. ITP
- 38. 周期性瘫痪
- 39. 强直性脊柱炎
- 40. 心源性呼吸困难

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

- 41. 简述肝功能减退的临床表现。
- 42. 简述白血病患者化疗后的不良反应。
- 43. 简述二尖瓣狭窄病人的常见症状和体征。
- 44. 简述甲状腺危象的临床表现。
- 45. 支气管扩张病人体位引流时的注意事项。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 李某，男，汉族，65 岁，农民。吸烟史 30 年，慢性咳嗽、咳痰 20 余年，每年持续 3 个月以上，近 2 年出现呼吸困难。1 周前受凉后上述症状加重，痰多粘稠，不易咳出，食欲减退来院就诊。查体：T: 37.3℃, P: 85 次/分, R: 28 次/分, BP: 100/75mmHg. 视诊发绀明显，胸廓呈桶状，触诊语颤减弱，叩诊过清音。初步考虑为慢性阻塞性肺疾病。
- (1) 请提出患者目前存在的护理问题并制定相关护理措施。
  - (2) 如果患者需要长期家庭氧疗，患者及家属应了解哪些相关注意事项。
  - (3) 指导患者如何进行呼吸功能锻炼。

47. 患者，男性，45 岁。3 年前起中上腹部隐痛，呈间歇性，通常于饭前或饭后 4~5 小时发生，偶尔睡眠时发生疼痛，进食后疼痛可好转，有时嗝气、反酸，未予治疗。此后每年冬天出现上述症状，尤其是饮食不当、劳累或心情不佳时易发生。当地医务室诊为“胃炎”服药后缓解。4 天前上腹部疼痛加剧，服用阿托品无效，进食后不缓解，昨日解柏油样便 2 次、每次约 200 克，故来院诊治。身体评估：T36.9℃，P96 次/min，R22 次/min，BP14.6/9.3kPa，神志清楚，查体合作，面色稍黄，口唇无苍白及紫绀，两肺无异常；心率齐，无病理性杂音。腹软，中上腹有轻度压痛，肝脾未及，移动性浊音(-)。实验室检查：WBC5.0×10<sup>9</sup>/L，Hb100g/L，尿常规(-)，大便隐血(+++)。

- (1) 患者可能的医疗诊断?
- (2) 为明确诊断，患者可做何检查?
- (3) 患者经治疗后好转出院，作为责任护士，请为患者做健康宣教。