

## 外科护理学（一）

(课程代码 03001)

## 注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

## 第一部分 选择题

**一、单项选择题：**本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 手术前常规护理不正确的是
 

|             |              |
|-------------|--------------|
| A. 术前晚洗胃灌肠  | B. 术日晨测体温    |
| C. 术前 1 周戒烟 | D. 术前控制呼吸道感染 |
2. 中心静脉压正常值为
 

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| A. 5~10cmH <sub>2</sub> O | B. 4~16cmH <sub>2</sub> O  |
| C. 4~6cmH <sub>2</sub> O  | D. 10~12cmH <sub>2</sub> O |
3. 下列哪项不是低血钾的原因
 

|            |                |
|------------|----------------|
| A. 摄入量不足   | B. 大量注射葡萄糖+胰岛素 |
| C. 长期使用利尿药 | D. 酸中毒         |
4. 手术人员穿无菌手术衣和戴无菌手套后，其无菌区应是
 

|            |                |
|------------|----------------|
| A. 双肩及胸部   | B. 腰以上胸背及手     |
| C. 双手及胸、腹部 | D. 双手及臂、腰以上前胸部 |
5. Codman 三角常见于
 

|         |          |
|---------|----------|
| A. 骨肉瘤  | B. 内生软骨瘤 |
| C. 骨软骨瘤 | D. 骨巨细胞瘤 |
6. 行肠内营养的患者较严重的并发症为
 

|          |           |
|----------|-----------|
| A. 高血糖   | B. 营养管周围瘘 |
| C. 吸入性肺炎 | D. 粘膜损伤   |

7. 一成年男性右手及右足烧伤，其烧伤面积为
 

|       |         |
|-------|---------|
| A. 3% | B. 4.5% |
| C. 6% | D. 7%   |
8. 甲状腺术后出现声音嘶哑的原因是
 

|           |             |
|-----------|-------------|
| A. 喉痉挛    | B. 一侧喉返神经损伤 |
| C. 喉上神经损伤 | D. 甲状腺危象    |
9. 乳癌最早出现的症状是
 

|          |            |
|----------|------------|
| A. 无痛性肿块 | B. 乳头凹陷    |
| C. 橘皮样改变 | D. 两侧乳头不对称 |
10. 老年男性常见的腹外疝是
 

|          |          |
|----------|----------|
| A. 腹股沟斜疝 | B. 腹股沟直疝 |
| C. 股疝    | D. 脐疝    |
11. 胃、十二指肠溃疡的发病因素不包括
 

|            |             |
|------------|-------------|
| A. 幽门螺杆菌感染 | B. 胃酸分泌过多   |
| C. 高糖饮食    | D. 使用非甾体类药物 |
12. 呕吐出现早而频繁的肠梗阻是
 

|           |           |
|-----------|-----------|
| A. 低位小肠梗阻 | B. 乙状结肠扭转 |
| C. 肠套叠    | D. 高位小肠梗阻 |
13. 李某，男，17岁。“转移性右下腹痛 6 小时”。体检：腹平坦，右下腹有明显固定压痛点及反跳痛。白细胞增高，体温 38.5℃，首先应考虑的疾病是
 

|          |             |
|----------|-------------|
| A. 急性阑尾炎 | B. 急性肠系膜淋巴炎 |
| C. 肠梗阻   | D. 胆囊炎      |
14. 可行挂线疗法的疾病是
 

|       |         |
|-------|---------|
| A. 肛裂 | B. 肛周脓肿 |
| C. 肛瘘 | D. 内痔   |
15. 门静脉断流术的主要目的是
 

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| A. 降低门静脉系压力 | B. 控制食管胃底静脉曲张及破裂出血 |
| C. 消除脾功能亢进  | D. 减少腹水的形成         |
16. 胆道蛔虫病的典型症状是
 

|                    |            |
|--------------------|------------|
| A. 右上腹阵发性绞痛        | B. 上腹闷胀、隐痛 |
| C. 剑突右下方阵发性“钻顶样”绞痛 | D. 恶心、呕吐   |
17. 为预防急性胰腺炎的发生应注意的是
 

|           |             |
|-----------|-------------|
| A. 吸烟     | B. 低脂饮食     |
| C. 避免暴饮暴食 | D. 避免餐后剧烈运动 |

18. Trendelenburg 试验的目的是检验  
 A. 下肢静脉有无曲张      B. 大隐静脉瓣膜功能是否正常  
 C. 交通支静脉有无阻塞      D. 下肢深静脉瓣膜是否正常
19. 小脑幕裂孔疝病人急救的首要措施是  
 A. 吸氧      B. 肌注洛贝林  
 C. 肾上腺皮质激素      D. 甘露醇脱水
20. 颅脑外伤病人，伤后出现昏迷—清醒—昏迷，提示  
 A. 脑震荡      B. 脑内血肿  
 C. 硬膜下血肿      D. 硬膜外血肿
21. 反常呼吸出现在  
 A. 多根多处肋骨骨折      B. 闭合性气胸  
 C. 开放性气胸      D. 张力性气胸
22. 肺癌的致病因素是  
 A. 大量吸烟      B. 空气污染  
 C. 肺部慢性感染      D. 以上都是
23. 患者，男，50岁，食管癌手术后第3天。患者拔除胃管后口服流质，第5天体温升高达39度，呼吸困难、胸痛、脉速。胸透发现手术侧胸腔积液。应首先考虑并发  
 A. 肺炎      B. 胸膜炎  
 C. 食管吻合口瘘      D. 癌肿播散
24. 下列哪种症状不是泌尿系统病变引起的  
 A. 全程血尿      B. 初始血尿  
 C. 终末血尿      D. 血红蛋白尿
25. 李某，男，30岁。跌倒时会阴部撞及硬物，之后出现排尿困难，并出现阴茎、阴囊、会阴、下腹肿胀。此时最可能的情况是  
 A. 腹膜外型膀胱破裂      B. 尿道球部损伤  
 C. 腹膜内型膀胱破裂      D. 尿道膜部损伤
26. 结石引起肾绞痛时，首先应采用  
 A. 抗生素      B. 内服排石药物  
 C. 解痉止痛      D. 急诊手术切开取石
27. 前列腺增生症最早出现的症状是  
 A. 尿潴留      B. 排尿困难  
 C. 血尿      D. 尿频
28. 肾癌病人常见的护理诊断问题不包括  
 A. 营养失调      B. 恐惧  
 C. 自我形象紊乱      D. 潜在并发症：出血、感染
29. 下列属于骨折的早期并发症的是  
 A. 胫腓骨骨折致小腿骨筋膜室综合征      B. 肘关节脱位合并骨折致损伤性骨化  
 C. 肱骨髁上骨折致前臂缺血性挛缩      D. 胫骨下1/3段双处骨折后骨不愈合
30. 急性血源性骨髓炎的好发部位是  
 A. 骨皮质      B. 骨髓腔  
 C. 骨密质      D. 干骺端

## 第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共10小题，每小题2空，每空1分，共20分。

31. 高渗性脱水的血清钠高于\_\_\_\_\_，低渗性脱水的血清钠低于\_\_\_\_\_。
32. 休克的微循环变化一般分为三个时期，\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、微循环衰竭期。
33. 直疝从直疝三角区突出，构成直疝三角内侧边：腹直肌外侧缘、外侧边：\_\_\_\_\_、底边：\_\_\_\_\_。
34. 肠梗阻共同四大症状：腹痛、呕吐、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_。
35. 轻度甲亢的基础代谢率为\_\_\_\_\_，中度甲亢的基础代谢率为\_\_\_\_\_。
36. 肛裂、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_称为肛裂“三联症”。
37. 门静脉高压的手术中，\_\_\_\_\_降低门静脉的压力较大，但此手术易造成\_\_\_\_\_。
38. 夏柯三联症即腹痛、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
39. 下肢静脉曲张常见的并发症有：湿疹、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、急性出血、溃疡癌变。
40. 气胸可分为闭合性气胸、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三大类。

三、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。

41. 肠外营养  
 42. 酒窝征  
 43. 继发性肝癌  
 44. 颅内压增高三主征  
 45. 骨折

四、简答题：本大题共3小题，每小题5分，共15分。

46. 简述烧伤深度的估计。  
 47. 简述甲亢术后常见的并发症。  
 48. 简述阑尾炎术后血压平稳后予患者半卧位的优点。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

49. 张某，男，55 岁。因“反复上腹部疼痛 8 年，消瘦 2 月余”入院。上腹部疼痛，没有规律性，伴有恶心、嗳气。查体：生命征平稳。神清，痛苦面容，消瘦。左锁骨上淋巴结肿大。钡餐检查：胃壁僵硬，可见龛影。既往史：有胃溃疡史 8 年。

- (1) 患者的诊断是什么？(1 分)
- (2) 下一步该如何治疗？(1 分)
- (3) 概括该患者最主要的护理诊断问题。(1 分)
- (4) 简述术后护理措施。(7 分)

50. 陈某，男，55 岁。因“肉眼血尿 3 月余”入院。血尿为间歇性、全程、无痛、肉眼血尿。无发热，无腹痛。IVP+KUB：肾脏、输尿管未见异常。膀胱右侧壁见直径约 1.5cm 的充盈缺损。

- (1) 患者的诊断是什么？(1 分)
- (2) 为明确诊断，应考虑做何种检查最有意义？(1 分)
- (3) 简述膀胱灌注的目的及方法。(8 分)