

妇产科护理学（一）

(课程代码 03002)

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 对固定宫颈位置起重要作用的韧带是

A. 圆韧带	B. 主韧带
C. 阔韧带	D. 宫骶韧带
2. 妊娠期血容量达到高峰的时期是

A. 8~12 周	B. 12~16 周
C. 16~24 周	D. 32~34 周
3. 下列胎位正常的是

A. 枕右前	B. 枕横位
C. 骶左前	D. 骶右前
4. 分娩即将开始的可靠征兆是

A. 尿频	B. 见红
C. 腹痛	D. 规律宫缩
5. 分娩后产妇应在产房内观察

A. 1 小时	B. 2 小时
C. 3 小时	D. 4 小时
6. 产后乳房皲裂的原因是

A. 未及时喂养	B. 使用吸奶器
C. 婴儿含接不良	D. 未及时挤奶

7. 子宫小于停经周数，宫颈口有组织物堵塞，属于

A. 完全流产	B. 先兆流产
C. 稽留流产	D. 不完全流产
8. 异位妊娠最常见的是

A. 输卵管妊娠	B. 卵巢妊娠
C. 腹腔妊娠	D. 子宫残角妊娠
9. 妊娠期高血压疾病最严重的阶段是

A. 妊娠高血压	B. 轻度子痫前期
C. 重度子痫前期	D. 子痫
10. 下列不属于高危妊娠的是

A. 孕妇年龄 32 岁	B. 妊娠合并糖尿病
C. 前置胎盘	D. 妊娠合并肿瘤
11. 妊娠合并糖尿病孕妇宜用的降糖药物是

A. 二甲双胍	B. 罗格列酮
C. 阿卡波糖	D. 胰岛素
12. 急产娩出的新生儿给予维生素 K₁ 的目的是

A. 预防感染	B. 促进胎肺成熟
C. 预防颅内出血	D. 加强免疫力
13. 产褥期产褥感染的诱因不包括

A. 母乳喂养	B. 滞产
C. 贫血	D. 胎盘胎膜残留
14. 外阴阴道假丝酵母菌病的典型症状是

A. 稀薄泡沫状白带	B. 黄色白带
C. 白色豆腐渣样白带	D. 白带正常但量增多
15. 慢性宫颈炎最常用的有效治疗方法是

A. 物理治疗	B. 宫颈锥切术
C. 子宫切除	D. 药物治疗
16. 治疗淋病的首选药物是

A. 头孢曲松钠	B. 庆大霉素
C. 罗红霉素	D. 阿莫西林
17. 下列哪项胎心率提示胎儿窘迫

A. 120 次/分	B. 140 次/分
C. 160 次/分	D. 180 次/分
18. 羊水浅绿色提示

A. 羊水 I 度污染	B. 羊水 II 度污染
C. 羊水 III 度污染	D. 属于正常情况

19. 发现宫颈癌早期病变的主要方法是
 A. 宫颈刮片细胞学检查 B. 碘试验
 C. 阴道镜检查 D. 宫颈和宫颈管活体组织检查
20. 一般不易造成月经量增多，经期延长，是哪种肌瘤的主要表现
 A. 浆膜下肌瘤 B. 肌壁间肌瘤
 C. 粘膜下肌瘤 D. 多发性子宫肌瘤
21. 恶性卵巢肿瘤术前肠道准备不包括
 A. 术前3天口服肠道杀菌剂 B. 术前2天口服缓泻剂
 C. 术前1天清洁灌肠 D. 术前2天禁食
22. 下列可确诊葡萄胎的临床表现是
 A. 妊娠剧吐 B. 停经及阴道流血
 C. 阴道排出水泡样组织 D. 子宫异常增大
23. 绒癌致死的主要原因是继发
 A. 阴道转移 B. 脑转移
 C. 肝转移 D. 肺转移
24. 月经周期正常，但经期延长，常见于
 A. 无排卵性功血 B. 黄体功能不足
 C. 子宫内膜不规则脱落 D. 正常月经
25. 失败率较高的避孕方式是
 A. 宫内节育器 B. 口服避孕药
 C. 安全期避孕 D. 阴茎套
35. 夫妇一方因先天或者后天解剖生理缺陷无法纠正导致的不孕，称为_____。
 36. 手术切口分三类：全子宫切除术切口为_____切口。
 37. 化疗引起的造血功能障碍主要表现为_____减少。
 38. 避孕原理是阻止精子与卵子结合、_____、改变宫腔内环境。
 39. 自月经第一天起到下次月经第一天的间隔称为_____。
 40. 有排卵性功血基础体温呈_____。
- 三、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。**
41. 胎方位
 42. 异位妊娠
 43. 产褥病率
 44. 围绝经期
 45. 安全期避孕
- 四、简答题：本大题共5小题，每小题5分，共25分。**
46. 简述孕期指导孕妇自我监测胎动的方法。
 47. 简述胎盘剥离的征象。
 48. 简述卵巢肿瘤发生蒂扭转及破裂的护理。
 49. 简述胎盘因素引起的产后出血的治疗原则。
 50. 简述恶性滋养细胞肿瘤脑转移抽搐的护理要点。
- 五、论述题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。**
51. 某孕妇，28岁，孕3产0，妊娠35周。因1小时前无明显诱因出现阴道流血，量较多来院就诊。检查：BP：105/60mmHg，P：96次/分，腹软，无压痛。子宫底高度35cm，胎头先露，胎头浮，胎心率146次/分。B超提示：胎盘位于子宫右后壁大部分覆盖宫颈内口。
 根据以上资料，请回答：
 (1) 该孕妇可能的临床诊断。
 (2) 针对该类孕妇的护理措施。
52. 论述妇科肿瘤病人化疗常见的不良反应。

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。

26. 骨盆由骶骨、尾骨及_____组成。
 27. 妊娠期子宫内膜包括底蜕膜、_____、真蜕膜。
 28. 第二产程是指从_____到胎儿娩出。
 29. 产后第_____天，宫底平脐。
 30. 重型胎盘早剥，胎盘剥离的面积一般超过_____。
 31. 宫缩乏力分原发性宫缩乏力和_____。
 32. 胎心率异常是_____最明显的临床征象。
 33. 外阴阴道假丝酵母菌阴道炎局部用_____溶液冲洗阴道，可以提高疗效。
 34. 闭经可分为下丘脑性闭经、垂体性闭经、_____和子宫性闭经。