

2025 年 4 月高等教育自学考试

内科护理学(本)试题

课程代码:13204

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 产生基本呼吸节律的中枢是

A. 延髓

B. 脑桥

C. 中脑

D. 大脑皮层

2. 支气管哮喘的典型体征是

A. 吸气相延长伴广泛哮鸣音

B. 呼气相延长伴广泛哮鸣音

C. 吸气相缩短伴散在哮鸣音

D. 呼气相缩短伴散在哮鸣音

3. 居社区获得性肺炎首位的肺炎是

A. 支原体肺炎

B. 军团菌肺炎

C. 肺炎链球菌肺炎

D. 克雷白杆菌肺炎

4. 患者,男性,62 岁,1 年前无诱因出现夜间阵发性呼吸困难,活动及平卧时明显,近 1 周无诱因呼吸困难较前加重,自觉说话时即有憋气等不适,外院诊断为“心力衰竭”,此时患者 NYHA 心功能分级为

A. I 级

B. II 级

C. III 级

D. IV 级

5. 患者，女性，73岁，8年前饱餐或快走时出现心前区闷痛，持续2~3分钟可自行缓解。近5天自觉症状较前加重，持续10余分钟方缓解，为进一步诊治入院。医嘱予硝酸甘油口服及静脉给药治疗，下列用药护理措施中，错误的是
- A. 首次用药应避免站立体位 B. 口服用药应指导患者嚼碎后吞服
- C. 静脉用药注意控制滴速 D. 药物应注意避光保存
6. 溃疡性结肠炎患者必有的症状是
- A. 腹泻 B. 腹痛
- C. 腹胀 D. 纳差
7. 患者，男性，40岁，8天前大量饮酒后出现上腹痛，持续不缓解来就诊。既往胆囊结石多年。查体上腹压痛、反跳痛，余(-)。腹部CT显示：胆囊多发结石，胰腺肿大、边界模糊。初步考虑“急性胰腺炎”。根据目前患者的病情，下列实验室检查中最具诊断意义的是
- A. 血清淀粉酶 B. 尿淀粉酶
- C. 血清脂肪酶 D. 尿脂肪酶
8. 患者，男性，66岁，因“慢性肾功能衰竭”规律行血液透析治疗。在某次血液透析过程中，患者主诉“恶心、胸闷”。护士查体发现患者面色苍白、出汗，BP 92/58mmHg，P 102次/分，管路连接良好。则该患者最可能发生的并发症是
- A. 失衡综合征 B. 致热源反应
- C. 出血 D. 低血压
9. 患者，女性，26岁，单位体检中发现贫血，血红蛋白浓度为95g/L，其最早出现且常易被忽视的症状是
- A. 疲乏无力 B. 头晕、头痛
- C. 注意力不集中 D. 嗜睡
10. 甲状腺功能基本筛选试验是
- A. 血清游离T₃、T₄测定 B. 血清总T₃、总T₄测定
- C. 甲状腺¹³¹I摄取率测定 D. T₃抑制试验
11. 患者，女性，72岁，确诊2型糖尿病6年，口服降糖药治疗。近期因血糖控制不达标，开始注射胰岛素。护士指导其注射部位应避开
- A. 上臂外侧 B. 股外侧
- C. 腹部 D. 脐周
12. 目前用于盘状狼疮治疗的主要药物是
- A. 糖皮质激素 B. 环磷酰胺
- C. 抗疟药 D. 雷公藤总苷

13. 患者，男性，61岁，半小时前晨起，其子发现患者叫不醒，未见呕吐，房间有一煤火炉，急诊以“急性一氧化碳中毒”收入院。为缩短病程，降低病死率，减少或防止迟发性脑病发生，可采取的治疗措施是
- A. 高压氧
B. 吸氧
C. 人工呼吸
D. 血液净化
14. 根据脱水程度、血压、脉搏及尿量判断，临床分型为中型的霍乱患者水分丧失量相当于体重的
- A. 2%~4%
B. 5%~10%
C. 10%~15%
D. >15%
15. 帕金森患者进行步态锻炼时，存在错误的环节是
- A. 尽量保持上身挺直
B. 昂头、双眼直视前方
C. 迈步时抬高脚
D. 先足尖着地再足跟着地

二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 关于胸部叩击注意事项的叙述，正确的有
- A. 叩击前确认无咯血等禁忌证
B. 叩击前需进行肺部听诊
C. 叩击在肺野进行
D. 叩击不可间隔任何衣物以免影响效果
E. 叩击力量越大效果越好
17. 患者，男性，30岁，因“支气管哮喘”就诊，医嘱予沙丁胺醇必要时吸入治疗。护士对沙丁胺醇使用方法的指导中，正确的有
- A. 吸药前保持装置静止避免晃动
B. 吸药前缓慢呼气至不能再呼
C. 在吸气后按压驱动装置
D. 吸入药物时经口吸气
E. 吸入药物后屏气 10 秒后再缓慢吐气
18. 关于常用抗结核化疗药物及其不良反应的叙述，正确的有
- A. 异烟肼是最安全、毒副作用最少的抗结核药
B. 利福平会引起肝功能损害
C. 吡嗪酰胺可使体液呈橘黄色
D. 链霉素会导致听力障碍和前庭功能失调
E. 乙胺丁醇会引起皮肤的光过敏
19. 可减轻慢性心力衰竭患者心脏负荷的治疗措施有
- A. 体力和精神休息
B. 采用低钠饮食
C. 应用洋地黄类药物
D. 应用利尿剂
E. 应用血管扩张剂

20. 患者，男性，78岁，主因持续胸痛2小时伴大汗急诊入院。入院后给予心电监护，示波一旦出现，即提示属于危险性心律失常的有
- A. 偶发室性早搏 B. 阵发性房颤
C. 多源室性早搏 D. R-on-T现象
E. 一度房室传导阻滞
21. 护士对消化性溃疡患者的饮食指导及相应原理解释中，正确的有
- A. 定时进餐以维持消化活动节律 B. 少量多餐可中和胃酸
C. 每餐不宜过饱以免刺激胃酸分泌 D. 牛奶可中和胃酸宜多饮用
E. 脂肪延缓胃排空应适量摄入
22. 患者，男性，20岁，因“肾病综合征”入院。经治疗病情好转出院，院外继续予“泼尼松”口服治疗。护士对患者服用“泼尼松”治疗的用药指导中，正确的有
- A. 小剂量开始 B. 缓慢减量
C. 维持用药要久 D. 顿服法
E. 宜在睡前服药
23. 人体的铁主要来源于食物，铁吸收的主要部位在
- A. 胃 B. 十二指肠
C. 空肠上段 D. 空肠下段
E. 结肠
24. 系统性红斑狼疮患者由于用激素剂量很大，可引起不良反应包括
- A. 严重感染 B. 严重肝损害
C. 高血糖 D. 高血压
E. 骨髓抑制
25. 传染病病原体侵入人体后能否引起疾病与致病力有关，其致病力包括病原体的
- A. 传染性 B. 变异性
C. 侵袭力 D. 毒力
E. 数量

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题：本大题共 20 空，每空 1 分，共 20 分。

26. 慢性阻塞性肺疾病患者进行长期家庭氧疗 (LTOT) 的主要指征是 $\text{PaO}_2 < \underline{\hspace{2cm}}$ mmHg。
27. 医院获得性肺炎是指患者入院时不存在、也不处于 期, 而于入院 48 小时后在院内发生的肺炎。

28. 肺心病可发生各种类型酸碱失衡及电解质紊乱, 以_____酸中毒最为常见。
29. 慢性肺源性心脏病患者缓解期治疗的重点是积极治疗原发病和预防_____感染。
30. 肺栓塞溶栓的时间窗一般为_____天以内。
31. 急性呼吸窘迫综合征的重要体征是_____, 且不能被通常吸氧所改善。
32. 循环系统由心脏、血管和调节血液循环的神经、_____组成。
33. 在我国, 过去引起慢性心力衰竭的病因主要是瓣膜病, 尤以_____居首。
34. 已知作用最强的胃酸分泌抑制剂是_____抑制剂。
35. 肝性脑病患者在前驱期可出现_____样震颤, 也称肝震颤。
36. 肾盂肾炎最常见的感染途径是_____感染。
37. 几乎所有 IgA 肾病患者都表现为_____。
38. 急性肾衰竭少尿型患者肾功能开始恢复的标志是进行性_____增多。
39. 在我国成人血红蛋白测定女性低于_____g/L 可诊断为贫血。
40. 雄激素对慢性再障疗效较好, 作用机理可能是刺激肾脏产生_____。
41. 目前认为 Graves 病是个体在具有_____基础上, 在精神刺激、应激等始动因素作用下, 机体发生免疫功能异常, 产生自身免疫反应。
42. 类风湿关节炎病理为关节的滑膜炎, 当累及软骨和骨质时出现_____。
43. 皮肤狼疮带试验阳性代表_____正处于活动期。
44. 为促进急性中毒患者的已吸收毒物随尿排出, 可采取的最简单的措施是_____。
45. 慢性肝炎是指急性肝炎病程超过_____未愈者、或发病日期不明、或虽无肝炎病史但影像学或肝活检病理学检查符合慢性肝炎表现者。

四、名词解释题: 本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

46. 支气管哮喘
47. 病毒性心肌炎
48. 急性胰腺炎
49. 妊娠期糖尿病
50. 中暑

五、简答题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

51. 简述肺结核咯血窒息患者的紧急处理措施。
52. 简述慢性肾炎合并高血压的患者长期服用 ACEI 类药物控制血压的注意事项。
53. 简述急性白血病化疗中诱导缓解治疗的目的及完全缓解的标准。
54. 简述传染病的基本特征。


六、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者，男性，66 岁。2 年前晨练时出现心悸，持续约 2 小时后自行缓解，以后类似发作反复出现。外院就诊，查 ECG 发现偶发早搏、阵发房颤，予倍他乐克等药物治疗，效果不佳。近 1 个月心悸发作较前频繁，伴胸闷，持续时间延长至 4~6 小时方能缓解，发作时多次查心电图均提示左室肥厚，查心肌坏死标记物、BNP 及冠脉 CT 均未见异常。以“心律失常：阵发性心房颤动”收入院。

既往高血压病史 10 余年，最高血压 160/100mmHg，不规则服药治疗，血压控制情况不详。吸烟 30 年，15~20 支/日，未戒烟。无家族遗传病史。

查体：T 36.2℃，P 98 次/分，R 18 次/分，BP 156/96mmHg，H 165cm，W 51kg。神志清楚。口唇无发绀，甲状腺无肿大。双肺未闻及干湿性啰音。心界不大，心率 112 次/分，第一心音强弱不等，心律绝对不齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。

入院后 ECG 如图所示。考虑房颤的发生与高血压有关。



请回答：

- (1) 支持该患者入院初步医疗诊断的查体及辅助检查结果；
- (2) 患者的高血压危险分层及依据；
- (3) 该患者健康教育的重点。

56. 患者，男性，55岁。近1个月来腹胀、进行性加重，伴纳差、乏力。为进一步治疗来就诊。既往乙肝后肝硬化15年。饮酒20年，现偶饮啤酒。

查体：T 37.2℃，R 18次/分，P 82次/分，BP 126/72mmHg，神清语利，查体合作。皮肤巩膜黄染，上胸部可见数个蜘蛛痣，双手掌大小鱼际可见红斑，心肺(-)，腹部膨隆呈蛙腹状，腹壁可见脐周曲张的静脉，肝未触及，脾脏肋下2指、质软无压痛，移动性浊音(+)，肠鸣音4次/分。双下肢不肿。

辅助检查：血WBC $8.8 \times 10^9/L$ ，Neut% 70%，Hb 108g/L↓，PLT $192 \times 10^9/L$ ，ALB 30g/L↓，ALT 68U/L↑，AST 54U/L↑，血氨 20μmol/L。腹部B超显示：肝硬化、腹水、脾大、门脉增宽。胃镜显示：食管距门齿25cm处可见4组曲张静脉，呈结节样迂曲；胃贲门周围可见数组曲张静脉与食管相延续。

入院诊断为“乙肝后肝硬化失代偿期，门静脉高压”，拟于入院后择期行内镜下食管胃底曲张静脉套扎+硬化+组织胶治疗。

请回答：

- (1) 支持“门静脉高压”诊断的阳性体征和检查结果；
- (2) 结合患者目前情况，写出饮食护理原则。