

2025年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

急救护理学

(课程代码 03007)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共30小题, 每小题1分, 共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 急诊患者留院观察的标准为
A. 宜严不宜宽
B. 先留观再明确诊断
C. 宜宽不宜严
D. 先明确诊断再留观
2. 分诊护士发现某患者有急性症状和急诊问题, 但目前明确没有危及生命或致残危险, 根据原卫生部发布的我国首部《医院急诊科规范化流程》中的急诊患者四级病情分级标准, 其病情分类为
A. A类(濒危患者)
B. B类(危重患者)
C. C类(急症患者)
D. D类(非急症患者)
3. 患者, 男性, 58岁, 既往冠心病病史6年。1小时前与家人吵架后突发胸骨后压榨性疼痛, 服用硝酸甘油不能缓解, 伴大汗, 呕吐胃内容物2次。生命体征: T 37.1℃, HR 106次/分, R 24次/分, BP 98/60mmHg。按照急诊五级病情分级标准, 该患者的分级为
A. I级(危急)
B. II级(危重)
C. IV级(急症)
D. V级(非紧急)

4. 下列发热病因中常引起中枢神经性发热的是
A. 原发性肝癌
B. 中暑
C. 类风湿关节炎
D. 甲亢
5. 化脓性感染患者典型的热型是
A. 弛张热
B. 稽留热
C. 间歇热
D. 回归热
6. 患者, 男性, 43岁, 平素体健, 近期工作压力大, 生活不规律。1小时前无明确诱因突发胸骨后压榨性疼痛, 向左肩背部及左上肢放射, 休息后疼痛不缓解。心电图示动态心肌缺血表现, 心肌损伤标志物正常。该患者胸痛最可能的原因为
A. 自发性气胸
B. 肺梗死
C. 急性冠状动脉综合征
D. 主动脉夹层
7. 患者, 男性, 54岁, 吸烟史30年, 30支/日, 既往体健。主诉咯血伴呛咳1天就诊。根据该患者的病史应高度警惕的问题是
A. 肺梗死
B. 支气管肺癌
C. 肺结核
D. 支气管扩张症
8. 非专业人员对心搏骤停患者进行评估时一般不推荐评估的表现是
A. 意识丧失
B. 呼吸停止
C. 叹气样呼吸
D. 颈动脉搏动消失
9. 高钙血症患者可使用的药物不包括
A. 氢氯噻嗪
B. 降钙素
C. 阿司匹林
D. 双磷酸盐
10. 下列急性呼吸性碱中毒患者的急救护理措施中不正确的是
A. 嘱患者反复屏气
B. 将塑料袋套于患者口鼻上
C. 5%CO₂混合气体吸入
D. 应用呼吸兴奋剂
11. 患者, 男性, 42岁, 以阵发性腹痛、反复呕吐伴腹胀1日来诊, 急查电解质: 血清钠130mmol/L, 初步判断其水钠代谢紊乱的类型为
A. 等渗性缺水
B. 低渗性缺水
C. 高渗性缺水
D. 水中毒
12. 口咽通气道置入长度的正确测量方法是测量患者
A. 门齿到下颏的距离
B. 鼻尖到门齿的距离
C. 鼻尖到耳垂的距离
D. 门齿到下颌角的距离
13. II型呼吸衰竭患者适宜的吸氧流量为
A. 1~2L/min
B. 4~6L/min
C. 7~8L/min
D. 9~10L/min

14. 根据 Killip 分级标准, 急性心肌梗死患者肺底部可闻及湿啰音时, 其心功能为
- A. I 级 B. II 级
C. III 级 D. IV 级
15. 急性胰腺炎患者血清淀粉酶开始升高的时间一般是发病后
- A. 即刻 B. 1~2h
C. 6~12h D. 48h
16. 急性胰腺炎最早出现的症状是
- A. 恶心、呕吐 B. 腹胀
C. 腹泻 D. 腹痛
17. 肾结石的主要症状是
- A. 肾积水 B. 膀胱刺激症
C. 疼痛和血尿 D. 排尿中断
18. 糖尿病酮症酸中毒患者降低血糖治疗首选的药物是
- A. 短效胰岛素 B. 中效胰岛素
C. 长效胰岛素 D. 磺脲类降糖药
19. 对于非糖尿病患者, 低血糖的诊断标准是血糖水平低于
- A. 6.1mmol/L B. 3.9mmol/L
C. 2.8mmol/L D. 2.1mmol/L
20. 甲状腺危象患者降温治疗时应禁用
- A. 冰生理盐水灌肠 B. 水杨酸类解热药
C. 氯丙嗪 D. 降温毯
21. 下列属于椎-基底动脉梗死的典型表现的是
- A. 眩晕 B. 对侧偏瘫
C. 同向性偏盲 D. 失语
22. 脑出血最常见的病因是
- A. 颅内动脉瘤破裂 B. 动静脉畸形
C. 颅内肿瘤 D. 高血压合并细、小动脉硬化
23. 患者, 女性, 33 岁, 主因车祸致颅脑损伤半小时来诊。患者在车祸后曾有短暂昏迷 15 分钟, 醒后主诉有轻微头昏、恶心、晕眩, 有近事遗忘, 远期记忆正常。查体: 生命体征无明显异常, 神经系统体征正常。该患者的颅脑损伤严重程度为
- A. 轻型 B. 中型
C. 重型 D. 特重型

24. 患者, 男性, 22 岁, 因匕首刺伤腹部急诊就诊。查体: T 36.0℃, HR 122 次/分, R 26 次/分, BP 78/52mmHg。面色苍白, 神志淡漠, 腹部压痛、反跳痛不明显。患者最可能发生的损伤是
- A. 胃破裂 B. 肠破裂
C. 胆总管破裂 D. 脾破裂
25. 最常见的异位妊娠是
- A. 输卵管妊娠 B. 宫颈妊娠
C. 卵巢妊娠 D. 腹腔妊娠
26. 患者, 男性, 48 岁, 主因石灰溅入右眼内 2 小时来诊。查体: 右上眼睑皮肤起泡、糜烂, 右眼结膜水肿, 局限性坏死, 角膜雾状浑浊, 上皮全部脱落, 角膜浅层基质受累。判断该患者的病情程度为
- A. 轻度 B. 中度
C. 重度 D. 极重度
27. 患儿, 男性, 3 岁, 主因发热、咳嗽 3 日, 呼吸困难伴喉鸣 2 小时来诊。查体: 烦躁不安, 鼻翼扇动, 口唇发绀, 吸气性喉鸣伴三凹征。SpO₂ 88%, HR 110 次/分。此时应采取的紧急处理措施是
- A. 鼻导管吸氧 B. 雾化吸入
C. 解痉平喘 D. 气管切开
28. 下列对高压电引起的损伤描述正确的是
- A. 口小底大, 外深内浅 B. 口大底小, 外深内浅
C. 口小底大, 外浅内深 D. 口大底小, 外浅内深
29. 患者, 男性, 41 岁, 6 小时前因与家人吵架, 服用大量镇静催眠药后由家人送至急诊。下列急救护理措施中能够促进已吸收毒物排出的是
- A. 催吐 B. 洗胃
C. 灌入药用活性炭 D. 血液净化
30. 患者, 女性, 32 岁, 因有机磷农药中毒急诊入院。入院后查血胆碱酯酶活力为 58%, 患者主诉头痛、头晕、乏力、恶心、胸闷、多汗、视物模糊, 查体可见瞳孔缩小。该患者的中毒程度为
- A. 轻度 B. 中度
C. 重度 D. 危重

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

31. 上消化道出血最常见的临床表现有
- A. 恶心
B. 腹痛
C. 呕血
D. 腹泻
E. 黑便
32. 胃、十二指肠穿孔的临床特点包括
- A. 有溃疡病史
B. 突发上腹部剧烈持续疼痛
C. 上腹部压痛和反跳痛
D. 腹肌紧张可呈板状腹
E. 墨菲征阳性
33. 尿路结石形成的主要因素包括
- A. 尿中盐类呈超饱和状态
B. 抑制晶体形成物不足
C. 核基质的存在
D. 血管内皮细胞损伤
E. 血管舒缩功能异常
34. 低血糖危象的常见病因包括
- A. 胰岛素使用过量
B. 口服降糖药物过量
C. 食物摄入过量
D. 运动过量
E. 饮酒过量
35. 按照与宿主动物的接触方式进行狂犬病暴露分级，属于 II 级的有
- A. 接触或喂养动物
B. 裸露的皮肤被轻咬
C. 无出血的轻微抓伤
D. 破损皮肤被舔舐
E. 黏膜被患者唾液污染

第二部分 非选择题

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

36. 简述采用动脉血气分析判断酸碱平衡紊乱的步骤。
37. 简述可引起急性上消化道出血的全身性疾病。
38. 简述尿石症患者疼痛护理的措施。
39. 简述服用抗癫痫药物的护理要点。

四、论述题：本大题共 1 小题，10 分。

40. 试述机械通气时维持足够氧供及通气的护理要点。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

41. 某护士于公交站台候车时，目睹一中年男性突然倒地，患者对拍打肩部及呼唤无反应，呼吸停止，颈动脉搏动消失。护士立即请公交站工作人员拨打急救电话并取 AED。

请写出：

- (1) 该患者最可能出现的问题及判断依据；
(2) 护士此时应立即实施的心肺复苏技术及其要点。

42. 患者，男性，68 岁，晨起买早点途中突发胸痛，呈撕裂样，剧烈难忍，伴大汗，无明显放射痛，持续 5 小时未缓解，遂至急诊。查体：神志清楚，急性病容，T 36.1℃，HR 92 次/分，R 20 次/分，BP 右上肢 175/80mmHg，左上肢 150/65mmHg，心肺腹(-)。心肌损伤标志物及血浆 D-二聚体均未见增高。患者既往高血压病史 15 年，未规律治疗，血压最高达 200/150mmHg。

请写出：

- (1) 该患者胸痛最可能的原因；
(2) 针对该患者的急救护理措施。

