

16. 患者，女，62岁。有糖尿病史5年，坚持规范服用降糖药物治疗，今日按常规服用药物后爬山时突感乏力，心慌，出冷汗后晕倒，最恰当的现场救护措施是
- A. 呼叫急救中心，等待并观察生命体征变化 B. 给予口服降糖药物
C. 给予进食糖类食品 D. 给予饮用水
17. 原发性肾病综合征尿、血生化及肾功能检查下列哪项不妥
- A. 血浆白蛋白 $<30\text{g/L}$ B. 肌酐清除率正常或降低
C. 24h尿蛋白定量 $<3.5\text{g}$ D. 血胆固醇、甘油三酯可升高
18. 发生甲亢危象时，首选的药物为
- A. 甲硫氧嘧啶 B. 丙硫氧嘧啶
C. 复方碘口服溶液 D. 氢化可的松
19. 为了预防糖尿病足的发生，患者采取的措施中，错误的是
- A. 每日检查足部 B. 每日温水泡脚
C. 鞋要舒适、宽松 D. 修剪趾甲宜短，以利于清洁
20. 纠正尿毒症性贫血最有效的措施是
- A. 输新鲜血 B. 输库存血
C. 注射促红细胞生成素 D. 输血浆
21. 脑栓塞最常见的病因为
- A. 心肌炎 B. 脂肪栓子
C. 风心病二尖瓣狭窄合并房颤 D. 人工气胸
22. 蛛网膜下腔出血最具特征性的表现是
- A. 剧烈头痛 B. 呕吐
C. 脑膜刺激征 D. 短暂意识障碍
23. 急性心肌梗死发病后发热，多在1周内恢复正常，发热原因是由于
- A. 肺部感染 B. 体温调节中枢紊乱
C. 心肌坏死组织吸收 D. 胃肠道脱水
24. 除下列哪项，其余为急性ST段抬高心肌梗死病人的心电图
- A. ST段压低 $>0.1\text{mV}$ B. T波倒置
C. 宽而深的异常Q波 D. ST段弓背向上抬高与T波合成单向曲线
25. 患者，女，35岁。患十二指肠溃疡2年，感头晕、心悸、乏力。查红细胞 $3.2\times 10^9/\text{L}$ ，白细胞 $5.0\times 10^9/\text{L}$ ，血红蛋白 80g/L ，血小板 $150\times 10^9/\text{L}$ ，网织红细胞0.8%。骨髓象：幼红细胞增生活跃，中晚幼红细胞达45%，体积小，胞浆蓝而少，边缘不规则，血清铁 $<50\mu\text{g/dl}$ ，根据这一病史提示为
- A. 巨幼细胞贫血 B. 缺铁性贫血
C. 再生障碍性贫血 D. 溶血性贫血
26. 化疗药物最常见的毒性作用
- A. 骨髓抑制 B. 胃肠道反应
C. 脱发 D. 肝功能损害

27. 有一急性再生障碍性贫血患者，突然出现头晕头痛、视物模糊、呼吸急促，该病人发生了
- A. 高血压危象 B. 脑梗死
C. 颅内出血 D. 脑动脉痉挛
28. 患者，女性，40岁。以“系统性红斑狼疮”入院，经住院治疗症状基本缓解。下列对该患者的健康指导，不正确的是
- A. 每日用肥皂水清洗皮损部位 B. 禁用化妆品
C. 外出时戴遮阳帽或打遮阳伞 D. 远离紫外线，禁止进入紫外线消毒室
29. 类风湿关节炎最常累及的关节是
- A. 肘关节 B. 四肢小关节
C. 肩关节 D. 膝关节
30. 脑血管病最重要的危险因素是
- A. 高血压 B. 高血脂
C. 肥胖 D. 吸烟

二、多项选择题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题列出的备选项至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

31. 符合慢性阻塞性肺气肿的体征有
- A. 语颤减弱 B. 呼吸运动增强
C. 叩诊呈过清音 D. 叩诊呈实音
E. 桶状胸
32. 对支气管哮喘病人应采取的护理措施有
- A. 给予清淡、易消化饮食 B. 嘱病人多饮水，每日饮水量2500~3000ml
C. 促进有效排痰 D. 呼吸困难明显者遵医嘱给氧
E. 保持环境整洁，摆放花草缓解紧张气氛
33. 脑血管疾病的死亡率和致残率高，其防治措施可有
- A. 积极控制高血压 B. 控制体重，避免肥胖
C. 筛查和积极治疗糖尿病 D. 合理使用抗血小板聚集药
E. 戒烟
34. 与系统性红斑狼疮的病因有关的因素有
- A. 遗传 B. 链球菌感染
C. 寒冷、潮湿 D. 雌激素水平
E. 过度劳累
35. 甲亢病人伴明显突眼者，其眼部护理措施有
- A. 睡眠应取高枕卧位 B. 睡前涂抗生素眼膏
C. 低盐饮食 D. 外出戴墨镜，避免强光刺激
E. 睡眠时眼睑不能闭合者需覆盖无菌纱布或眼罩

第二部分 非选择题

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

36. Gullen 征
37. 脑梗死
38. 黎明现象
39. 系统性红斑狼疮
40. 呼吸衰竭

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

41. 简述缺铁性贫血病人口服铁剂的注意事项。
42. 简述肾性高血压的发病机制。
43. 简述洋地黄类药物中毒表现及处理。
44. 上消化道继续或再次出血的判断。
45. 支气管哮喘常见的症状和体征。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 患者，女，34 岁。心悸、气短 5 年，加重伴双下肢水肿 1 年。病人于 5 年前由于过度劳累自觉心悸、气短，休息后可缓解，未经任何治疗，能胜任日常工作。近一年反复出现双下肢水肿，在当地医院用利尿药后水肿消退。近 2 天由于着凉，再次出现气短、水肿而来院求治。既往史：间断咳血 5 年。身体评估：T36.5°C，P 130 次/min，R 20 次/min，BP：16.0/9.3kPa。呼吸急促，口唇发绀，可见颈静脉怒张，双肺底可听到干湿性啰音，心界叩诊向左扩大，心尖部可触及舒张期震颤，HR 130 次/min，心律规整。心尖部可听到舒张中晚期隆隆样杂音，第一心音亢进，并听到清脆响亮的开瓣音。全腹软，无压痛，肝脏于右锁骨中线肋缘下触及 3.0cm，前正中线剑突下 5.0cm，脾脏未触及，双下肢中度水肿。辅助检查：血常规 WBC 10.0 x10⁹/L，N 0.60，L 0.40。血清 K⁺、Na⁺、C-均在正常范围。尿常规未见异常。心电图窦性心律，心电轴右偏+120 度，P 波呈双峰型，峰间距>0.04s，RV₁1.2mV，RV₁+SV₅=2.1mV。
 - (1) 请提出完整的诊断？
 - (2) 该病人护理诊断有哪些？
 - (3) 该病人的健康指导重点是什么？
47. 患者，男，48 岁。因腹胀、乏力、意识模糊而入院。2 天前因感冒后突然出现烦躁不安，表情淡漠，时而神志不清，既往有慢性肝炎病史 10 年，查体：T37°C，P102 次/分，R23 次/分，BP95/65mmHg，病人一般状况差，面色晦暗、嗜睡，面

部及颈部有散在的蜘蛛痣，有明显的肝掌、皮肤巩膜轻度黄染，颈软，无颈静脉怒张，两肺未闻及啰音，心率齐未闻及杂音。腹软隆起，腹壁静脉显露。移动性浊音阳性，肠鸣音正常，腱反射亢进，肝肋下 1cm，质硬无压痛。脾肋下 3cm。扑翼样震颤(+)，病人计算力、理解力下降。化验血红蛋白 70g/L，白细胞计数 3:6x10⁹/L，血氨 66.46um/L。

- (1) 该患者的初步诊断是什么？
- (2) 请提出主要的护理诊断并指定相关护理措施。
- (3) 如何避免和去除该疾病的诱发因素？

