

外科护理学（二）

（课程代码 03203）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 等渗性脱水伴酸中毒病人，在补充碱性溶液纠正酸中毒后，容易发生
A. 低钠 B. 低氯
C. 低钾 D. 低镁
2. 关于营养支持的原则叙述正确的是
A. 优先选用肠外营养支持
B. 肠外营养支持持续时间小于 2 周者，应经中心静脉置管输注营养液
C. 外科病人凡存在营养不良都是营养支持的对象
D. 肠外营养补充不足时可用肠内营养补充
3. 下列手术在同一手术室中安排接台进行，其中第一台手术应首先安排
A. 阑尾切除术 B. 胃大部切除术
C. 直肠癌根治术 D. 甲状腺大部分切除术
4. 全身麻醉前用药，给抗胆碱药物的目的是
A. 镇静 B. 减少呼吸道分泌
C. 对抗局麻药毒性 D. 减轻内脏牵扯痛
5. 下列对破伤风的护理措施中，错误的是
A. 病人住单人隔离病房
B. 用 3% 的过氧化氢溶液清洗伤口
C. 使用后的器械和敷料均应先消毒清洗后，再行高压蒸汽灭菌
D. 注射破伤风抗毒素
6. 一成年男性右手及右足烧伤，其烧伤面积为
A. 3% B. 6%
C. 7% D. 4.5%
7. 患者，女，54 岁。因患肺癌入院。接受静脉化疗时，穿刺部位出现肿胀，处理方法是
A. 立即停止给药，不拔针，接注射器回抽溢出的药液和注射解毒剂后，再拔针
B. 立即停止给药，局部注射解毒剂，然后拔针
C. 立即停止给药，拔针，然后局部注射解毒剂
D. 立即停止给药，不拔针，接注射器回抽溢出的药液后，再拔针
8. 关于胸腔闭式引流装置，下列选项不正确的是
A. 水封瓶装置密封 B. 水封长玻璃管应浸在液面下 3~4cm
C. 水封瓶应低于引流口 30cm D. 换瓶时用双钳夹闭引流管近端
9. 下列哪项不属于人工心肺机的组成
A. 人工心 B. 人工肺
C. 变温器 D. 呼吸机
10. 传统疝修补手术后应嘱病人
A. 切口需沙袋压迫 B. 术后 3~5 天病人可离床活动
C. 有痰时大力咳出 D. 术后当日取半卧位
11. 患者，女，32 岁。车祸至下腹部损伤。查体：下腹部轻压痛，无反跳痛。导尿有少量血尿。6 小时后，尿量仅 100 ml，呈血性，腹痛加剧。移动性浊音（+）。最有可能的诊断是
A. 肾挫伤 B. 膀胱破裂
C. 前尿道损伤 D. 输尿管损伤
12. 韦某，男，25 岁。斗殴被木棒击伤右上腹部，1 小时后面色苍白，大汗淋漓，四肢发凉，脉搏 120 次/分，血压 60/40mmHg，全腹明显压痛、反跳痛、腹肌紧张，尤以右上腹明显，腹穿抽出不凝固血液，最可疑的是
A. 肝破裂 B. 脾破裂
C. 胃破裂 D. 小肠破裂
13. 消化性溃疡最具有特征性的临床表现是
A. 恶心、呕吐 B. 常有嗝气、反酸
C. 节律性上腹痛 D. 消瘦及贫血
14. 患者，女，40 岁。反酸，嗝气 10 多年，近来加重，疑为胃溃疡恶变，下列对帮助诊断最重要的是
A. 同位素检查 B. X 线
C. B 超 D. 胃镜+病理检查

15. 李某, 男, 40 岁。阑尾炎术后第 4 天, 伤口疼痛, 检查伤口红肿, 有波动。首先的处理应是
- A. 局部理疗 B. 拆除缝线引流
C. 静滴抗生素 D. 禁食、卧床休息
16. 胆囊结石行 B 超检查, 检查前一晚宜进食
- A. 红烧牛肉 B. 油煎豆腐
C. 牛奶 D. 清汤面
17. 李某, 男, 32 岁。近两月来腰部有隐痛。今天上午 7 时突然出现腹痛, 为阵发性刀割样疼痛。病人辗转不安, 呻吟呼痛, 面色苍白, 镜下血尿, 应考虑为
- A. 肾肿瘤 B. 肾结石、肾绞痛
C. 阑尾炎 D. 胆囊炎
18. 患者, 男, 70 岁。进行性排尿困难 10 年。今日饮酒后出现急性尿潴留。10 小时未排尿, 急诊入院。首先应给予的治疗措施是
- A. 导尿 B. 让病人听流水声
C. 按摩下腹部 D. 诱导排尿
19. 诊断急性脑出血首选的检查是
- A. MRA B. MRI
C. CT D. CTA
20. 关于疔, 下列哪项是错误的
- A. 炎症肿块迅速增大, 疼痛明显 B. 表面出现多个脓头
C. 不易发生全身性感染 D. 中毒症状明显

二、多项选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的, 请将其选出, 错选、多选或少选均无分。

21. 静脉输入氯化钾溶液时, 正确的有
- A. 尿少者不宜给钾 B. 钾浓度不超过 3%
C. 成人每分钟不宜超过 60 滴 D. 每日补钾总量 3~6 克可满足生理需要
E. 5%GS1000ml 可加入 1~1.5g 的钾
22. 手术后病人半卧位的好处包括
- A. 有利于呼吸 B. 有利于循环
C. 有利于腹腔炎性渗出物的局限 D. 减轻腹壁张力
E. 防止内出血
23. 符合脑震荡的表现有
- A. 意识障碍不超过 30 分钟 B. 逆行性健忘
C. 颅内压增高 D. 脑脊液检查无异常
E. 神经系统检查无异常

24. 下列关于肺癌根治术患者术后体位安置的描述, 正确的有
- A. 病人未清醒前取平卧位, 头偏向一侧
B. 肺段切除术或楔形切除术者, 尽量选择健侧卧位
C. 一侧肺叶切除者, 如呼吸功能尚可, 可取健侧卧位
D. 全肺切除术者, 避免过度侧卧, 可取 1/4 患侧卧位
E. 血痰或支气管瘘管者, 取患侧卧位。
25. 王先生, 32 岁。与朋友聚会后, 突发上腹部剧烈疼痛。查体: 腹部膨隆, 上腹部压痛明显, 有反跳痛、肌紧张。下列处理正确的有
- A. 禁食 B. 肠内营养支持
C. 应用抗生素控制感染 D. 静脉输液
E. 半卧位
26. 符合急性胰腺炎腹痛特征的有
- A. 饱餐或饮酒后发作 B. 疼痛于上腹
C. 无恶心、呕吐 D. 间歇发作性上腹剧烈痛
E. 疼痛可向左腰背放射
27. 创伤的局部表现包括
- A. 疼痛 B. 肿胀
C. 功能障碍 D. 体温增高
E. 面色苍白
28. 按照病理生理特点, 血胸可分为
- A. 进行性血胸 B. 迟发性血胸
C. 感染性血胸 D. 凝固性血胸
E. 血气胸
29. 肠梗阻的临床表现有
- A. 腹痛 B. 腹胀
C. 腹泻 D. 呕吐
E. 肛门停止排便、排气
30. 骨折牵引术的作用包括
- A. 骨折复位作用 B. 骨折固定作用
C. 防止骨质脱钙 D. 矫正畸形
E. 解除肌肉痉挛

第二部分 非选择题

三、名词解释题: 本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。

31. 甲状腺功能亢进
32. 直肠肛管周围脓肿

33. 深静脉血栓形成

34. 骨折复位

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

35. 简述创伤性休克的处理原则及措施。

36. 简述颅内压增高患者脑室引流的护理措施。

37. 简述乳腺癌患者根治术后患侧上肢肿胀的护理措施。

38. 简述肠梗阻的定义及按肠梗阻发生的基本原因分类。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

39. 张某，男性，48 岁，有慢性肝炎病史，近两个月上腹持续性隐痛，半月来疼痛明显加重，食欲差，体重减轻。体检：慢性肝病面容，肝肋下可触及质硬结节，有触痛，血红蛋白 90g/L，诊断为肝癌。行经肝动脉化疗栓塞（TACE）。病人主诉很担心自己的身体状况。

请分析下列问题：

(1) 请列出 2 项诊断肝癌常用的辅助检查。(2 分)

(2) 写出目前病人可能有的护理诊断有哪些？(4 分)

(3) TACE 介入治疗术后的护理要点是什么？(6 分)

40. 李某，男，50 岁。因“进行性吞咽困难 2 月余”，门诊“食管中上段癌”收入院。查体：消瘦，虚弱，精神不佳，T: 36.5℃，P: 80 次/分，R: 20 次/分，BP: 120/80mmHg，入院后完善相关检查。钡餐造影显示钡剂停留在左主支气管附近，仅能通过该部位下方约 3cm 的狭窄通道缓慢下流。胃镜+病理：距门齿 24~27cm 食管鳞癌。在全麻下行“胸腔镜食管癌根治术、胃-食管吻合术”，术后返回病房，患者担心疾病预后，情绪不佳。

请问：

(1) 请列出该患者的 3 个主要的护理问题/诊断。(3 分)

(2) 术后第 6 天，患者进食后出现呼吸困难、胸痛、胸腔积液、T38.7℃，寒战。

请问该患者发生了什么术后并发症？(2 分)

(3) 针对目前发生的并发症，主要的护理措施包括哪些？(5 分)

(4) 护理过程中如何预防和及时发现该并发症？(2 分)

