

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密★考试结束前

全国 2013 年 1 月高等教育自学考试 外科护理学（二）试题 课程代码：03203

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 高血压病人在麻醉和手术过程中，若血压骤升常易引起
 - A. 急性心力衰竭
 - B. 急性呼吸衰竭
 - C. 脑梗死
 - D. 急性肾功能衰竭
2. 抗休克治疗的首要措施是

- A. 给予血管活性药物
B. 补充血容量
C. 监测生命体征
D. 及早使用呼吸机辅助呼吸
3. 肠外营养支持病人, 常见而严重的并发症是
A. 导管局部感染
B. 肺动脉栓塞
C. 气胸
D. 导管性脓毒血症
4. 大面积烧伤病人低血容量性休克常发生在伤后
A. 48h 以内
B. 60h 以内
C. 72h 以内
D. 90h 以内
5. 某急性坏死性胰腺炎病人术后出现呼吸频率 28 次 / 分, PaO₂ (空气) 65mmHg, 心率 80 次 / 分, 平均动脉压 70mmHg, 尿量 30ml/h, 血钠 140mmol/L, 血糖 4.5mmol/L。该病人可能出现了
A. 肺功能不全和肾功能不全
B. 肾功能不全和代谢障碍
C. 肺功能不全和心功能不全
D. 心功能不全和代谢障碍
6. 甲状腺大部分切除术后, 甲状腺危象常出现在术后
A. 1~4h
B. 5~8h
C. 9~10h
D. 12~36h
7. 女性, 65 岁, 乳腺癌改良根治术后第 1 天, 出现呼吸困难, 患肢皮温低, 脉搏扪不清, 提示
A. 伤口出血量多
B. 胸带包扎过紧
C. 肺部感染
D. 引流管不通
8. 给予幽门梗阻病人术前温盐水洗胃的目的是
A. 清洁胃黏膜
B. 减轻胃黏膜水肿
C. 补充电解质
D. 减少胃潴留
9. 临床上最常见的肠梗阻类型是
A. 粘连性肠梗阻
B. 肠扭转
C. 蛔虫性肠梗阻
D. 肠系膜血管栓塞所致肠梗阻
10. 对腹腔实质性脏器损伤造成的急腹症, 有重要诊断价值的检查是
A. 腹部平片
B. B 超
C. 胃肠道造影
D. 血管造影术
11. 男性, 56 岁, 近 3 个月来排便次数增多, 每天 3~4 次, 粘液脓血便, 有里急后重感, 首选的检查方法是
A. B 超
B. X 线钡剂灌肠
C. 直肠指诊
D. 纤维结肠镜
12. 胰腺发生病变开始自身消化过程中, 最先被激活的酶是
A. 脂肪酶
B. 弹力纤维酶
C. 磷脂酶
D. 胰蛋白酶

13. 女性, 45 岁, 颅内压增高, 医嘱给予床头抬高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 其主要目的是
- A. 利于呼吸
B. 降低腹内压
C. 避免误吸
D. 利于颅内静脉回流
14. 某病人头部损伤后, 球结膜下出血, 鼻孔出血且有脑脊液流出, 可能为
- A. 鼻骨骨折
B. 颅前窝骨折
C. 颅中窝骨折
D. 颅后窝骨折
15. 开放性气胸病人现场急救的首要措施是
- A. 立即清创
B. 给予抗菌药
C. 迅速封闭伤口
D. 注射破伤风抗毒素
16. 食管癌病人最突出的症状是
- A. 进行性吞咽困难
B. 剑突下或上腹部疼痛
C. 食管内异物感
D. 胸骨后闷胀不适
17. 某肾结石病人经体外冲击波碎石后排出结石, 对其出院指导中正确的是
- A. 多吃高蛋白食物
B. 多饮白开水
C. 多喝高糖饮料
D. 补钙
18. 膀胱癌病人术后膀胱内灌注治疗, 疗效最好的药物是
- A. 卡介苗
B. 丝裂霉素
C. 阿霉素
D. 噻替哌
19. 人工髋关节置换术后, 病人可因应力遮挡引起骨量丢失和假体磨损而发生的并发症是
- A. 假体断裂
B. 骨水泥植入综合征
C. 假体无菌性松动
D. 假体脱位
20. 对脊髓损伤病人, 为了促进逼尿肌早期康复, 避免膀胱挛缩; 同时减少泌尿系感染的危险, 可以采用
- A. 留置尿管持续开放
B. 留置尿管间断开放
C. 间歇导尿
D. 耻骨上膀胱造瘘

二、多项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 可导致尿潴留的阿片类镇痛药物的给药方式有
- A. 口服给药
B. 肌内注射
C. 经静脉自控镇痛
D. 椎管内用药
E. 静脉注射
22. 肠内营养支持病人出现腹泻的原因包括
- A. 营养液过浓
B. 输注速度太快

- C. 肠道菌群失调
D. 输入液温度过低
- E. 输注时体位不当
23. 关于烧伤的疾病发展过程说法正确的有
- A. 48h 内易发生休克
B. 伤后 2~10 天易发生感染
C. 伤后 2~3 周焦痂开始自然溶解
D. III 度烧伤者需等待其焦痂自然溶脱后再植皮
E. 浅 II 度烧伤且创面无感染时, 愈后无瘢痕
24. 留置尿管的病人泌尿系感染的预防措施正确的有
- A. 引流袋置于膀胱水平以下, 保持通畅
B. 可从导尿管采集尿标本
C. 疑似导尿管堵塞时应及时冲洗
D. 每周更换集尿袋
E. 每天评估留置导管的必要性
25. 乳癌主要的两个淋巴转移途径有
- A. 腋窝途径
B. 内乳途径
C. 交通淋巴管途径
D. 深部淋巴网途径
E. 胸大肌淋巴管途径
26. 诊断性腹腔穿刺术后可能出现的并发症包括
- A. 局部感染
B. 腹壁出血
C. 肠管损伤
D. 凝血机制障碍
E. 腹内疝
27. 上叶顶部肺癌的临床表现包括
- A. 胸痛
B. 上肢静脉怒张
C. 眼睑下垂
D. 瞳孔缩小
E. 重症肌无力
28. 前列腺切除术后病人的注意事项包括
- A. 多饮水
B. 避免久坐
C. 多进食富含纤维素的食物
D. 保持大便通畅
E. 早期即可跑步、骑自行车
29. 预防膀胱癌复发的正确措施有
- A. 戒烟
B. 大量饮水
C. 服用维生素 C
D. 坚持膀胱内灌注化疗
E. 术后每年复查膀胱镜 1 次
30. 可能导致骨折延迟愈合或不愈合的因素有

- A. 反复闭合复位
B. 骨折端固定
C. 伤口感染
D. 只达到功能复位
E. 骨折端血供不良

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

31. 多器官功能障碍综合征
32. 库欣反应
33. 颅骨骨折
34. Miles 手术

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

35. 叙述乳腺癌术后患侧上肢功能锻炼的方法。
36. 简述腹部损伤病人血常规监测的临床意义。
37. 列举绞窄性肠梗阻的临床表现。
38. 简述重症胰腺炎病人的疼痛管理措施。

五、病例分析题（本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

39. 女性，29 岁，患原发性甲状腺功能亢进 3 年余，现甲状腺 II° 肿大，眼球轻度突出。病人因甲状腺肿大和眼球突出而与亲朋好友的交往逐渐减少，且不愿参加单位的大型活动。为了控制疾病发展，该病人曾积极进行内科治疗，但效果欠佳，遂入院准备手术。术前医嘱要求病人先后服用硫脲类药物和碘剂。入院后病人向护士询问保护眼睛的方法。

问：(1)请列出病人目前存在的 2 个主要的护理诊断 / 问题。（2 分）

(2)作为主管护士，如何回答病人提出的问题？（5 分）

(3)术前药物准备的目的是什么？硫脲类药物和碘剂的药理作用分别是什么？（5 分）

40. 男性，46 岁，近 2 月常出现右上腹隐痛，饥饿时明显，进餐后可缓解，未予处理。今日与朋友聚会，进食较多，并少量饮酒，餐后出现上腹剧烈刀割样疼痛，迅速出现全腹痛。查体 身高 1.75m，体重 60kg，体温 38.5℃，脉搏 90 次 / 分，呼吸 22 次 / 分，急性面容，全腹压痛、反跳痛、肌紧张。

问：(1)目前最可能的医疗诊断是什么？（1 分）

(2)治疗原则是什么？（1 分）

(3)列出目前病人 2 个主要的护理诊断 / 问题；（2 分）

(4)简述目前的护理措施。（8 分）