

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密 ★ 考试结束前

**浙江省 2013 年 4 月高等教育自学考试****健康评估试题****课程代码：10292**

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

**选择题部分**

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）**

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 收集健康史的主要方法是

- A. 身体评估  
B. 交谈  
C. 化验检查  
D. 影像检查
2. 会谈准备阶段
- A. 从主诉开始有序地会谈  
B. 礼貌称呼对方  
C. 明确目的, 制定提纲  
D. 自我介绍, 说明目的
3. 疼痛在全身运动数分钟出现, 休息后消失, 常提示
- A. 与缺血性因素有关  
B. 与感染性因素有关  
C. 与饮食因素有关  
D. 与呼吸因素有关
4. 腹腔、盆腔内脏器官病变引起的腰背痛主要是
- A. 累及脊柱  
B. 侵犯腰肌  
C. 累及皮肤  
D. 牵涉痛
5. 肝硬化失代偿期水肿的主要表现是
- A. 腹水  
B. 头面部水肿  
C. 下肢水肿  
D. 颈静脉怒张
6. 出现“三凹症”的呼吸困难类型是
- A. 阵发夜间呼吸困难  
B. 劳力性呼吸困难  
C. 吸气性呼吸困难  
D. 呼气性呼吸困难
7. 痰液呈浆液血性泡沫样痰提示
- A. 支气管扩张  
B. 急性肺水肿  
C. 大叶性肺炎  
D. 阿米巴肺脓肿
8. 大量咯血指一次咯血量达 300ml~500ml, 或每日咯血量达
- A. 500ml 以上  
B. 600ml 以上  
C. 700ml 以上  
D. 800ml 以上
9. 导致发绀的常见原因是
- A. 组织缺氧  
B. 严重贫血  
C. 高碳酸血症  
D. 血液中还原血红蛋白增多
10. 胸导联 V<sub>1</sub> 电极应放在
- A. 胸骨右缘第 4 肋间  
B. 胸骨左缘第 4 肋间  
C. V<sub>2</sub> 与 V<sub>4</sub> 连线中点  
D. V<sub>4</sub> 左第 5 肋间锁骨中线处
11. 呕吐物带蒜味考虑
- A. 酮症酸中毒  
B. 有机磷中毒  
C. 一氧化碳中毒  
D. 尿毒症
12. 胃内储血量达到多少以上可致呕血

- A. 200ml  
C.400ml
13. 慢性腹泻是指腹泻时间超过  
A. 1 个月  
C.3 个月
14. 病人处于熟睡状态, 强力刺激可被唤醒, 醒后答话含糊或答非所问, 考虑是  
A. 深昏迷  
C.昏睡
- 15.触诊腹水病人腹腔内有无肿物, 最好用  
A. 滑动触诊法  
C.深压触诊法
- 16.肿大的脾脏触诊时最显著的特征是  
A.形态不规则, 表面凹凸不平  
C.质软, 压痛
17. 魏尔啸淋巴结是  
A. 非特异性淋巴结炎  
C.急性细菌感染
- 18.桶状胸常见于  
A. 肺气肿  
C.气胸
- 19.X 型腿见于  
A. 膝关节结核  
C.髌关节脱位
- 20.代表心室快速复极时的电位变化的是  
A. P 波  
C.P-R 间期
- B.300ml  
D.500ml
- B.2 个月  
D.6 个月
- B.浅昏迷  
D.嗜睡
- B.双手触诊法  
D.冲击触诊法
- B.边缘及表面光滑  
D.有明显切迹
- B.淋巴结结核  
D.恶性肿瘤淋巴结转移
- B.肺大泡  
D.胸腔积液
- B.佝偻病  
D.股骨头坏死
- B.T 波  
D.QRS 波

## 二、多项选择题(本大题共 8 小题, 每小题 2 分, 共 16 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 评估思维水平的指标有  
A. 抽象思维功能  
C.判断力  
E.感知力
- B.洞察力  
D.想像力

22. 幽门梗阻所致的呕吐特点是
- A. 常发生在夜晚或凌晨
  - B. 进食后即可发生
  - C. 胃排空后仍有干呕
  - D. 呈喷射状
  - E. 呕吐量较多
23. 判断成人发育正常的指标有
- A. 体型是正力型
  - B. 坐高等于下肢的长度
  - C. 胸围约为身高的 1/2
  - D. 头部的长度约为身高的 1/8
  - E. 两上肢展开的长度约等于身高
24. 中心性发绀的临床特点是
- A. 发绀部位皮肤温暖
  - B. 发绀部位皮肤低温
  - C. 发绀加温可消失
  - D. 按摩发绀部位后发绀消失
  - E. 累及黏膜与躯干皮肤
25. 可引起呼气性呼吸困难的是
- A. 气管异物
  - B. 支气管哮喘
  - C. 急性喉炎
  - D. 阻塞性肺气肿
  - E. 肺不张
26. 非压陷性水肿多见于
- A. 心脏病
  - B. 肝脏病
  - C. 丝虫病
  - D. 甲状腺功能减退
  - E. 肾脏病
27. 下列各反射中属于深反射的是
- A. 肱二头肌反射
  - B. 提睾反射
  - C. 肱三头肌反射
  - D. 膝腱反射
  - E. 跟腱反射
28. 下列内容中属于健康史的是
- A. 主诉
  - B. 身体评估
  - C. 现病史
  - D. 既往史
  - E. 系统回顾

### 非选择题部分

#### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

**三、填空题(本大题共 8 小题, 每空 1 分, 共 14 分)**

29. 护理病史的重点应集中在\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_对病人日常活动的影响。
30. 发热按病因分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
31. 情绪和情感的基本特征是\_\_\_\_\_。
32. 孕妇骨盆的大小和形态关系到分娩的难易, 临床上测量骨盆的方法有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
33. 不管何种体位, 颈静脉充盈高度超过胸骨角上\_\_\_\_\_, 均称为\_\_\_\_\_。
34. 标准体重估计公式为: 男(kg) = \_\_\_\_\_; 女(kg) = \_\_\_\_\_。
35. 在病人患有肺炎或胸膜炎时, 呼吸运动以\_\_\_\_\_为主。
36. 门静脉高压时, 腹壁静脉曲张的血流方向是脐水平以\_\_\_\_\_自上向下, 脐水平以\_\_\_\_\_自下向上。

**四、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)**

37. 护理诊断
38. 湿啰音
39. 黄疸
40. 反跳痛
41. 应对

**五、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)**

42. 徐芬, 因甲状腺肿大拟手术治疗而入院, 你在对她进行了自我介绍后, 要为她做一系列的入院检查, 请简述身体评估时的注意事项。
43. 心肌缺血时, 心电图出现 T 波低平或倒置的意义是什么?
44. 病人主诉外伤致腰背部疼痛, 你如何对该病人进行脊柱的压痛和叩击痛的检查?
45. 黄兵, 由于“颅脑外伤”而入院。病人主诉, 头痛、恶心, 有呕吐。简述对他进行脑膜刺激征的评估内容和常见病因。

**六、综合应用题(本大题 15 分)**

46. 王红, 女, 35 岁, 2 天前在接孩子回家的路上, 骑自行车被撞, 致骨盆骨折入院。现自诉头痛, 全身关节痛, T39.8℃, 呼吸 32 次/分, 心率 120 次/分, 血压 150/100mmHg, 面色潮红, 皮肤温暖出汗, 你作为她的护士给予测量体温、脉搏、呼吸、血压 30 分钟一次, 头部及大动脉处置冰袋, 按医嘱给予口服盐水和电解质。一小时后测体温降至 37.5℃, 呼吸 20 次/分, 心率 82 次/分, 心律齐, 血压 120/80mmHg, 病人安静。

请用 PIO 方式记录。在对李红的压力状态进行评估时, 应详细了解哪些资料?