

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密 ★ 考试结束前

浙江省 2013 年 7 月高等教育自学考试

药理学（二）试题

课程代码：03026

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

- 1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
- 2.每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.下列哪个参数可反映药物的安全性

A. 治疗指数

B.最小中毒量

- C.LD₅₀ D.ED₅₀
- 2.弱碱性药物在碱性尿液中
- A. 解离多，再吸收多，排泄慢 B.解离多，再吸收少，排泄快
C.解离少，再吸收多，排泄慢 D.解离少，再吸收少，排泄快
- 3.药物不良反应产生的药理学基础是
- A. 用药剂量过大 B.机体的敏感性过高
C.用药时间过长 D.药物作用的选择性低
- 4.药物的首关消除可能发生于
- A. 舌下给药后 B.静脉注射后
C.皮下注射给药后 D.口服给药后
- 5.药物的副作用是指
- A. 用药量过大引起的不良反应 B.治疗量时出现的与治疗目的无关的作用
C.治疗量时出现的变态反应 D.药物对老年及儿童的有害作用
- 6.肾上腺素升压作用可被下列哪一类药物所翻转?
- A. M 受体阻断药 B.N 受体阻断药
C.β 受体阻断药 D.α 受体阻断药
- 7.苯二氮卓类与巴比妥类比较，前者没有的药理作用是
- A. 镇静、催眠 B.抗焦虑
C.麻醉作用 D.抗惊厥
- 8.硫喷妥钠作用时间短是因为
- A. 诱导肝药酶，加速自身代谢 B.经呼吸道迅速排出
C.在血浆中迅速水解 D.在体内重新分布
- 9.氯丙嗪引起的锥体外系反应不包括下列哪一项?
- A. 体位性低血压 B.急性肌张力障碍
C.静坐不能 D.帕金森氏综合征
- 10.乙酰水杨酸的不良反应不包括
- A. 胃肠反应 B.粒细胞减少
C.水杨酸反应 D.凝血障碍
- 11.用于治疗阵发性室上性心动过速的最佳药物是
- A. 奎尼丁 B.苯妥英钠
C.维拉帕米 D.利多卡因
- 12.强心苷降低房颤患者的心室率原因是
- A. 降低心室肌自律性 B.降低心房自律性

- C.增加房室结传导 D.抑制房室结传导
- 13.下列关于用铁剂治疗缺铁性贫血的注意事项中,哪一项是错误的?
- A.常与维生素 C 合用,促进铁的吸收 B.高磷高钙食物可促进吸收
C.不宜与四环素类药物同服 D.胃酸缺乏时吸收减少
- 14.下面哪一项不是香豆素类药物抗凝作用的特点?
- A.口服有效 B.起效慢
C.作用持久 D.体内,体外均有抗凝作用
- 15.硝苯地平治疗高血压的特点之一是
- A.降压的同时可减慢心率 B.降压的同时可反射性加快心率
C.降压的同时伴有心输出量减少 D.可明显减少血浆肾素浓度
- 16.某人嗜酒如命,在一次体检中发现自己患了高血压,还有左心室肥厚,请问他最好应服用哪类药
- A.血管紧张素转换酶抑制剂 B.神经节阻断药
C.中枢性降压药 D.钙拮抗剂
- 17.硝酸甘油、 β 受体阻断药和钙拮抗剂治疗心绞痛的共同作用是
- A.抑制心肌收缩力 B.延长射血时间
C.减慢心率 D.降低心肌耗氧量
- 18.呋塞米没有以下哪一项作用?
- A.降低血浆尿酸浓度
B.利尿作用强而迅速
C.对急性肺水肿病人有效
D.抑制髓袢升支粗段髓质部对 NaCl 的再吸收
- 19.糖皮质激素的不良反应不包括
- A.类肾上腺皮质功能亢进综合征 B.诱发或加重感染
C.诱发或加重支气管哮喘 D.诱发或加重溃疡病
- 20.氨基苷类抗生素的主要毒性有
- A.软骨损坏 B.在泌尿道形成结晶
C.耳鸣、耳聋 D.骨髓抑制

二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

- 21.氯丙嗪对中枢神经系统的作用有
- A.镇静、催眠 B.抗精神病作用

- C.镇吐作用
E.加强中枢抑制药作用
- 22.应用 β 受体阻断药应注意
- A. 久用不可突然停药
C.心脏传导阻滞者禁用
E.心绞痛患者禁用
- 23.具有保钾作用的利尿药有
- A. 呋塞米
C.螺内酯
E.氨苯蝶啶
- 24.糖皮质激素可用于
- A. 暴发型流行性脑膜炎
C.胸膜炎
E.风湿热
- 25.喹诺酮类抗菌药物的特点包括
- A. 抗菌谱广
C.结构与 PABA 相似
E.抗菌作用是通过抑制细菌细胞壁合成
- D.降温作用
B.高血压患者禁用
D.支气管哮喘者禁用
- B.依他尼酸
D.氢氯噻嗪
- B.中毒性菌痢
D.角膜炎
- B.杀菌剂
D.可能损伤儿童软骨组织

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共 10 小题,每空 1 分,共 20 分)

- 26.血浆药物浓度下降一半所需的时间称为_____,常以_____符号表示。
- 27.毛果芸香碱对眼的作用有缩瞳、_____、_____等。
- 28.阿托品的临床应用包括_____、_____、眼科、抗心律失常、抗休克、解救有机磷酸酯类中毒等。
- 29.新斯的明对胃肠道和膀胱_____的作用较强,对_____的作用最强。
- 30.酚妥拉明可阻断血管平滑肌的_____受体,因此可治疗_____疾病。
- 31.Ia 类抗心律失常药的代表药是_____,III 类抗心律失常药的代表药是_____。
- 32.高血压伴糖尿病的患者或痛风者不宜选用_____,高血压伴支气管哮喘的患者不宜选用_____。
- 33.卡托普利抗高血压作用机制是抑制_____,使_____形成减少和缓激肽分解减少。
- 34.平喘药按其结构和作用环节主要有:_____,_____,肾上腺皮质激素,过敏介质释放阻滞药。

35.胰岛素的不良反应有_____, _____, 耐受性等。

四、名词解释(本大题共 4 小题, 每小题 2 分, 共 8 分)

- 36.第一关卡效应
- 37.药酶诱导剂
- 38.生物利用度
- 39.抗菌活性

五、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

- 40.比较吗啡与阿司匹林镇痛作用的不同点。
- 41.简述肾上腺素受体激动药的主要类型及代表药物。
- 42.简述强心甙中毒后产生的毒性反应。
- 43.简述青霉素 G 的抗菌谱。
- 44.抗菌药物通过哪几种方式发挥其抗菌作用? 举例说明。

六、论述题(本大题 12 分)

- 45.请论述有机磷酸酯类中毒的原理、表现及急性中毒的解救。