

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密★考试结束前

全国 2013 年 10 月高等教育自学考试 妇产科护理学（二）试题

课程代码：03010

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

- 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
- 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

- 我国产妇死亡原因居首位的是
A. 产后出血
B. 产褥感染
C. 妊娠合并心脏病
D. 妊娠期高血压疾病

2. 利凡诺引产的时间是
- A.妊娠 10 周内
B.妊娠 11~13 周
C.妊娠 14~27 周
D.妊娠 28~36 周
3. 胎心监护中属于晚期减速特点的是
- A.胎心率曲线下降与子宫收缩曲线上升同时发生
B.胎心率下降持续时间短, 恢复快
C.胎心率下降幅度>50bpm
D.胎心率下降后恢复缓慢
4. 某女, 35 岁, G₁P₀, 孕 38 周, 臀位, 胎儿体重估计 4000 克, 拟行剖宫产术终止妊娠, 应采取的最佳术式是
- A.古典式剖宫产术
B.腹膜外剖宫产术
C.子宫体部剖宫产术
D.子宫下段剖宫产术
5. 关于输卵管通畅检查, 下列描述正确的是
- A.应在月经干净后 3~7 天内进行检查
B.术后保持外阴清洁, 禁止性生活 4 周
C.术后应至少观察 2 小时, 无异常方可回家休息
D.缓慢推入 5ml 生理盐水无阻力, 提示输卵管通畅
6. 关于产褥感染, 下列描述正确的是
- A.由病毒感染所致
B.主要是外源性感染
C.指导患者取半坐卧位休息
D.感染症状一般在产后 2 周出现
7. 全子宫切除术后患者可开始性生活及盆浴的时间是
- A.6 周
B.8 周
C.10 周
D.12 周
8. 关于产后出血行宫腔填塞的治疗, 下列描述正确的是
- A.填塞 48 小时后应取出纱布条
B.使用无菌纱布条不会增加感染的机会
C.填塞纱布条时不宜紧密, 以免组织坏死
D.子宫全部松弛无力, 缺乏血源, 病情危急时可考虑该治疗方法
9. 妇科腹腔镜手术术前准备不包括
- A.清洁灌肠
B.清洁脐部
C.禁食禁水
D.监测体温
10. 关于胎儿窘迫的病理生理变化, 下列描述正确的是
- A.胎心监护主要表现为可变减速
B.缺氧早期可出现代谢性酸中毒
C.缺氧早期可使胎儿皮质醇分泌降低
D.缺氧持续加重可兴奋胎儿迷走神经

11. 下列患者术后宜采取半卧位的是
- A. 处女膜闭锁切开术
B. 外阴癌根治术
C. 阴道前后壁修补术
D. 盆底修补术
12. 抢救羊水栓塞的首要措施是
- A. 抗纤溶治疗
B. 立即终止妊娠
C. 纠正凝血功能障碍
D. 改善呼吸循环功能
13. 妇科肿瘤脑转移患者最适宜的给药方式是
- A. 静脉给药
B. 肌内注射
C. 鞘内注射
D. 动脉插管
14. 某孕妇, 孕 35 周, 主诉 1 小时前阴道有流水。查体: 胎头未衔接, 胎心正常, 无宫缩。阴道流出液酸碱度检查 PH 试纸显示为碱性。护士嘱孕妇应绝对卧床休息, 其目的是为了预防
- A. 出血
B. 感染
C. 脐带脱垂
D. 羊水栓塞
15. 妇科肿瘤体外照射常用的放射源是
- A. ^{192}Ir
B. ^{60}Co
C. ^{137}Cs
D. ^{226}Ra
16. 用于判断单纯扁平骨盆的外测量径线是
- A. 对角径
B. 骶耻外径
C. 坐骨结节间径
D. 坐骨棘间径
17. 目前诊断子宫内膜异位症的最佳方法是
- A. 腹腔镜检查
B. CA125 测定
C. 激素测定
D. B 型超声检查
18. 关于妊娠合并急性病毒性肝炎, 下列描述错误的是
- A. 孕早期应终止妊娠
B. 孕晚期应预防妊娠期高血压疾病
C. 分娩期应缩短第二产程
D. 产褥期应用抗生素预防感染
19. 子宫内膜异位症最好发的部位是
- A. 腹膜
B. 卵巢
C. 宫骶韧带
D. 子宫直肠陷凹
20. 妊娠合并心脏病, 心功能 III 级的诊断标准是
- A. 体力活动明显受限, 或既往有心衰病史
B. 休息状态下即出现心衰症状
C. 一般体力活动稍受限制
D. 一般体力活动不受限制

多涂、少涂或未涂均无分。

31. 关于妇科腹部手术术后的出院指导, 下列描述正确的是
- A. 术后 1~2 周阴道有少量粉红色分泌物应立即就诊
 - B. 伤口拆线后出现红肿硬结应立即就诊
 - C. 子宫肌瘤剔除术后 2 个月禁性生活
 - D. 伤口拆线 1 周后可洗盆浴
 - E. 术后 6 周来医院复诊
32. 侵蚀性葡萄胎的病理表现是
- A. 子宫表面可见紫蓝色结节
 - B. 增生的滋养细胞呈团块状
 - C. 增生的滋养细胞有坏死
 - D. 显微镜下未见绒毛结构
 - E. 滋养细胞可侵入血管
33. 关于胎动计数, 下列描述正确的是
- A. 缺氧的早期胎动次数增加
 - B. 缺氧严重时胎动逐渐减弱
 - C. 正常时每小时胎动约 10 次
 - D. 胎动消失 6 小时后胎心音消失
 - E. 胎动 < 10 次 / 12 小时, 提示胎儿缺氧
34. 对不协调性子宫收缩乏力者, 下列护理措施正确的是
- A. 按医嘱给予哌替啶或吗啡肌注
 - B. 增加缩宫素点滴浓度加强宫缩
 - C. 鼓励家属陪伴产妇, 稳定其情绪
 - D. 指导产妇宫缩时作深呼吸, 减轻疼痛
 - E. 若发生胎儿窘迫应及时通知医生, 并做好剖宫产术准备
35. 关于妊娠期糖尿病妇女的护理, 下列描述正确的是
- A. 治疗糖尿病应首选饮食治疗
 - B. 尿糖是诊断糖尿病的主要依据
 - C. 血糖可作为日常监测的观察指标
 - D. 适当运动可提高机体对胰岛素的敏感性
 - E. 可选用适宜的口服降糖药治疗

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、名词解释题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

36. 前置胎盘
37. 高危妊娠
38. 不孕症
39. 直肠—腹部诊
40. 避孕

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

41. 简述围绝经期综合征激素替代疗法的绝对禁忌证。
42. 简述妇科腹部手术患者术后排尿的观察及护理。
43. 简述晚期产后出血患者的护理措施。
44. 简述先兆子宫破裂患者的护理措施。
45. 简述遗传咨询的注意事项。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

46. 某女，60 岁，卵巢癌术后，使用顺铂和环磷酰胺静脉化疗 3 个疗程后出现皮肤瘀斑，出血，牙龈出血。

根据以上资料，请回答：

- (1)该患者可能出现的化疗副反应（2 分）。
- (2)针对该化疗副反应的护理措施（8 分）。

47. 某孕妇，25 岁，孕 36 周，因乘坐的公共汽车急刹车后，突感剧烈腹痛难忍，急诊入院。查体：血压 120/80mmHg。妇科检查：阴道无流血，子宫似足月妊娠大小，硬如板状，压痛明显，胎位不清，胎心约 90 次 / 分。

根据以上资料，请回答：

- (1)该患者最可能的医疗诊断（2 分）。
- (2)该类患者的护理措施（8 分）。