

内科学(二)试题

课程代码:02925

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 慢性支气管炎的诊断标准中,咳嗽、咳痰的时间规定是
 - A. 每年发病至少 2 个月,持续 1 年以上
 - B. 每年发病至少 2 个月,持续 2 年以上
 - C. 每年发病至少 3 个月,持续 2 年以上
 - D. 每年发病至少 1 个月,持续 3 年以上
2. 肺脓肿发病的最主要原因是
 - A. 吸入性肺脓肿
 - B. 继发性支气管扩张
 - C. 继发性支气管肺癌
 - D. 食管穿孔感染穿破至肺形成肺脓肿
3. 下列哪一个选项是阻塞性肺气肿的特点
 - A. 多发生于青年人
 - B. 有紫绀
 - C. 咳嗽较轻
 - D. 痰量大、粘液脓性
4. 下列哪一项为外源性哮喘的临床表现
 - A. 过敏原皮试阴性
 - B. IgE 正常
 - C. 多发于老年
 - D. 间歇性发作

5. 下列各类型心绞痛中,属于劳累型心绞痛的是

- A. 卧位型心绞痛
- B. 变异型心绞痛
- C. 梗死后心绞痛
- D. 恶化型心绞痛

6. 发生心肌梗塞的最先出现的症状是

- A. 心律失常
- B. 低血压和休克
- C. 疼痛
- D. 呼吸困难,疼痛

7. 下列心脏疾病中宜采用洋地黄类药物治疗的是

- A. 预激综合征合并心房颤动
- B. 伴有心房颤动而心室率快速的重度收缩性心力衰竭
- C. 病态窦房结综合征
- D. 单纯舒张性心力衰竭伴流出道梗阻

8. 急性心肌梗死时,出现室早或室性心动过速,选用

- A. 阿托品
- B. 普萘洛尔
- C. 维拉帕米
- D. 利多卡因

9. 肝癌最常见的转移途径是

- A. 肝内血行转移
- B. 肝外血行转移
- C. 直接蔓延
- D. 淋巴转移

10. 男,26岁。间断右上腹部疼痛半年。半年来反复右上腹疼痛,饭前明显,进食可减轻,有夜间间痛,并有反酸、嗝气。体检:腹部软,右上腹轻度压痛,未触及包块,肝脾未触及。诊断为

- A. 慢性胃炎
- B. 慢性胆囊炎
- C. 十二指肠溃疡
- D. 慢性胰腺炎

11. 有关急性水肿性胰腺炎,下列哪一项是错误的

- A. 胰腺肿大,质地结实
- B. 可见轻度黄疸
- C. 腹痛多3-5天后缓解
- D. 多数病人可能发生休克

12. 抗 HBs(+),抗 HBe(-),抗 HBc(-),说明

- A. 乙肝病毒携带状态
- B. 乙肝病毒复制
- C. 曾感染乙肝病毒,已产生保护性抗体
- D. 有传染性

13. 重度萎缩性胃体胃炎患者表现为

- A. 胃酸明显减少
- B. 胃酸明显增高
- C. 胃酸轻度升高
- D. 胃酸轻度减少

14. 诊断急性肾衰可靠的指标是
- A. 血肌酐骤升
B. 少尿
C. 尿钠 $>20\text{mmol/L}$
D. 血尿素氮骤增
15. 某青年女性, 月经增多, 疑有缺铁性贫血, 下列哪项对诊断最有意义
- A. 血清铁降低
B. 总铁结合力增高
C. 游离原卟啉降低
D. 血清铁蛋白降低
16. 下列哪一项不是铁粒幼细胞性贫血的特点
- A. 未饱和铁结合力降低
B. 转铁蛋白饱和度降低
C. 总铁结合力降低
D. 血清铁蛋白上升
17. 糖尿病性血管病变, 最具有特征性的是
- A. 脑血管病变
B. 微血管病变
C. 合并高血压
D. 周围动脉硬化一下肢坏疽
18. 对糖尿病的诊断最有意义的是
- A. 多饮、多尿、多食
B. 消瘦
C. 血糖升高
D. 尿糖阳性
19. 有关类风湿关节炎的治疗, 以下哪项不正确
- A. 非甾体抗炎药物不宜联合应用
B. 非甾体抗炎药物常有胃肠道反应
C. 应常规使用激素治疗
D. 必要时可用手术治疗
20. 与慢性胃炎和消化性溃疡有密切关系的病原菌为
- A. 空肠弯曲菌
B. 幽门螺杆菌
C. 胎儿弯曲菌
D. 鼠伤寒沙门菌

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 11 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

21. 慢性肾衰患者应依据 GFR 决定蛋白质摄入量。并尽可能减少 _____ 蛋白摄入。
22. 消化性溃疡的并发症有大量出血、_____、_____、和_____。
23. 抗甲状腺药物可分为 _____、_____ 两类, 每一类代表药物为 _____、_____。
24. 急性胃炎内镜检查可见胃黏膜 _____、_____、_____、_____ 等一过性病变。
25. 引起血小板减少的疾病不见于_____。
26. _____ 计数 $<20 \times 10^9 / \text{L}$ 可见于急性再生障碍性贫血。

27. _____ 关节炎无晨僵及对称性多关节炎症状。
28. 非甾体抗炎药引起急性胃炎的主要机制是抑制 _____ 合成。
29. 高血压急症时必须迅速使血压降低,首选 _____ 最为适宜,静脉给药可随时根据血压调整药物剂量。
30. 女,45岁,右上腹绞痛,查体:皮肤、巩膜未见黄染,辅助检查:腹部超声示胆总管结石,血清总胆红素 $26\mu\text{mol/L}$ 。该患者行血胆红素测定时,可出现 _____、_____。
31. 腹泻至少超过 _____ 个月,称为慢性腹泻。

三、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分)

32. 阻塞性肺气肿
33. 高血压危象
34. 缺铁性贫血
35. 门脉高压性胃病
36. Graves 病

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

37. 试述肺心病的诊断标准。
38. 心力衰竭的常见诱因。
39. 简述甲亢危象的治疗。
40. 简述肝硬化的并发症有哪些?

五、案例题(本大题共 20 分)

41. 男性,28岁,发热、咳嗽、右胸背痛 18 天,18 天前劳累后出现干咳,午后低热,体温波动于 $37.6\sim 38.4^{\circ}\text{C}$,一周后咳黄痰数口,痰中偶有血丝,同时伴有胸痛,深吸气及咳嗽时胸痛加重。经青霉素静脉点滴后,痰量略有减少,但低热,胸痛缓解不明显。发病以来食欲不振、二便正常,睡眠尚可,盗汗,体重下降 2Kg。既往体健,吸烟 10 余年,20 支/日。查体: $T37.5^{\circ}\text{C}$, $P84$ 次/分, $R23$ 次/分, $BP120/70\text{mmHg}$,神志清,消瘦,粘膜无出血点。浅表淋巴结不大,巩膜无黄染,口唇无紫绀。右肩胛间区叩浊音,呼气末可闻及少量的湿性啰音。心界不大,心率 84 次/分,律齐。腹平软,肝脾肋下未触及,下肢不肿。辅助检查:胸片示右上肺纤维索条状影,右肺下叶背段可见一空洞,内壁欠光滑,有液平,空洞周围有渗出影。血 $WBC10.2\times 10^9/L$, $N78\%$, $Hb132\text{g/L}$ 。

请回答:

- (1)初步的医疗诊断是什么?
- (2)诊断依据是什么?
- (3)进一步需要什么检查?
- (4)治疗原则是什么?