

# 外科护理学(二)试题

课程代码:03203

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

## 选择题部分

### 注意事项

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

### 一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 不属于老年人患病特点的是  
A. 常伴发多种疾病  
B. 应激能力差  
C. 疾病表现更典型  
D. 并发症多
2. 致病菌扩散后可能导致颅内化脓性海绵状静脉窦炎的是  
A. 唇痈  
B. 背部痈  
C. 丹毒  
D. 颌下蜂窝织炎
3. 呼吸道烧伤的最严重后果是  
A. 休克  
B. 疼痛  
C. 感染  
D. 窒息
4. 关于 MODS 的描述不正确的是  
A. SIRS 可能是最主要的原因  
B. 出现高心输出量和低外周阻力  
C. 最早出现肾功能衰竭  
D. 早期出现肺毛细血管内皮损伤
5. 甲状腺功能亢进病人术前服用复方碘化钾溶液的目的是  
A. 降低基础代谢率  
B. 预防术中心律失常  
C. 抑制甲状腺素合成  
D. 预防术后手足抽搐
6. 乳腺癌病人最常见的临床表现是  
A. 乳头凹陷  
B. 无痛性肿块  
C. 橘皮样改变  
D. 两侧乳头位置不对称
7. 男性,76 岁,因乙状结肠扭转急诊入院,提示其可能发生肠绞窄的表现是  
A. 阵发性腹痛  
B. 呕吐血性液  
C. 肛门不排气  
D. 腹胀加重

8. 男性, 45 岁, 进行性消瘦、贫血、乏力, 右下腹可触及肿块, 大便潜血试验阳性, 该病人最可能的诊断是
- A. 直肠癌  
B. 结肠息肉  
C. 结肠癌  
D. 慢性痢疾
9. 不适合做腹腔镜胆囊切除术的是
- A. 胆管结石  
B. 慢性胆囊炎  
C. 胆囊息肉  
D. 单纯的胆囊结石
10. 胰腺疾病和胆道疾病互相关联的解剖基础是
- A. 胆总管和胰腺导管均开口于十二指肠内侧壁  
B. 胰腺有副胰管和胆总管相通  
C. 胰腺导管开口于胆总管开口之下  
D. 胰腺导管和胆总管下端有共同通路或共同开口
11. 女性, 35 岁, 因严重颅脑损伤行保守治疗。提示颅内压增高的表现是
- A. 血压降低, 心率加快  
B. 心率减慢, 血压增高  
C. 血压降低, 呼吸加快  
D. 心率减慢, 呼吸加快
12. 不符合脑震荡的临床表现是
- A. 意识障碍超过 30 分钟  
B. 逆行性遗忘  
C. 头痛、恶心  
D. 神经系统检查无阳性体征
13. 可出现“纵隔摆动”的气胸类型是
- A. 自发性气胸  
B. 闭合式气胸  
C. 开放性气胸  
D. 张力性气胸
14. 护士在给一肺癌病人输液时, 发现其右上肢静脉充盈, 肿胀, 病人主诉右上肢疼痛伴活动障碍, 该病人可能存在
- A. 右上肢有癌转移  
B. 肺癌的肺外表现  
C. 上叶顶部肺癌  
D. 其他器官的癌症
15. 为预防尿路结石复发, 需要酸化尿液的是
- A. 草酸盐结石  
B. 尿酸结石  
C. 黄嘌呤结石  
D. 胱氨酸结石
16. 老年男性出现尿潴留最常见的原因是
- A. 尿道狭窄  
B. 膀胱结石  
C. 膀胱肿瘤  
D. 前列腺增生
17. 膀胱癌的好发部位是
- A. 两侧壁及后壁  
B. 三角区  
C. 颈部  
D. 前壁
18. 下肢牵引时抬高床尾的主要目的是
- A. 减轻患肢疼痛  
B. 设置对抗力量  
C. 促进患肢血液循环  
D. 便于观察肢端情况
19. 被动外展或内收小腿, 通过小腿活动范围以及膝盖侧方是否疼痛来判断侧副韧带断裂, 此检查为
- A. 抽屉试验  
B. 侧方推挤试验  
C. 旋转挤压试验  
D. 浮髌试验
20. 女性, 45 岁, 从椅子上跌落造成腰椎压缩骨折, 拟采取非手术治疗, 该病人宜取的体位是
- A. 头颈过伸位  
B. 脊柱过伸位  
C. 患侧卧位  
D. 头高脚低位

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 属于特异性感染的是
- A. 脓毒症
  - B. 痈
  - C. 丹毒
  - D. 破伤风
  - E. 气性坏疽
22. 预防肠内营养支持病人出现吸入性肺炎的主要措施有
- A. 床头抬高 30°
  - B. 输入营养液时逐渐增加容量、速度
  - C. 定期检查胃内残留量
  - D. 可利用夜间休息时加快灌注速度
  - E. 尽量采用分次投给方法
23. 在心肺脑复苏中，高级生命支持内容包括
- A. 机械人工呼吸
  - B. 使用复苏药物
  - C. 低温治疗
  - D. 心电监护
  - E. 脱水治疗
24. 关于烧伤后补液的叙述正确的是
- A. 补液多少按烧伤总面积计算
  - B. 第 1 个 24 小时，成人每公斤体重，每 1% 烧伤面积补晶体液和胶体液 1.5ml
  - C. 成人还应补充每日所需水分 2000ml
  - D. 第 2 个 24 小时给第一个 24 小时胶体液和晶体液的半量
  - E. 第 3 个 24 小时，烧伤面积小于 50% 者，可不用再补充胶体液
25. 肋骨骨折病人疑有腹腔脏器损伤时的处理方法正确的是
- A. 立即注射止痛剂
  - B. 不做特殊处理，继续观察
  - C. 建立静脉通路
  - D. 进行腹部检查
  - E. 嘱病人卧床，减少活动
26. 急性胆囊炎的临床表现有
- A. 恶心呕吐
  - B. 疼痛
  - C. 发热
  - D. 黄疸
  - E. 便血
27. 提示颅脑损伤病人出现颅内压增高迹象的表现包括
- A. 血压上升
  - B. 体温升高
  - C. 瞳孔缩小
  - D. 脉搏缓慢
  - E. 呼吸深慢
28. 女性，55 岁，早期肺癌病人，该病人临床表现中与癌肿分泌内分泌物质相关的是
- A. 杵状指
  - B. 肌肉疼痛
  - C. 满月脸
  - D. 面部无汗
  - E. 恶液质表现

29. 全膀胱切除术后引流管的护理正确的是
- A. 输尿管支架管一般术后 1 周拔除
  - B. 回肠膀胱内引流管术后 2~3 天拔除
  - C. 回肠膀胱内引流管引流液为肠液和尿液
  - D. 观察引流量的颜色
  - E. 尿管拔除后嘱病人多饮水

30. 骨折病人的专有体征包括

- A. 畸形
- B. 疼痛和压痛
- C. 反常活动
- D. 骨擦音/骨擦感
- E. 功能障碍

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 三、名词解释（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

- 31. 人工气道
- 32. 浸润性突眼
- 33. 酒窝征
- 34. 急性胰腺炎

### 四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

- 35. 避免破伤风病人抽搐发生的护理措施有哪些？
- 36. 简述结肠癌术前肠道准备的方法。
- 37. 试述门静脉高压症病人行分流术和断流术的优缺点。
- 38. 简述胸腔闭式引流置管期间的护理要点。

### 五、病例分析题（本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

39. 男性，45 岁，因十二指肠溃疡穿孔行毕 II 式胃大部切除术。术后第 7 天，病人在餐后约 15 分钟出现上腹不适，恶心、肠鸣，继而腹泻数次，并伴心慌、出汗、乏力、面色苍白，平卧 20 分钟后逐渐缓解。问：
- (1) 该病人出现什么问题？原因是什么？
  - (2) 应该如何预防和处理？

40. 女性, 76 岁, 右侧额部撞伤后 4 小时, 意识障碍进行性加重, 肢体无自主活动。查体: 右侧瞳孔 6 mm, 对光反应消失, 左侧 3 mm, 对光反应迟钝。脉搏 120 次/分, 呼吸 20 次/分, 血压 150/70 mmHg, 体温 37.2 °C。意识不清, 呼之不应, 压眶上神经无反应, 双侧腱反射可对称引出, 左侧巴氏征 (+), 右侧巴氏征 (-)。辅助检查: 头颅 CT 示慢性硬脑膜下血肿, 右额叶广泛脑挫裂伤。

问: (1) 该病人目前意识状态如何?

(2) 目前是否存在需要紧急处理的问题?

(3) 判断依据是什么?

(4) 目前的处理措施有哪些?

www.zikao365.com