

全国 2015 年 4 月高等教育自学考试
妇产科护理学(一)试题
课程代码:03002

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 中骨盆最重要的径线是
A. 对角径 B. 髂棘间径 C. 坐骨棘间径 D. 坐骨结节间径
2. 关于产褥期妇女的临床表现,下列描述正确的是
A. 褥汗在白天较明显,产后一周内自行好转
B. 乳房会出现胀痛,乳汁分泌不足等现象
C. 恶露依次为浆液性、血性及白色恶露
D. 产后第 1 天宫底降至脐下两横指
3. 葡萄胎术后要求随访的时间至少是
A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 D. 4 年
4. 某女,25 岁,因膀胱炎自行口服抗生素 1 个月,出现阴道瘙痒、烧灼感,并伴有白色粘稠分泌物,下列最佳的治疗药物是
A. 甲硝唑 B. 红霉素 C. 氟康唑 D. 氢化可的松
5. 诊断骨盆出口狭窄的指标是坐骨结节间径小于
A. 7.0cm B. 7.5cm C. 8.0cm D. 8.5cm
6. 口腔溃疡作为常见的化疗不良反应,多发生在用药后
A. 1~2 天 B. 3~4 天 C. 5~6 天 D. 7~8 天

7. 关于正常妊娠早期的临床表现, 下列描述正确的是
- A. 妇科查体有黑加征
B. 子宫底高度达脐耻之间
C. 孕妇自感胎动
D. 孕妇易出现仰卧位低血压综合征
8. 关于输卵管通液术的护理, 下列描述错误的是
- A. 应在月经前 3~7 天内进行
B. 输卵管黏膜轻度粘连者可行手术
C. 术后观察 30 分钟, 无异常者可回家休息
D. 注意外阴清洁, 2 周内禁止性生活及盆浴
9. 新生儿 Apgar 评分的五项体征是
- A. 心率、呼吸、体重、哭声、皮肤颜色
B. 心率、哭声、喉反射、体重、肌张力
C. 心率、呼吸、肌张力、喉反射、皮肤颜色
D. 心率、呼吸、体重、哭声、肌张力
10. 关于妇科术后患者的出院教育, 下列描述正确的是
- A. 伤口拆线一个月后可沐浴
B. 首次随诊时间为术后六个月
C. 阴道手术后患者应禁性生活 2~3 个月
D. 全子宫切除术后 7~14 天内阴道有少量粉红色分泌物即刻就诊
11. 胎头颅骨的组成包括
- A. 两块顶骨、两块额骨、两块颞骨和一块枕骨
B. 一块顶骨、两块额骨、两块颞骨和两块枕骨
C. 一块顶骨、两块额骨、两块颞骨和一块枕骨
D. 两块顶骨、两块额骨、两块颞骨和两块枕骨
12. 妇科肿瘤化疗中, 最常见和最严重的不良反应是
- A. 消化道反应
B. 造血功能障碍
C. 免疫抑制
D. 心脏损伤
13. 糖尿病产妇的胎儿出生后易发生
- A. 贫血
B. 低血糖
C. 低蛋白血症
D. 红细胞减少症
14. 关于药物避孕的健康指导, 下列描述正确的是
- A. 糖衣片的避孕药一旦潮解, 则影响疗效不宜服用
B. 复方短效口服避孕药若漏服则要重新开始另外一个疗程
C. 母乳喂养的妇女尚未行经者, 可按照常规任选一天开始服药
D. 服用长效避孕药物者, 如欲改用其他避孕方法, 在当月停药即可
15. 应用硫酸镁治疗妊娠高血压疾病, 出现中毒症状时首选的解救药物是
- A. 阿托品
B. 氯化钾
C. 碳酸氢钠
D. 葡萄糖酸钙

16. 不属于女性内生殖器邻近器官的是
A. 阑尾 B. 尿道 C. 输尿管 D. 结肠
17. 某女士，30岁，孕1产0，妊娠37周时腹部遭受重物碰撞后出现剧烈腹痛及阴道出血。检查：血压90/60mmHg，子宫似足月妊娠大小，有压痛，胎心90次/分，应首先考虑的医疗诊断是
A. 前置胎盘 B. 胎盘早剥
C. 先兆早产 D. 凝血功能障碍
18. 关于子宫内膜不规则脱落，下列描述正确的是
A. 月经周期正常，经期缩短 B. 月经周期缩短，经量增多
C. 月经周期正常，经期延长 D. 月经周期缩短，经量减少
19. 妊娠合并子宫肌瘤患者，最常见的肌瘤变性是
A. 玻璃样变 B. 囊性变 C. 肉瘤变 D. 红色变性
20. 放置产钳时，当胎儿为臀位，胎体娩出后，为协助娩出胎头可使用
A. 低位产钳 B. 中位产钳 C. 高位产钳 D. 后出头产钳
21. 子宫内膜癌病变多发生于
A. 子宫底部 B. 子宫颈部 C. 子宫峡部 D. 子宫下段
22. 关于正常新生儿出生后24小时内的护理措施，下列描述错误的是
A. 以仰卧位较好 B. 采取保暖措施
C. 密切观察呼吸和面色 D. 观察脐带有无渗血
23. 在卵巢功能测定中，下列最为简便的是
A. 基础体温测定 B. 宫颈粘液涂片检查
C. 阴道细胞学检查 D. 诊断性刮宫
24. 关于胎儿附属物，下列描述错误的是
A. 胎盘由底蜕膜、叶状绒毛膜和羊膜构成
B. 妊娠足月胎盘重450~650g
C. 胎膜由绒毛膜和羊膜构成
D. 脐带内有动、静脉各2条
25. 关于慢性子宫颈炎病理表现，下列描述错误的是
A. 子宫颈肥大 B. 子宫颈息肉
C. 子宫颈腺体囊肿 D. 子宫颈陈旧裂伤

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 15 空, 每空 1 分, 共 15 分)

26. 目前对妇女生命威胁最大的妇科肿瘤是_____恶性肿瘤。
27. 临产后, 分娩的主要力量是_____力。
28. 正常新生儿具有的觅食、吸吮、吞咽、拥抱、握持等反射, 属于_____反射。
29. 根据手术途径, 妇科手术分为腹腔镜手术、开腹手术和_____手术。
30. 功能失调性子宫出血的一线治疗是_____治疗。
31. 产道分为_____产道和_____产道两部分。
32. 胎儿酸中毒时, 胎儿头皮血气指标为: pH $<$ 7.2; 氧分压_____, 二氧化碳分压升高。
33. 婴儿吸吮乳头时, 可刺激产妇垂体前叶阵发性释放_____, 而促进乳汁分泌。
34. 输卵管妊娠的三个主要症状是停经、_____及腹痛。
35. 子宫颈癌的病理变化以_____癌为主。
36. 妇科肿瘤化疗时, 当血小板低于_____ $\times 10^9/L$, 即提示有潜在的出血。
37. 胎盘附着面复旧不全而导致的晚期产后出血, 临床表现为产后_____余日发生阴道流血。
38. 外阴阴道假丝酵母菌病可用 2%~4%碳酸氢钠溶液冲洗阴道, 以改变阴道内_____。
39. 盆腔检查时, 检查者一手示指伸入直肠, 另一手在腹部配合检查称为_____。

三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

40. 宫颈糜烂
41. 恶露
42. 接触性出血
43. 产褥病率
44. 继发性闭经

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

45. 简述维持子宫正常位置的韧带及各自的功能。
46. 简述预防妊娠中晚期腰背痛的主要方法。
47. 简述放置宫内节育器术后注意事项。

48. 简述第三产程胎盘剥离的征象。

49. 简述子宫肌瘤常见的临床表现。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

50. 某孕妇，孕 1 产 0，28 岁，孕 37 周，患有先天性心脏病。产前检查：骨盆、胎位正常，胎儿体重估计 3000 克，胎心 155 次/分，有不规律子宫收缩，胎膜未破，宫颈管消失但宫口未开，孕期未出现心衰体征。目前该孕妇一般体力活动略受限制，活动后有疲劳、心悸、气急等症状，经休息后好转。

根据以上资料，请回答：

(1) 该孕妇心功能分级（2 分）。

(2) 该孕妇在分娩期的处理措施（8 分）。

51. 某女，38 岁，因“阴道不规则流血 20 天，伴咳嗽、咯血 1 周”入院。患者半年前行人流术，术中见绒毛组织，术后 1 个月月经恢复正常。近 20 天无诱因出现间断少量阴道流血至今，尿妊娠试验阳性，门诊 B 超检查子宫增大，肌层可见高回声团块，血流丰富。胸片右肺可见团块状影。

根据以上资料，请回答：

(1) 患者可能的医疗诊断（2 分）。

(2) 患者病变的转移部位（2 分）。

(3) 对该类患者病变转移部位的护理措施（6 分）。