

全国 2016 年 4 月高等教育自学考试

内科护理学(二)试题

课程代码 :03202

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 患者，男性，40 岁，因“支气管哮喘”入院，经治疗后好转出院。责任护士指导患者在哮喘急性轻度发作时，控制发作正确的措施是
 - 口服布地奈德
 - 吸入布地奈德
 - 口服沙丁胺醇
 - 吸入沙丁胺醇
2. 患者，男性，25 岁，因 2 天前受凉后出现高热，咳嗽、咳痰加重，痰液为铁锈色，胸部 X 线检查示肺部片状阴影，诊断为肺炎。则该患者目前最可能的致病菌是
 - 肺炎链球菌
 - 肺炎克雷白杆菌
 - 肺炎杆菌
 - 军团菌
3. 下列因素中，可诱发或加重慢性心力衰竭症状的是
 - 腹泻
 - 低钠血症
 - 长期卧床
 - 心房颤动

12. 对慢性再障疗效较好的药物为

- A. 抗淋巴细胞球蛋白
- B. 抗胸腺细胞球蛋白
- C. 重组人粒系集落刺激因子
- D. 雄激素

13. 类风湿关节炎所致疼痛最常出现的部位是

- A. 腕、掌指关节，近端指关节
- B. 肘关节
- C. 足趾、踝关节
- D. 肩关节、髋关节

14. 脑血栓形成最常见的病因是

- A. 高血压
- B. 糖尿病
- C. 动脉粥样硬化
- D. 高血脂

15. 以粪—口传播为主要传播途径的病毒性肝炎类型是

- A. 甲型、戊型肝炎
- B. 乙型肝炎
- C. 丙型肝炎
- D. 丁型肝炎

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16. 护士对慢性阻塞性肺疾病患者进行的呼吸训练指导中正确的是

- A. 开始训练时取半卧位
- B. 呼气时缩拢嘴唇，同时腹部鼓起
- C. 经鼻吸气，同时腹部收缩
- D. 呼气与吸气的时间比为 2:1
- E. 每分钟呼吸 10 次左右

17. 护士对肺结核咯血患者的护理措施正确的是

- A. 安慰患者放松心情
- B. 健侧卧位以保持呼吸道通畅
- C. 咯血时将积血轻轻咯出，不可屏气
- D. 患者咯血突然中止且表情紧张提示窒息
- E. 一旦窒息，立即置患者于仰卧头高脚低位

18. 造成全身血容量增多而引起慢性心力衰竭的基本病因包括

- A. 冠心病
- B. 慢性贫血
- C. 甲状腺功能亢进
- D. 肺动脉高压
- E. 心肌炎

19. 患者，男性，71岁。确诊慢性右心功能不全3年。该患者因体循环淤血导致的常见临床症状及体征有
- A. 咳嗽、咳痰 B. 水肿
C. 食欲不振 D. 咯血
E. 颈静脉怒张
20. 高血压非药物治疗包括
- A. 限制钠摄入 B. 减轻体重
C. 适量运动 D. 保持心理平衡
E. 高热量高蛋白饮食
21. 目前消化性溃疡已知的主要病因包括
- A. 吸烟 B. 遗传
C. 幽门螺杆菌感染 D. 应激和精神因素
E. 服用非甾体类抗炎药
22. 慢性肾衰竭患者的饮食护理措施中正确的是
- A. 优质高蛋白饮食 B. 限制碳水化合物的摄入
C. 主食以大米为佳 D. 控制水盐的摄入
E. 控制磷和钾的摄入
23. 下列关于肾病综合征并发症的叙述正确的是
- A. 感染是常见的并发症
B. 感染是疾病复发和疗效不佳的主要原因之一
C. 血栓与肾病综合征患者的血液高凝状态有关
D. 肾动脉血栓最多见
E. 一般不会发生急性肾衰竭
24. HIV病毒感染人体后进展至艾滋病期患者除前期表现外，还可出现的临床表现包括
- A. 机会性感染 B. 慢性腹泻
C. 淋巴结肿大 D. 卡氏肉瘤
E. 长期低热
25. 可引起狂犬病患者咽肌痉挛的刺激包括
- A. 水 B. 光
C. 风 D. 冷
E. 声

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题（本大题共 20 小题，每空 1 分，共 20 分）

26. 慢性阻塞性肺疾病患者采用长期家庭氧疗（LTOT）的主要指征是 $\text{PaO}_2 < \underline{\hspace{2cm}}$ mmHg。
27. 医院获得性肺炎指患者入院时不存在、也不处于潜伏期，而于入院后 $\underline{\hspace{2cm}}$ 小时后在医院内发生的肺炎。
28. 肺血栓栓塞症最常见的症状是不明原因的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 及气促，尤以活动后明显。
29. 心力衰竭早期常是一侧性的，临床多见先为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 心衰竭，而后发展波及另一侧，从而出现全心衰竭。
30. 急性肺水肿患者体位应取 $\underline{\hspace{2cm}}$ 位，以减少静脉回流。
31. 对鉴别有无心肌坏死存在有重要意义的心肌损伤标记物检查是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 及磷酸肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定。
32. 患者心绞痛发作频繁、程度加重、持续时间延长、服用硝酸甘油后疼痛持续 15 分钟不缓解，伴出冷汗等，应警惕 $\underline{\hspace{2cm}}$ 发生，立即就诊。
33. 胃黏膜层内的壁细胞分泌的内因子可促进 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的吸收。
34. 消化性溃疡最常见的并发症是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
35. 重症急性胰腺炎的营养支持非常重要，早期多选用 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，以减少胰腺分泌、减轻胃肠道负担，并达到补充代谢的需要。
36. 肾盂肾炎最常见的感染途径是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 感染。
37. 慢性肾小球肾炎患者应积极控制高血压，血压应控制在 $\underline{\hspace{2cm}}$ mmHg 以下。
38. 多饮水，勤 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，是预防尿路感染简单而有效的措施。
39. 弥散性血管内凝血临床最常见的早期表现是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
WWW.Zikao365.com
40. 系统性红斑狼疮患者血液中可查到多种自身抗体，最常见的有临床意义的自身抗体包括 $\underline{\hspace{2cm}}$ 、抗磷脂抗体、抗组织细胞抗体。
41. 有机磷中毒死因主要为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，其原因是肺水肿、呼吸肌麻痹及呼吸中枢抑制所致。
42. 预防脑血管病发生最重要的环节是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
43. 癫痫临床表现中全面性强直-阵挛发作(也称大发作)是最常见的发作类型之一，发作分为三期：强直期、 $\underline{\hspace{2cm}}$ 、惊厥后期。
44. 肾综合征出血热亦称流行性出血热，是由汉坦病毒引起的自然疫源性疾病， $\underline{\hspace{2cm}}$ 为主要传染源。
45. 霍乱的主要传染源是患者及 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

四、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 46. 呼吸衰竭
- 47. 心律失常
- 48. 急性胰腺炎
- 49. 肾盂肾炎
- 50. 甲状腺功能减退症

五、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

- 51. 简述护士依据美国 NYHA 心功能分级对慢性心力衰竭患者休息与活动的指导原则。
- 52. 简述护士针对消化性溃疡致上消化道少量出血患者的饮食指导内容。
- 53. 简述护士对糖尿病患者有无糖尿病足危险因素的评估要点。
- 54. 简述热射病主要临床表现及降温措施。

六、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

55. 患者，男性，65岁，确诊“慢性阻塞性肺疾病”20余年。近半年来逐渐出现双下肢水肿。1周前，受凉后出现咳嗽、咳黄色黏痰，近2天来咳嗽、咳痰加重，并自觉呼吸困难，为治疗来院就诊。
- 入院查体：T 37.8℃，P 89次/分，R 28次/分，BP 135/80mmHg，神志清楚，对答切题，查体合作，口唇发绀，球结膜充血，双肺呼吸音粗，可闻及散在湿啰音，心率 89次/分，律齐，剑突下可闻及收缩期杂音，腹平软，肝颈回流征（+），腹部移动性浊音（-），双下肢水肿。

有关检查：心电图可见肺性 P 波；血气分析 pH 7.30，PaO₂ 55mmHg，PaCO₂ 70mmHg。
入院初步诊断为慢性阻塞性肺疾病，肺心病，呼吸衰竭。给予吸氧、抗感染等治疗。

请回答：（1）该患者诊断为“肺心病”的依据
（2）根据血气结果判断该患者呼吸衰竭的类型。
（3）写出该患者的氧疗原则和注意事项。

56. 患者，55岁，女性。一周来因牙龈出血，伴低热入院。

查体：T 37.8℃，神志清楚，面色苍白，上下牙龈弥漫少量渗血，心率 96次/分，律齐，两肺少量干湿啰音，肝肋下2指，脾未触及，双下肢无水肿。

实验室检查：白细胞 $6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞占 20%，分类可见大量幼稚细胞，血红蛋白 70g/L，血小板 $50 \times 10^9/L$ ，入院后经骨髓穿刺检查确诊为急性淋巴细胞白血病伴肺部感染。经 VP（长春新碱、泼尼松）方案化疗 5 个疗程达完全缓解，又经缓解后治疗，嘱出院，每月来院化疗 1 次。

请回答：（1）患者牙龈出血、肺部感染最主要原因。
（2）出院指导主要内容。