

绝密★启用前

2020 年 8 月高等教育自学考试全国统一命题考试

内科护理学（一）

（课程代码 02998）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 对支气管哮喘描述正确的是
 - A. 与单基因遗传有关
 - B. 是一种气道急性炎症性疾病
 - C. 表现为气道高反应性
 - D. 出现不可逆性气流受限
2. 肺癌按组织病理学分类，恶性度最高的是
 - A. 鳞癌
 - B. 腺癌
 - C. 大细胞癌
 - D. 小细胞肺癌
3. 正常成人每分钟静息通气量为
 - A. 2~4L
 - B. 4~6L
 - C. 6~8L
 - D. 8~10L
4. COPD 患者氧疗的目标为：CO₂ 留滞无明显加重，且 PaO₂ 在
 - A. 60~65mmHg
 - B. 70~75mmHg
 - C. 80~85mmHg
 - D. 90~95mmHg
5. 患者，男性，68 岁，慢性咳嗽咳痰 10 余年。1 周前着凉后咳嗽，咳大量脓痰，尤以晨起时加重，大量痰液在静置后出现分层现象。据此可初步判断该患者所患基础疾病为
 - A. 支气管哮喘
 - B. 慢性阻塞性肺疾病
 - C. 支气管扩张症
 - D. 慢性呼吸衰竭

6. 肺结核患者将痰液吐入带盖塑料容器后最佳的处理方式是
 - A. 流动水冲洗后弃去
 - B. 消毒灵浸泡后弃去
 - C. 烈日下曝晒后弃去
 - D. 连同容器直接焚毁
7. 患者，女性，76 岁，因慢性呼吸衰竭急性加重入院抢救，给予气管插管机械通气治疗。护士为该患者吸痰操作不妥的是
 - A. 吸引负压调至 100~120mmHg
 - B. 每次吸引时间不超过 15 秒
 - C. 判断为大气道有分泌物滞留时吸痰
 - D. 吸引前后给纯氧数分钟
8. 引起病毒性心肌炎最常见的病毒是
 - A. 柯萨奇病毒 A
 - B. 柯萨奇病毒 B
 - C. 埃可病毒
 - D. 流感病毒
9. 非同步直流电复律用于转复
 - A. 心房颤动
 - B. 心室颤动
 - C. 心房扑动
 - D. 室上性心动过速
10. 患者可呈现出颧赤唇绀面容的心脏瓣膜病是
 - A. 二尖瓣关闭不全
 - B. 二尖瓣狭窄
 - C. 主动脉瓣关闭不全
 - D. 主动脉瓣狭窄
11. 心肌病最常见的临床类型是
 - A. 扩张型
 - B. 肥厚型
 - C. 限制型
 - D. 未定型
12. 心脏骤停患者经心肺复苏成功后，血压维持在 80~90/50~60mmHg，给予呋塞米静脉注射后仍少尿，此时给予患者的主要处理中，不妥的是
 - A. 连续心电监护至少 48~72 小时
 - B. 进行呼吸功能监测，保持呼吸道通畅
 - C. 保证患者摄入足够的热量
 - D. 增加液体入量，防治低血钾
13. 患者，男性，71 岁，诊断慢性心力衰竭 5 年。根据美国 NYHA 心功能分级标准，患者目前的心功能分级属于 III 级，则该患者体力活动受限程度符合
 - A. 体力活动不受限
 - B. 体力活动轻度受限
 - C. 体力活动明显受限
 - D. 不能从事任何体力活动
14. 患者，男性，35 岁。体检中测量两次血压，均值为 155/95mmHg，据此可判断其血压水平分级为
 - A. 高血压一级
 - B. 高血压二级
 - C. 高血压三级
 - D. 临界高血压

15. 患者，男性，36岁。胃镜检查确诊十二指肠球部溃疡入院，医嘱予以奥美拉唑治疗。

护士应告知患者该药的作用是

- A. 直接中和胃酸，迅速缓解疼痛
- B. 促进内源性前列腺素的合成
- C. 阻止组胺与 H₂受体结合，抑制胃酸分泌
- D. 抑制 H⁺-K⁺-ATP 酶，有效减少胃酸分泌

16. 上消化道出血最常见的病因是

- A. 肝硬化食管下段静脉曲张破裂
- B. 急性胃炎
- C. 消化性溃疡
- D. 胃癌

17. 少数急性胰腺炎患者因血液、胰酶及坏死组织液穿过筋膜与肌层渗入腹壁下可在脐周皮肤出现灰紫色斑，称为

- A. Murphy 征
- B. Cullen 征
- C. Babinski 征
- D. Grey-Turner 征

18. 患者，男性，68岁，因肝性脑病收入院。医嘱予以精氨酸治疗，其目的是

- A. 使肠内呈酸性，减少氨吸收
- B. 抑制脑内假神经递质合成
- C. 为大脑提供能量
- D. 与游离氨结合，降低血氨

19. 急性肾功能衰竭病因分类中最常见的类型是

- A. 肾前性
- B. 肾后性
- C. 急性肾小管坏死
- D. 肾小球疾病

20. 严重氮质血症患者血透开始时出现头痛、恶心呕吐、抽搐，可能发生了

- A. 低血压
- B. 失衡综合征
- C. 热源反应
- D. 过敏反应

21. 确诊肾炎的最主要检查是

- A. 尿常规
- B. 血清总补体及补体 C₃
- C. 肾小球滤过率
- D. 肾活检组织病理

22. 肾脏结构中有重吸收功能的是

- A. 肾小囊
- B. 肾小体
- C. 肾小管
- D. 肾小球

23. 急性白血病患者出现牙龈出血，相关护理措施不恰当的是

- A. 牙龈局部涂抹三七粉
- B. 早晚用牙刷清理牙齿
- C. 定时用洗必泰漱口
- D. 陈旧血块可用棉签沾水擦洗去除

24. 营养性巨幼细胞贫血患者多缺乏

- A. 叶酸
- B. 铁
- C. 维生素 B₁₂
- D. 维生素 B₆

25. 关于抗凝血酶III的描述，错误的是

- A. 可溶解脏器血管内血栓
- B. 是主要的抗凝物质
- C. 直接使凝血酶失去活性
- D. 可灭活凝血过程中各凝血因子

26. 诊断贫血最重要的指标是

- A. 血红蛋白浓度
- B. 红细胞计数
- C. 红细胞压积
- D. 红细胞形态

27. 急性中毒时可使瞳孔扩大的物质是

- A. 阿托品
- B. 有机磷酸酯类
- C. 吗啡
- D. 甲醇

28. 艾滋病治疗的关键是

- A. 对症治疗
- B. 早期抗病毒治疗
- C. 支持治疗
- D. 并发症治疗

29. 伤寒最严重的并发症是

- A. 肠梗阻
- B. 肠出血
- C. 肠结核
- D. 肠穿孔

30. 患者，男性，42岁。因发热、腹泻3天，大便培养出痢疾杆菌收入院。该患者病原治疗首选的药物是

- A. 青霉素
- B. 氯霉素
- C. 环丙沙星
- D. 庆大霉素

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

31. 肺心病发生的关键环节是_____。
32. 肺炎链球菌肺炎抗生素治疗首选_____。
33. 呼吸衰竭最早出现的症状是_____。
34. 第三度房室传导阻滞患者若心室率不足 20 次/分，可出现_____综合征。
35. 右心功能衰竭患者，肝脏长期持续淤血，最终可发展为_____。
36. 休克治疗应根据血压和中心静脉压水平确定补液量，若血压低，中心静脉压小于_____cmH₂O，提示血容量不足，应大量补液。
37. 溃疡性结肠炎的主要临床表现为腹泻、粘液脓血便和_____。
38. 目前根治原发性肝癌最好的方法是_____。
39. 出血坏死型胰腺炎的局部并发症有假性囊肿和_____。
40. 肾盂肾炎最常见的致病菌是_____。
41. 我国最常见的一种贫血是_____。
42. 类风湿关节炎患者病变的关节在夜间或日间静止不动后出现较长时间的僵硬，称为_____。
43. 有机磷进入人体后迅速分布全身各脏器，以_____中浓度最高。
44. 传染病的基本特征包括：有病原体、有传染性、有流行病学特征和有_____。
45. 霍乱最常见的严重并发症是_____。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

46. 支气管扩张症
47. 发绀
48. 急性肾小球肾炎
49. 白血病
50. 中暑

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

51. 简述自发性气胸患者胸腔闭式引流的护理要点。
52. 简述急性心肌梗死患者行溶栓治疗的护理措施。
53. 简述风湿性疾病患者出现躯体移动障碍时的护理措施。
54. 简述病毒性肝炎患者病情观察的内容。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者女性，68岁，因“尿少、腹胀半月”入院。患者有肝硬化病史5年，近1月来尿量逐渐减少，食欲不佳，腹部鼓胀不适。查体：T 36.8°C，P 80次/分，R 18次/分，BP 130/80mmHg。半卧位，腹部膨隆呈蛙腹，可见腹壁静脉曲张，肝脾触诊不满意，移动性浊音阳性，双下肢凹陷性水肿。入院诊断：肝硬化腹水。

请写出：(1) 该患者目前最主要的1个护理诊断/问题。

(2) 该患者主要的护理措施。

56. 患者，女性，54岁。1年前无明显诱因出现怕热、乏力、多食易饥、体重下降，当地医院诊断为甲状腺功能亢进症，服用丙硫咪唑每天30mg后症状明显好转，自行停药。3天前出现咳嗽、咳痰，无发热，未进行诊治。5小时前出现呼吸困难，神志不清，大汗淋漓，急诊入院至ICU进行抢救。查体：T 39°C，P 150次/分，R 26次/分，BP 110/60mmHg。意识不清，皮肤潮红，左肺下部可闻及干、湿啰音，HR 150次/分，余(-)。初步诊断为甲亢危象。

请写出：(1) 导致该患者发生甲亢危象的诱因。

(2) 治疗该患者首选的药物。

(3) 该患者的主要护理措施。

