

全国 2020 年 10 月高等教育自学考试
妇产科护理学(二) 试题
课程代码:03010

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 产前诊断中,可用来观察胎儿体表畸形的的方法是
A. B 型超声检查
B. 胎儿脐血穿刺
C. 羊水穿刺
D. 基因检测
2. 妇科肿瘤患者进行放疗时,为预防放射性膀胱炎的发生,每日饮水量应
A. 不超过 1500ml
B. 1500ml~2000ml
C. 2000ml~3000ml
D. 3000ml 以上
3. 为避免早产儿发生呼吸窘迫综合征,可在分娩前给孕妇应用
A. 胰岛素
B. 利托君
C. 地塞米松
D. 硝苯地平
4. 关于妇科腹腔镜手术患者的术后护理措施,下列描述正确的是
A. 全子宫切除患者术后禁止盆浴和性生活 4 周
B. 每日用 1:40 络合碘冲洗外阴 1 次
C. 伤口拆线后即可淋浴
D. 术后常规吸氧 3 小时
5. 妊娠期高血压疾病患者治疗过程中,首选的解痉药物是
A. 地西洋
B. 硫酸镁
C. 甘露醇
D. 缩宫素

6. 关于妊娠与贫血的相互影响, 下列描述正确的是
- A. 贫血对孕妇的影响不大 B. 铁通过胎盘的转运是双向运输
C. 重度贫血会导致胎儿生长受限 D. 贫血孕妇不容易发生失血性休克
7. 子宫内膜癌患者最常见的症状是
- A. 不规则阴道流血 B. 阴道排液增多
C. 腰背部疼痛 D. 贫血
8. 胎位异常可能会导致
- A. 前置胎盘 B. 羊水过多
C. 子宫破裂 D. 巨大胎儿
9. 下列不属于软产道异常的是
- A. 外阴异常 B. 阴道异常
C. 宫颈异常 D. 输卵管异常
10. 关于妇科腹部手术患者的术后护理措施, 下列描述正确的是
- A. 术后 2 日内进流食 B. 通常于术后 24 小时拔除尿管
C. 术后每 2 小时监测一次生命体征 D. 硬膜外麻醉未清醒前应有专人守护
11. 下列属于胎儿窘迫临床表现的是
- A. 羊水呈绿色 B. 胎心率 150 次/分
C. 胎动 3~5 次/小时 D. NST 有反应型
12. 关于胎盘残留导致的晚期产后出血, 下列描述正确的是
- A. 指导产妇每日外阴冲洗 1 次 B. 产后血性恶露多, 持续时间长
C. 产后 20 余日出现大量急性出血 D. 确诊胎盘残留后应立即切除子宫
13. 最常见的外阴癌类型是
- A. 鳞状细胞癌 B. 基底细胞癌
C. 前庭大腺瘤 D. 恶性黑色素瘤
14. 子宫颈癌患者早期最常见的临床表现是
- A. 疼痛 B. 接触性出血
C. 阴道大量排液 D. 宫颈菜花样改变
15. 关于妊娠期糖尿病产妇分娩的新生儿, 下列处理错误的是
- A. 新生儿出生时留脐血检查血糖
B. 新生儿出生后 30 分钟复查血糖
C. 体重小于 4000g 者按正常新生儿处理
D. 出生后 30 分钟开始定时滴服葡萄糖溶液

16. 围绝经期妇女内分泌变化的特点是
- A. LH 下降
B. FSH 下降
C. GnRH 增加
D. 雌激素增加
17. 关于原发性痛经的疼痛特点, 下列描述正确的是
- A. 常呈阵发性
B. 通常位于脐周
C. 一般可持续 4~5 天
D. 多在月经来潮前几小时开始
18. 子宫内膜异位症的病变, 较少累及的部位是
- A. 宫颈
B. 宫骶韧带
C. 卵巢
D. 子宫直肠陷凹
19. 不需要进行肠道准备的妇科手术是
- A. 急诊剖腹探查术
B. 全子宫切除术
C. 经腹子宫肌瘤剔除术
D. 肿瘤细胞减灭术
20. 双胎妊娠分娩过程中, 第一个胎儿娩出后, 下列措施中错误的是
- A. 立即断脐
B. 保持第二个胎儿为纵产式
C. 严密观察及时发现胎盘早剥
D. 立即采取措施娩出第二个胎儿
21. 妇科肿瘤患者化疗过程中, 最常见、最严重的副反应是
- A. 造血功能障碍
B. 消化道反应
C. 肝、肾功能损伤
D. 皮肤反应
22. 关于妊娠合并子宫肌瘤的处理原则, 下列描述正确的是
- A. 积极治疗, 及早剔除肌瘤
B. 若无症状, 可不做特殊处理
C. 发生红色变性, 立即手术干预
D. 发现子宫肌瘤, 剖宫产终止妊娠
23. 关于经腹输卵管结扎的手术时间, 下列描述正确的是
- A. 非妊娠妇女月经来潮前 3~7 天
B. 人工流产后 1 周
C. 哺乳期随时可行手术
D. 剖宫产的同时
24. 导致葡萄胎患者腹痛的原因是
- A. 子宫出血
B. 子宫强烈收缩
C. 卵巢黄素囊肿压迫
D. 子宫过度扩张
25. 某女, 34 岁, 妊娠 36 周, 胎膜早破 1 周, 体温 38℃, 阴道分泌物有异味, 考虑为宫腔严重感染拟行剖宫产手术。此情况应采取的最佳手术方式是
- A. 子宫下段剖宫产术
B. 子宫体剖宫产术
C. 古典式剖宫产术
D. 腹膜外剖宫产术

34. 关于妇科肿瘤化疗患者的护理内容, 下列描述正确的是
- A. 住院期间严格卧床休息
 - B. 保持病室清洁, 定期消毒
 - C. 严格控制探视人员
 - D. 化疗间歇期避免户外活动
 - E. 保持室内空气湿度在 30%
35. 下列属于阴道脱落细胞检查适应证的是
- A. 子宫颈病变检查
 - B. 子宫体病变检查
 - C. 胎盘功能检查
 - D. 卵巢功能检查
 - E. 输卵管功能检查

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、名词解释题: 本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

- 36. 周期性胎心率
- 37. 紧急避孕
- 38. 异常分娩
- 39. 外阴白色病变
- 40. 不孕症

四、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

- 41. 简述妊娠合并心脏病患者第二产程的护理措施。
- 42. 简述脐带脱垂患者的护理措施。
- 43. 简述产褥感染患者的处理原则。
- 44. 简述子宫肌瘤患者的处理原则。
- 45. 简述经前期综合征患者的护理措施。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 某女，28 岁，G₂P₁。因“流产术后持续不规则阴道流血一个半月，伴咳嗽、痰中带血丝、呼吸困难 2 周”入院。查体：子宫不均匀增大、质软。尿 HCG (+)。B 型超声检查显示：子宫增大，肌层内可见高回声团，边界清但无包膜。组织学诊断可见大量滋养细胞浸润和坏死出血，未见绒毛结构。胸部 X 线检查可见棉球状阴影。其他未见异常。

根据以上资料，请回答：

(1) 该患者当前最可能的两个医疗诊断；

(2) 该类患者目前转移灶的护理。

47. 某女，32 岁，宫内妊娠 37 周。清晨不小心摔倒，随后出现持续性剧烈腹痛伴有少量阴道流血，来院就诊。查体：体温 36.1℃，脉搏 102 次/分，呼吸 20 次/分，血压 90/50mmHg。产科检查：胎心听不清，胎位不清，子宫硬如板状，有明显压痛。

根据以上资料，请回答：

(1) 该患者可能的医疗诊断；

(2) 若确诊，对该类患者应采取的护理措施。