

绝密★启用前

2020年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

内科护理学(二)

(课程代码 03202)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 哮喘典型的体征是
A. 呼气相延长伴广泛哮鸣音
B. 吸气相延长伴广泛哮鸣音
C. 呼气相延长伴广泛湿啰音
D. 吸气相延长伴广泛湿啰音
2. 患者,女性,20岁,因肺结核、咯血入院。入院当天晚上,出现咯血,量约350ml。该患者的咯血量为
A. 小量
B. 中量
C. 大量
D. 极大量
3. 下列关于心脏传导系统的描述,正确的是
A. 由普通心肌细胞组成
B. 心脏传导系统的细胞均能发出冲动
C. 窦房结的自律性最低
D. 房室结是心脏的正常起搏点
4. 患者,女性,79岁。因突发严重呼吸困难,急诊就诊。查体患者面色青灰、口唇发绀,呼吸频率34次/分,频繁咳嗽,并咯粉红色泡沫样痰,初步诊断为“急性肺水肿”。为缓解症状应嘱患者采取的体位是
A. 端坐位
B. 平卧位
C. 左侧卧位
D. 右侧卧位

5. 患者,女性,41岁。单位体检测量两次血压均值为139/90mmHg。根据我国高血压防治指南判断其血压分级属于
A. 正常高值
B. 1级高血压
C. 2级高血压
D. 3级高血压
6. 患者,男性,45岁,因急性胰腺炎入院。责任护士查体时发现患者脐周皮肤出现灰紫色斑。该特征性体征称为
A. Grey-Turner征
B. Valsalva征
C. Cullen征
D. Kussmaul征
7. 患者,男性,56岁,因肝硬化、上消化道出血急诊入院。患者入院后又发生呕血一次。责任护士对该患者应该采取的饮食护理措施是
A. 禁食
B. 温凉流质饮食
C. 温凉低渣饮食
D. 清淡无刺激性饮食
8. 患者,男性,50岁,患慢性肾小球肾炎多年,目前每日总尿量为900ml,夜间尿量为800ml。该患者的尿量属于
A. 正常尿量
B. 少尿
C. 无尿
D. 夜尿增多
9. 青年女性因月经过多入院,诊断为特发性血小板减少性紫癜,其发病的主要机制是
A. 遗传因素
B. 免疫因素
C. 感染因素
D. 肝、脾因素
10. 系统性红斑狼疮患者最具特征性的皮疹为
A. 蝶形红斑
B. 盘状红斑
C. 掌指部红斑
D. 甲周红斑
11. 导致甲状腺功能亢进症最常见的病因是
A. 自身免疫性甲状腺炎
B. 结节性毒性甲状腺肿
C. 甲状腺自主高功能腺瘤
D. 毒性弥漫性甲状腺肿
12. 甲亢初始治疗的首选方法是
A. 放射性碘治疗
B. 替代治疗
C. 抗甲状腺药物治疗
D. 手术治疗
13. 以胰岛素抵抗和胰岛素分泌缺陷为基本病理特征的糖尿病类型是
A. 1型糖尿病
B. 2型糖尿病
C. 妊娠期糖尿病
D. 其他特殊类型糖尿病
14. 确诊脑出血的首选检查是
A. 脑脊液检查
B. 头颅MRI
C. 脑血管造影
D. 头颅CT

15. 脑梗死最常见的病因是

- A. 高血压
- B. 糖尿病
- C. 动脉粥样硬化
- D. 高脂血症

二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 为促进患者痰液排出，下列关于胸部叩击的叙述正确的是

- A. 咯血患者不宜进行胸部叩击
- B. 叩击应避开心脏和乳房
- C. 叩击部位覆盖厚且柔软织物保护皮肤
- D. 叩击应在餐前至少半小时完成
- E. 叩击时间控制在 10~15 分钟

17. 慢性肺源性心脏病患者可能发生的并发症有

- A. 肺性脑病
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 持续性房颤
- D. 消化道出血
- E. 感染中毒性休克

18. NYHA 心功能分级 II 级患者表现为

- A. 体力活动轻度受限
- B. 休息时无症状
- C. 一般日常活动即可出现心悸、呼吸困难等症状
- D. 休息较长时间后症状可缓解
- E. 不能从事任何日常活动

19. 急性透壁性心肌梗死急性期心电图的典型表现包括

- A. 异常宽而深的 Q 波
- B. ST 段弓背向上抬高
- C. ST 段水平型压低
- D. ST 段下斜型压低
- E. T 波倒置

20. 在病毒性心肌炎急性期升高，敏感性和特异性最强，且检测时间窗也最宽的血清心肌损伤标记物包括

- A. CK
- B. CK-MB
- C. cTnT
- D. cTnI
- E. AST

21. 下列关于肝硬化腹水患者护理措施的叙述正确的是

- A. 进水量<500ml/d
- B. 盐的摄入量为 1~2g/d
- C. 体重减轻以 1kg/d 为宜
- D. 使用氢氯噻嗪利尿的患者应注意观察血钾水平
- E. 放腹水治疗后的患者应注意监测生命体征

22. 慢性肾衰竭患者可出现的水、电解质和酸碱平衡失调有

- A. 低钠血症
- B. 高钾血症
- C. 高钙血症
- D. 低磷血症
- E. 代谢性酸中毒

23. 肾病综合征的并发症包括

- A. 感染
- B. 血栓和栓塞
- C. 高血压
- D. 急性肾功能衰竭
- E. 蛋白质及脂肪代谢紊乱

24. 糖尿病微血管病变包括

- A. 肾动脉硬化
- B. 糖尿病肾病
- C. 缺血性脑血管病
- D. 糖尿病视网膜病变
- E. 神经病变

25. 帕金森病的临床表现可包括

- A. 静止性震颤
- B. 屈肌张力和伸肌张力均减低
- C. 随意运动增加
- D. 慌张步态
- E. 顽固性便秘

第二部分 非选择题

三、填空题：本大题共 20 空，每空 1 分，共 20 分。

26. 判断慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者气流受限的客观检查是_____。

27. 控制哮喘急性发作的首选药物短效 β_2 受体激动剂的最佳给药途径是_____。

28. 慢性 II 型呼吸衰竭患者应采用持续低流量吸氧，目标是控制 PaO₂ 略高于_____ mmHg。

29. 病毒性心肌炎是由嗜心肌病毒感染所致的，以非特异性_____性的心肌炎症为主要病变的疾病。

30. 对永久性房颤患者应长期接受华法林治疗, 以预防_____。
31. 心绞痛患者第1次服用_____药物时, 应避免站立体位, 且剂量不宜过大。
32. 服用_____药物和幽门螺杆菌感染是目前已知的消化性溃疡的主要病因。
33. 肝性脑病患者可出现_____样震颤, 也称为肝震颤。
34. 慢性肾小球肾炎发病的起始因素多为_____介导炎症。
35. 清洁中段尿做细菌培养及菌落计数, 若尿菌量 $\geq 10^5$ /ml, 称为_____, 多为肾盂肾炎。
36. 肾病综合征具有共同的临床表现, 包括: 大量_____, 低蛋白血症, 水肿和高脂血症。
37. 铁剂治疗缺铁性贫血至血红蛋白正常后仍需继续服用3~6个月, 其目的是_____。
38. 1型糖尿病以胰岛B细胞破坏、胰岛素分泌_____为基本病理生理特征。
39. 约25%的系统性红斑狼疮患者有神经系统损伤, 以_____受累及多见。
40. 为急性中毒患者洗胃时, 每次灌注洗胃液量以_____~250ml左右为宜。
41. 急性有机磷农药中毒患者最早出现的_____症状, 是副交感神经末梢兴奋所致。
42. 甲型、戊型肝炎以_____传播为主, 水源污染和水生贝类受污染可致暴发流行。
43. 肾病综合征出血热的主要传染源是_____。
44. 全面性强直-阵挛发作是癫痫常见的发作类型之一, 发作分为三期, 分别是_____期、阵挛期和惊厥后期。
45. 颈内动脉系统的短暂脑缺血发作(TIA)最常见的症状是_____侧发作性的肢体偏瘫、单瘫或面瘫。

四、名词解释题: 本大题共5小题, 每小题3分, 共15分。

46. 心肌梗死
47. 溃疡性结肠炎
48. 肾小球疾病
49. 再生障碍性贫血
50. 隐性感染

五、简答题: 本大题共4小题, 每小题5分, 共20分。

51. 简述护士对慢性心力衰竭长期卧床患者休息与活动的指导。
52. 简述治疗消化性溃疡的药物之一抗酸药的用药护理内容。
53. 简述白血病化疗的护理。
54. 简述促进类风湿关节炎患者自理能力的护理措施。

六、论述题: 本大题共2小题, 每小题10分, 共20分。

55. 患者, 男性, 76岁, 患慢性阻塞性肺疾病(COPD)20余年, 近5年出现活动后明显气促, 1年前因肺部感染合并呼吸衰竭入院1次。1周前, 受凉后出现发热, 体温最高达38°C, 咳嗽、咳黄色黏痰, 伴呼吸费力。1天前家属发现其昏睡不醒, 立即送往医院就诊。

入院查体: T 38.2°C, P 88次/分, R 12次/分, BP 130/80mmHg, 昏睡, 呼之不应, 压眶有反应, 双肺呼吸音粗, 散在干湿啰音, 以右下肺为著, HR 88次/分, 律齐, 未闻及杂音, 腹软无压痛, 肝颈回流征(-), 双下肢不肿。

辅助检查: 血气分析: pH 7.36, PaO₂ 44mmHg, PaCO₂ 92mmHg(未吸氧); 血常规为 WBC 12×10^9 /L, 中性粒细胞分类 88%, Hb 145g/L; 胸片示右下肺炎。

入院后初步诊断为 COPD 急性发作, 肺部感染, 呼吸衰竭。给予抗感染、气管插管、呼吸机辅助通气等治疗。

请结合病例写出:

- (1) 该患者呼吸衰竭的类型;
- (2) 救治该患者的呼吸衰竭最关键的环节;
- (3) 护士经人工气道吸痰的注意事项。

56. 患者, 女性, 42岁。2年前无明显诱因出现心悸、怕热、多汗、手抖症状, 伴乏力、多食易饥, 后逐渐出现月经周期紊乱, 月经量稀少, 未予诊治。半年前自觉眼球突出, 视物易疲劳, 畏光、流泪。1月前上述症状加重, 就诊于当地医院查甲状腺功能: TT₄↑ >30 ug/dL, TT₃↑ 6.16 ug/dL, FT₄↑ 73.50 pmol/L, FT₃↑ 38.56 pmol/L, TSH↓ 0.01mIU/L, 诊断为“甲亢 Graves病”, 规律服用抗甲状腺药物甲疏咪唑, 为求进一步诊治转入本院治疗。

入院后查体: T 36.3°C, P 66次/分, R 22次/分, BP 155/75mmHg, 身高158cm, 体重65.8kg, 眼球突出度: 左20mm, 右18mm; Stellwag征(+), Joffory征(+), Mobius征(+). 双侧甲状腺II°弥漫性肿大, 质软, 可及震颤, 未闻及杂音。余(-)。

请结合病例写出:

- (1) 该患者高代谢症候群的主要表现;
- (2) 患者是否存在浸润性突眼, 并说明依据;
- (3) 该患者药物护理和眼部护理的主要措施。