

绝密★启用前

2021年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 妇产科护理学（一）

（课程代码 03002）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

### 第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共25小题，每小题1分，共25分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 关于产后会阴的护理，下列描述正确的是  
A. 会阴清洗的原则是由上至下  
B. 会阴侧切伤口于产后5~7天拆线  
C. 有会阴侧切伤口的产妇采取患侧卧位  
D. 每日用1:4000络合碘溶液冲洗外阴两次
2. 闭经患者行药物撤退试验，其目的是为了评估体内的  
A. 孕激素水平  
B. 雄激素水平  
C. 雌激素水平  
D. 泌乳素水平
3. 关于新生儿的居住条件，下列描述正确的是  
A. 室温18~22℃  
B. 相对湿度45%~50%  
C. 保持室内空气流通  
D. 每日进行全面消毒
4. 下列有助于了解不孕症妇女卵巢功能的检查是  
A. 阴道镜检查  
B. 宫腔镜检查  
C. 女性激素测定  
D. 输卵管碘油造影
5. 下列剖宫产手术种类中，出血少、对合容易、再次分娩瘢痕破裂风险小的是  
A. 子宫下段纵切口  
B. 腹膜外剖宫产术  
C. 古典型剖宫产术  
D. 子宫下段横切口

妇产科护理学（一）试题第1页（共6页）

6. 口腔溃疡是妇科肿瘤化疗不良反应，多发生在用药后  
A. 1~2天  
B. 3~4天  
C. 5~6天  
D. 7~8天
7. 下列可导致晚期产后出血的是  
A. 产褥期宫腔内感染  
B. 产后过早下床活动  
C. 产后未常规使用抗生素  
D. 产时阴道裂伤
8. 关于避孕药的不良反应及处理，下列描述正确的是  
A. 类早孕反应轻者持续半年后可自行消失，不需处理  
B. 若服药后出现停经半年，可停药改用其他避孕方法  
C. 月经前半周期出现突破性出血，多因孕激素不足  
D. 复方短效口服避孕药宜晚上服用，以减轻副反应
9. 在产科临床工作中，判断胎儿大小的影像学方法是  
A. CT  
B. 核磁  
C. 超声  
D. X线
10. 骨盆入口前后径缩短，横径正常，对角径 $<11.5\text{cm}$ ，可诊断为  
A. 扁平骨盆  
B. 均小骨盆  
C. 漏斗骨盆  
D. 中骨盆狭窄
11. 关于子宫的韧带，下列描述正确的是  
A. 宫骶韧带含有丰富的血管、神经、淋巴管及疏松的结缔组织  
B. 阔韧带为子宫两侧向外伸展至骨盆侧壁的翼形腹膜结构  
C. 主韧带使宫颈向上、向后牵引，保持子宫前倾位  
D. 圆韧带对固定宫颈的位置十分重要
12. 第二产程宫缩间歇时，胎头不再回缩，称为  
A. 仰伸  
B. 衔接  
C. 拨露  
D. 着冠
13. 妊娠中期羊水的主要来源是  
A. 母体血清  
B. 胎儿尿液  
C. 羊膜透析液  
D. 胎儿皮肤渗出液
14. 关于围绝经期综合征患者的临床表现，下列描述不正确的是  
A. 月经紊乱  
B. 阴道伸展性增加  
C. 焦虑不安  
D. 假性心绞痛

妇产科护理学（一）试题第2页（共6页）

座位号：

姓名：

3333

15. 女性骨盆出口横径的正常值范围是
- A. 6.5~7.5cm                      B. 7.5~8.5cm  
C. 8.5~9.5cm                      D. 9.5~10.5cm
16. 关于妇科手术术后护理, 下列描述正确的是
- A. 伤口疼痛通常持续 24~48 小时      B. 腹部压沙袋 10~12 小时  
C. 禁止性生活和盆浴 2 周              D. 尿管须保留 5~7 天
17. 某孕妇, 28 岁, 孕 33 周, 胎心 142 次/分, 近 1 周反复无痛性阴道少量流血, 下列处理恰当的是
- A. 立即行肛门检查                      B. 绝对卧床休息  
C. 尽早应用宫缩剂                      D. 立即终止妊娠
18. 关于妇科肿瘤患者化疗不良反应的护理, 下列描述正确的是
- A. 化疗导致腹泻一天超过 3 次时停止化疗  
B. 严重的恶心、呕吐可产生代谢性酸中毒  
C. 血小板低于  $20 \times 10^9/L$  时即有潜在出血  
D. 白细胞计数低于  $5.0 \times 10^9/L$  时立即停药
19. 关于妊娠合并巨幼细胞性贫血的临床表现, 下列描述正确的是
- A. 维生素 B<sub>12</sub> 缺乏时可有感觉异常      B. 叶酸缺乏时可出现神经系统症状  
C. 多见于妊娠早期                      D. 易导致巨大胎儿
20. 关于输卵管通畅检查的护理要点, 下列描述正确的是
- A. 月经前 3~7 天进行                      B. 术后应观察 10 分钟  
C. 术后禁止性生活 1 周                      D. 注液不宜过快、过多
21. 关于产后出血的定义, 下列描述正确的是
- A. 胎盘娩出 12 小时内出血量超过 500ml  
B. 胎儿娩出 12 小时内出血量超过 500ml  
C. 胎盘娩出 24 小时内出血量超过 500ml  
D. 胎儿娩出 24 小时内出血量超过 500ml
22. 目前治疗淋病的首选药物是
- A. 甲硝唑                                  B. 头孢曲松钠  
C. 链霉素                                  D. 庆大霉素

23. 子宫内膜癌确诊的依据是
- A. 淋巴造影                                  B. 内膜组织学检查  
C. 核磁共振                                  D. 阴道 B 超检查
24. 葡萄胎最常见的症状是
- A. 停经及阴道出血                      B. 妊娠剧吐  
C. 子宫增长迅速                      D. 下腹疼痛
25. 关于绒毛膜癌的病理特点, 下列描述错误的是
- A. 肉眼可见子宫不规则增大、柔软  
B. 剖视可见瘤组织呈暗红色, 伴有出血  
C. 增生的滋养细胞大片地侵犯子宫肌层和血管  
D. 镜检时有绒毛结构, 滋养细胞增生和分化不良

## 第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

26. 在妇科检查中，腹部、阴道、直肠联合检查，称\_\_\_\_\_检查。
27. 阴道涂片检查主要目的是了解\_\_\_\_\_功能。
28. 妇科肿瘤化疗中，化疗药物用量大多是按患者的\_\_\_\_\_计算。
29. 导致不孕症的男方因素，主要是\_\_\_\_\_障碍和输精障碍。
30. 无排卵性功能失调性子宫出血患者的基础体温呈\_\_\_\_\_相型。
31. 在行胎头吸引器助产术时，胎头吸引器放置前要求胎头骨质部分达坐骨棘下\_\_\_\_\_cm 以上。
32. 引起产褥感染的细菌，以\_\_\_\_\_杆菌及厌氧性链球菌最为常见。
33. 在胎儿成熟度检查中，羊水卵磷脂/鞘磷脂比值 $>2$ 提示胎儿\_\_\_\_\_成熟。
34. 第一产程规律宫缩超过 16 小时宫口开大未达到 3cm，称为\_\_\_\_\_延长。
35. 妊娠合并心脏病的妇女，孕 28 周后监测心功能的频率是\_\_\_\_\_一次。
36. 输卵管和卵巢在临床中被称为子宫\_\_\_\_\_。
37. 新生儿出生时，全身皮肤覆盖一层胎脂，有保护皮肤和\_\_\_\_\_的作用。
38. 宫颈炎物理治疗后\_\_\_\_\_个月内避免盆浴、性生活及阴道冲洗。
39. 卵巢肿瘤出现\_\_\_\_\_或破裂时，患者会突发下腹剧烈疼痛，伴恶心呕吐。
40. 妊娠滋养细胞肿瘤脑转移患者，癌细胞进入脑血管后，分为三个阶段，分别是瘤栓期、\_\_\_\_\_和脑疝期。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

41. 分娩机制
42. 紧急避孕
43. 难产
44. 胎儿窘迫
45. 子宫肌瘤

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

46. 简述围绝经期综合征患者的健康教育。
47. 简述预产期的推算方法。
48. 简述妊娠高血压疾病妇女产褥期的护理。
49. 简述妇科肿瘤患者化疗常用的给药途径。
50. 简述女性生殖器的自然防御功能。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

51. 某女，28 岁。初产妇，自然分娩一男婴，产程顺利。产后观察 2 小时安返母婴同室休息。请护士对其讲解母乳及母乳喂养的优点。
52. 某女，67 岁，因宫颈癌行广泛式全子宫切除术。术后 2 小时患者面色苍白、口唇发绀。查体：T 37.4℃，P 90 次/分，R 16 次/分，BP 90/60mmHg。自患者返回病房后尿量 30ml，腹腔引流管通畅、呈血性，引流量 200ml，阴道少量流血，腹部切口敷料干燥，腹部移动性浊音（+）。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者当前最可能的术后并发症；
- (2) 早期识别该术后并发症的护理措施。