

自考网校 免费试听. 自考名师. 课件更新. 报名演示. 学习卡.



郭建华 韩旺辰 郝玉柱 张旭娟 孙茂竹 白薇

最权威的师资阵容

最及时的在线答疑

全程视频授课, 反复观看 不限次数

自考 365 网校数百门课程全面招生!

基础班+串讲班 祝您成功每一天!

全国 2006 年 1 月高等教育自学考试 妇产科护理学(一)试题 课程代码: 03002

一、单项选择题(本大题共 25 小题, 每小题 1 分, 共 25 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 正常产妇产后开始体操锻炼最适宜的时间是()
A. 产后 24 小时
B. 产后 1 周
C. 产后 1 个月
D. 产后 42 天
2. 化疗患者考虑停药的白细胞计数指征为()
A. $<3.0 \times 10^9 / L$
B. $<4.0 \times 10^9 / L$
C. $<5.0 \times 10^9 / L$
D. $<6.0 \times 10^9 / L$
3. 关于 I 度子宫脱垂, 正确的叙述是()
A. 宫颈未越出阴道外口
B. 宫颈已越出阴道外口
C. 宫体部分脱出阴道外口
D. 宫体全部脱出阴道外口
4. 有排卵型功血的治疗原则是()
A. 止血
B. 促排卵
C. 调节月经周期
D. 调节黄体功能
5. 子宫颈癌普查的检查方法是()
A. 碘试验
B. B 超
C. 细胞学检查
D. 多聚酶链反应
6. 葡萄胎术后随访时间至少为()
A. 半年
B. 1 年
C. 2 年
D. 5 年
7. 侵蚀性葡萄胎最常见的转移途径是()
A. 血行转移
B. 直接蔓延
C. 淋巴转移
D. 粘膜浸润
8. 下列可用孕激素治疗的疾病是()

- A.葡萄胎
B.子宫颈炎
C.子宫颈癌
D.子宫内膜癌
- 9.子宫颈浸润癌病变局限在宫颈为()
A.原位癌
B.I 期浸润癌
C.II 期浸润癌
D.III 期浸润癌
- 10.最常见的产褥感染是()
A.外阴、阴道、子宫颈口感染
B.急性子宫内膜炎、子宫肌炎
C.急性盆腔结缔组织炎
D.血栓性静脉炎
- 11.一化疗患者使用氟尿嘧啶后, 出现腹泻症状, 护士应建议其食用()
A.酸奶
B.鸡蛋
C.芹菜
D.奶油蛋糕
- 12.均小骨盆是指骨盆各径线均小于正常值()
A.1cm 以上
B.1.5cm 以上
C.2cm 以上
D.2.5cm 以上
- 13.妊娠高血压综合征患者应用硫酸镁治疗, 最早出现的中毒反应是()
A.呼吸减慢
B.心率减慢
C.尿量减少
D.膝腱反射消失
- 14.妊娠合并心脏病患者, 决定是否继续妊娠的主要依据是()
A.心脏病种类
B.心功能分级
C.心脏病变部位
D.症状严重程度
- 15.下述胎盘早期剥离与前置胎盘的鉴别诊断错误的是()
A.胎盘早期剥离引起的出血可伴有疼痛
B.胎盘早期剥离引起的出血破膜后即停止
C.前置胎盘出血于子宫收缩时增多
D.重度胎盘早期剥离时, 胎心音消失
- 16.下列属于高危妊娠的是()
A.孕妇年龄 34 岁
B.孕妇身高 150cm
C.孕妇体重 70 公斤
D.孕妇有前次剖宫产史
- 17.正常产妇产后第三天, 双乳房肿胀, 乳汁排流不畅, 最常见原因是()
A.卧床不活动
B.未及早按摩、热敷乳房
C.未做到按需哺乳
D.乳头凹陷所致
- 18.下列关于妊娠期保健的叙述, 正确的是()

- A.产前检查应从妊娠 20 周开始
B.产前检查应每月 1 次
C.无浮肿的孕妇，不需要测体重
D.血压较基础血压升高 $4 / 2\text{kPa}(30 / 15\text{mmHg})$ 时为异常
- 19.自耻骨联合下缘到骶岬上缘中点的距离称为()
A.骨盆入口前后径
B.真结合径
C.对角径
D.中骨盆前后径
- 20.口服避孕药后，少数妇女可出现消化系统的不良反应，这主要是因为()
A.体内激素水平改变所致植物神经功能紊乱
B.雌激素刺激胃粘膜
C.避孕失败，早孕反应
D.机体对药物的排斥反应
- 21.正常胎儿的脐带内含有()
A.一条动脉，一条静脉
B.一条动脉，二条静脉
C.二条动脉，一条静脉
D.二条动脉，二条静脉
- 22.月经周期为 28 天的妇女，其宫颈粘液呈典型羊齿状结晶应出现于月经周期的()
A.6~7 天
B.9~10 天
C.13~14 天
D.17~19 天
- 23.关于正常骨产道，正确的叙述是()
A.骨盆入口平面前后径比横径大
B.中骨盆平面横径比前后径大
C.骨盆入口平面是骨盆的最宽平面
D.中骨盆平面是骨盆最窄平面
- 24.初乳的特点不包括()
A.糖含量较高
B.有减轻新生儿黄疸的作用
C.有抗感染的作用
D.脂肪含量较少
- 25.临产时监测子宫收缩力的最佳部位是()
A.子宫体部
B.子宫底部
C.子宫下段
D.两侧宫角

二、填空题(本大题共 10 小题,每空 1 分,共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 26.葡萄胎患者应在第一次清宫后_____周左右行第二次清宫。
27.产褥感染的产妇应采取_____体位，以利于恶露引流和炎症局限。
28.为不孕妇女行输卵管通畅术，一般安排在月经干净后_____天进行。

- 29.手术是治疗妇科疾病的主要手段。根据手术途径,可分为____式手术、____式手术或二者联合手术。
- 30.外阴伤口水肿严重者,用____%硫酸镁溶液或____%酒精溶液湿热敷。
- 31.良性卵巢肿瘤最为简单可靠的检查方法为_____。
- 32.容易发生 DIC 的流产类型是_____。
- 33.各种类型的肝炎产妇,分娩时均应留_____血查新生儿肝功能及乙肝五项,_____不能留做生物制品。
- 34.子宫内膜分为在表面的_____层,及接近子宫肌层的_____层。
- 35.胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系,称为_____。臀先露以_____为指示点。

三、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

- 36.不孕症
- 37.难产
- 38.足月产
- 39.新生儿生理性黄疸
- 40.盆腔炎

四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分)

- 41.简述输卵管妊娠破裂的临床表现。
- 42.张某,女,经阴道助产于产后 2 小时内阴道出血超过 500ml,护士需要对其采取哪些护理措施?
- 43.某胎儿娩出后,查心率 100 次/分,四肢稍屈,呼吸规则,吸痰时有恶心反射,四肢皮肤青紫但躯干红。
- (1) 请根据新生儿情况,给出 Apgar 评分。
- (2) 简述新生儿即刻护理内容。
- 44.简述对淋病患者的健康教育内容。
- 45.简述围绝经期(更年期)综合征妇女由于卵巢功能减退及雌激素不足而出现的临床表现。

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

- 46.初孕妇,27 岁,妊娠 12 周,已诊断为“妊娠合并 I 型糖尿病”。
- 请写出主要的健康指导内容。
- 47.王某,女,28 岁, G₁P₀,两年前停经 42 天时行药物流产,此后工具+安全期避孕,本次为单位体检。内、外科检查无异常。妇科检查无异常。实验室检查:血色素 100g/L,检查时王某主诉:暂时不想生育,因每次经期较长(9~10 天),不易掌握安全期,而且使用避孕套有所不便,不知如何更好地避孕。

请问：（1）王某应选用何种避孕措施？

（2）护理人员应如何为王某提供关于此种避孕方法的指导？



自考 365
www.zikao365.com