

- A. 青春期妇女
B. 生育期妇女
C. 更年期妇女
D. 老年期妇女
5. 粘膜下肌瘤脱出至阴道时的护理，正确的是（ ）
A. 病人绝对卧床休息
B. 可适当给予轻泻剂
C. 立即报告行手术
D. 保持会阴部清洁
6. 导致产褥病率的主要原因是（ ）
A. 手术切口感染
B. 乳腺炎
C. 泌尿系感染
D. 产褥感染
7. 滴虫性阴道炎主要的辅助检查方法是（ ）
A. 宫颈刮片细胞学检查
B. 阴道脱落细胞检查
C. 悬滴法
D. 子宫内膜活检
8. 骨盆测量时，发现对角径 $<11.5\text{cm}$ ，可诊断为（ ）
A. 漏斗骨盆
B. 均小骨盆
C. 倾斜骨盆
D. 扁平骨盆
9. 哺乳期，与泌乳量有直接关系的是（ ）
A. 婴儿频繁吸吮
B. 产妇营养状况
C. 充足睡眠
D. 健康状况
10. 关于子宫下段，不正确的叙述是（ ）
A. 由子宫峡部形成，非孕时长 1cm
B. 临产后子宫收缩峡部被拉长形成子宫下段
C. 子宫上、下段肌壁厚薄不同，形成生理缩复环
D. 子宫下段常被选为剖宫产术的子宫切开处
11. 关于胎儿宫内窘迫的护理措施正确的是指导孕妇（ ）
A. 仰卧位
B. 半卧位
C. 左侧卧位
D. 右侧卧位
12. 放射性膀胱炎时应鼓励病人（ ）
A. 及时排空膀胱
B. 多饮水
C. 用抗生素
D. 停止放疗
13. 子宫颈癌最早出现的临床表现是（ ）
A. 接触性出血
B. 经量改变

- C.腹痛
D.经期改变
- 14.可诊断为子宫性闭经的是 ()
A.雌激素试验阳性
B.孕激素试验阳性
C.垂体兴奋试验阴性
D.雌激素试验阴性
- 15.28 岁不孕妇女, 妇科检查正常; 丈夫 30 岁, 有腮腺炎史, 首要的检查是 ()
A.经前诊刮
B.输卵管通液术
C.男方查精液
D.性交后试验
- 16.妇科手术预计可能涉及肠道时, 开始做胃肠道准备应在术前 ()
A.12 小时
B.1 天
C.2 天
D.3 天
- 17.化疗患者出现血小板减少时, 护士应建议病人 ()
A.绝对卧床休息
B.为防止便秘, 可食用粗纤维食物
C.感鼻腔干燥时可用石蜡油滴鼻
D.为加强营养可根据病人口味, 随便选择食物
- 18.疑有输卵管妊娠破裂出现内出血的患者, 简单、可靠的诊断方法是 ()
A.腹部及阴道检查
B.后穹窿穿刺
C.尿 HCG 测定
D.腹腔镜检查
- 19.为预防吸入性肺炎, 新生儿应采取 ()
A.平卧.头偏一侧
B.侧卧位
C.头低脚高位
D.俯卧位
- 20.子宫脱垂病人术后应采取的体位是 ()
A.半卧位
B.头低脚高位
C.俯卧位
D.膝胸卧位
- 21.新生儿娩出后, 首要的处理是 ()
A.清理呼吸道
B.处理脐带
C.新生儿 Apgar 评分
D.刺激新生儿大声啼哭
- 22.排卵期的宫颈粘液, 正确的是 ()
A.量少
B.粘稠
C.水分少
D.拉丝度大

23.关于妊娠期保健的叙述,正确的是()

- A.首次产前检查应从妊娠 20 周开始
- B.产前检查应每月 1 次
- C.无浮肿的孕妇,不需要测体重
- D.血压较基础血压升高 $4 / 2\text{kPa}(30 / 15\text{mmHg})$ 时为异常

24.从子宫颈至骨盆侧壁的韧带是()

- A.圆韧带
- B.阔韧带
- C.主韧带
- D.骨盆漏斗韧带

25.骨盆出口横径是指()

- A.两侧坐骨结节内侧缘之间的距离
- B.两侧坐骨结节外侧缘之间的距离
- C.两侧坐骨棘内侧缘之间的距离
- D.两侧坐骨棘外侧缘之间的距离

二、填空题(本大题共 10 小题,每空 1 分,共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.常用的化疗药物给药途径有_____、肌肉注射、口服、腔内注射、_____和瘤内注射。

27.发现子宫颈癌前期病变和早期宫颈癌的主要方法是_____。

28.子宫颈炎行物理疗法应在月经干净后_____天内。

29.产钳助产术中现常用_____产钳。

30.葡萄胎最常见的临床症状为_____。

31.分娩 24 小时后阴道发生大量出血称_____。

32.妊娠合并贫血,常见的是_____性贫血,其次为_____性贫血。

33.卡介苗接种方法有_____和_____两种。

34.胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系称为_____,臀先露以_____为指示点。

35.女性内生殖器包括阴道、子宫、_____及_____。

三、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

36.淋病

37.功能失调性子宫出血病

38.内旋转

39.纯母乳喂养

40.I 度子宫脱垂

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

41. 简述慢性盆腔炎的主要临床表现。
42. 简述持续性枕后位或枕横位的护理措施。
43. 简述避孕药的机理。
44. 简述基础体温的测定方法。
45. 简述急性胎儿宫内窘迫的常见原因。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

46. 试述全子宫切除术病人术前准备的内容。
47. 某患者，女，35 岁、停经 40 天，阴道少量流血 2 天，右下腹剧烈疼痛 4 小时，体温 37.2℃，脉搏 100 次/分，血压 90/60mmHg，宫颈有举痛，宫体稍大，右附件区可触及一鸭卵大肿物，质软，界不清，压痛明显。

请回答：

- (1) 你首先考虑该病人的临床诊断是什么？
- (2) 主要护理措施有哪些？



自考 365
www.zikao365.com